

નિવેદન.

આપણા દેશી બાપાના માહિત્યની અભિવૃદ્ધિ કરવાના સદ્દેશથી શ્રીમંત પતિતપાવન મહારાજ સાહેબ શ્રી સયાજીરાવ ગાયકવાડ મેનાખાસખેલ, મમશેર બહાદુર, જી. સી. એમ. આઈ., જી. સી. આઈ. ઇ., એલએલ. ડી., એઓશ્રીએ કૃપાવંત થઈને બે લાખ રૂપિયાની જે રકમ અનામત મુકેલી છે તેના વ્યાજમાંથી “ શ્રી મયાજી સાહિત્યમાળા ” ઉપે વિવિધ વિષયોને લગતાં પુસ્તકો તૈયાર કરાવવામાં આવે છે.

તત્કાલ “ ઉદ્દલિબળેની ઉત્કાંતિ ” નામનું આ પુસ્તક લલિતાપ્રસાદ શ્રીપ્રભાદ દવે બી. એ., એલએલ. બી., બી. એસસી. એમની પાસે તૈયાર કરાવવામાં આવેલું તેને ઉક્ત માળામાં ૨૨૨મા પુષ્પઉપે પ્રમિદ્ધ કરવામાં આવે છે.

બાપાંતર સાખા, પ્રાચ્યવિદ્યા મંદિર, વડોદરા. તા. ૫-૧૦-૩૩	મં. ર. મજમુદાર બાપાંતર મદદનીશ	લા. કા. લાટે. વિદ્યાધિકારી. વડોદરા રાજ્ય.
---	----------------------------------	---

પ્રસ્તાવના.

આ પુસ્તક વનસ્પતિઓના જૂતકાળના ઇતિહાસને લગતું છે. જૂતકાલીન વનસ્પતિઓ તે તે સમયની પરિસ્થિતિને યોગ્ય હતી તેઓ પૈકી જે કુટુંબ તે પરિસ્થિતિને અત્યંત અનુકૂળ હતું, તેના સભ્યો પૃથ્વીના આખા પૃષ્ઠ ઉપર સંપાદાન ઇલાઈ જતા અને તે યુગની વનસ્પતિ-સૃષ્ટિમાં તેઓ જ એક સ્થાન ભોગવતા જુદા જુદા યુગોમાં જુદા જુદા વનસ્પતિ-કુટુંબોએ આ સ્થાન ભોગવ્યું છે.

પરિસ્થિતિને યોગ્ય થઈ પોતાનું જીવન ટકાવવા દરેક વનસ્પતિ-કુટુંબ પ્રયાસ કરે છે, અને એ રીતે પોતાના શરીરમાં તે વિવિધ નવા લક્ષણો ઉત્પન્ન કર્યા જાય છે. ઉત્પન્ન થયેલા એ લક્ષણો તે કુટુંબના વંશજોને વાગ્યામાં મળે છે. આ ક્રિયા થયા જ જાય છે. પરિણામે, ઘણી પેઢિઓ પસાર થયા પછી મૂળ જનક અને તેના અત્યંત દૂરનો વંશજ તેમના લક્ષણોમાં મહત્વનો ભેદ પ્રગટ કરે છે. આવા દરમિયાને ઉત્ક્રાંતિ કહે છે. પરિસ્થિતિને અનુસરી વાદરાઓના કુટુંબના કેટલાક સભ્યોએ નવા લક્ષણો ઉત્પન્ન કર્યા અને એ ક્રિયાને પરિણામે છેલ્લા વંશજો મનુષ્યો થયા. વિદ્વાન ઝાવિને સાબીત કર્યું છે, કે મનુષ્ય કોમન પ્રાર્વજો વાદરા હતાં.

એમ પણ બન્યું છે, કે પ્રગતિમાં આગળ થયેલા કેટલાક કુટુંબો પરિસ્થિતિ પ્રતિકૂળ થવાથી પોતાના અન્ય મિત્રોથી જીવન-કલ્પમાં પાછળ પડ્યાં, અને તેમના સભ્યોની વસ્તી ઘની નવી પરિસ્થિતિને યોગ્ય થવા માટે તેમને કેટલાક લક્ષણોનું રૂપાંતર કરવું

પડ્યું, અને તેથી તેમની અવનતિ થઇ. હાલમાં જગતી બતકી નામની સાદી વનસ્પતિ જેવી જાતની મધુષ્પ વનસ્પતિનો વંશજ છે.

જુદા જુદા સુગોમાં વિવિધ વનસ્પતિઓનું સ્વરૂપ કેવું હતું તે પૃથ્વીના ખડકોમાં દટાઇ રહેલા તેમના અવશેષો આપણને સ્પષ્ટ કહે છે. કેટલીક આબોમાં તેમનો ઇતિહાસ અપૂર્ણ અને તૂટક છે, તોપણ વિદ્વાનોએ તેમના અવશેષોનું ઉત્તમ અવલોકન કરી, ઘણી વાનો શોધી કાઢી છે. હાલની શાસ્ત્રીઓના નિર્દોષ જીવાપોહને પરિણામે સત્ય હકીકત પ્રાપ્ત થતી જાય છે.

ગુજરાતી ભાષામાં વિદ્વાનની પુસ્તકોની હજુ અછત છે. શ્રીમંત મહારાજ સાહેબે કંપાવંત થઇ તેમની પ્રમિદિ માટે જે મારી મખાવન કરી છે તેનો લાભ આપણે લેખક વર્ગ અવશ્ય લેતો રહે એ ઇચ્છવા જેવું છે.

વડોદરા રાજ્યના કેળવણી ખાતાના વડા અધિકારી, મે. કલાક સાહેબે આ પુસ્તક તૈયાર કરવાની તક આપી, તે દ્વારા ગુજરાતી ભાષાની સેવા કરવાની મને ઉત્તમ જોગવાઇ મેળવી આપી હતી, તેથી મદ્યત સાહેબનો અંતઃકરણપૂર્વક ઉપકાર માનું છું.

વડોદરા રાજ્યના કેળવણી ખાતાને અગ્રે કામ કરતી ભાષાન્તર શાખાએ ઘણા પારિભાષિક શબ્દો પૂરા પાડી, મારા કામમાં મને મારી મદદ કરી હતી, અને તેથી તે શાખાના કાર્યવાહકોનો પણ અગ્રે હું ઉપકાર માનું છું.

વડોદરા

તા. ૩૦-૯-૧૯૩૩

}

લલિતાપ્રસાદ શ્રીપ્રસાદ દવે.

સાંકળિયું

પ્રકરણ

પૃષ્ઠ

૧. ઉપોદ્ધાત—મહાન્ શાસ્ત્રી ડાવિંનનો વાદ—તેના પુરાવાનું સ્વરૂપ જીવશોધરૂપી લેખ. ૧
૨. મપુષ્પ વનસ્પતિઓની ઉત્ક્રાંતિનો પ્રશ્ન. ૨૮
૩. સપુષ્પ વનસ્પતિઓની ઉત્ક્રાંતિ અને પુરાવો. ૬૧
૪. ખીજધારી વનસ્પતિઓની ઉત્ક્રાંતિ. ૧૦૩
૫. વધારે જાંચી કેટિની અલિંગકોષધારી ઉદ્ભવિજાતોની ઉત્ક્રાંતિ—હંમરાજ વનસ્પતિઓ. ૧૪૪
૬. વધારે જાંચી કેટિની અલિંગકોષધારી ઉદ્ભવિજાતોની ઉત્ક્રાંતિ—સીતાદાર વનસ્પતિઓ. ૧૬૭
૭. વધારે જાંચી કેટિની અલિંગકોષધારી ઉદ્ભવિજાતોની ઉત્ક્રાંતિ—અપવુચી અને ગિંદનોફિસ. ૨૦૯
૮. ઉપમંદાર. ૨૩૯
પારિભાષિક શબ્દકોષ. ૨૬૨

ઉદ્ભિન્નજોની ઉત્કાંતિ.

પ્રકરણ ૧ લું.

ઉપોદ્ધાત-મહાન્ શાસ્ત્રી હાર્વિનનો વાદ-તેના
પુરાવાનું સ્વરૂપ-જીવશેષ (ફોસીલ)
રૂપી લેખ.

‘ હાલમાં પૃથ્વી ઉપર વસતાં અસંખ્ય પ્રાણીઓ અને વનસ્પતિઓ પ્રથમ કેવી રીતે ઉત્પન્ન થયાં ? ’ એ પ્રશ્નનો ખુલાસો ઉત્કાંતિવાદ (ઇવોલ્યુશન) કરે છે. અનેક નિપુણ પ્રકૃતિવિદ્યાલિંગોની (નેચરેલિસ્ટ્સ) લાંબા સમયથી એવી માન્યતા હતી કે આ સ્વાભાવિક પ્રશ્નનો ખુલાસો થવો અશક્ય છે.

વાસ્તવિક રીતે, જંગલી પ્રાણીઓ અને વનસ્પતિઓની વિવિધ જાતોની ઉત્પત્તિ સંબંધે આપણને પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન નથી; તોપણ, આપણને પરિચિત અને ઘણીવાર પરસ્પર બહુજ સિદ્ધિ એવી અનેક સજીવ વસ્તુઓના થોડા ઘણા ઇતિહાસથી આપણે વાકેફ છીએ. જમીનને ખેડી કૃત્રિમ રીતે ઉછેરેલી

વનસ્પતિઓ અને પાણેલાં પ્રાણીઓના જીવન સંબંધે આપણને સાફ જ્ઞાન છે. માત્ર વનસ્પતિઓ સંબંધે જ વાત કરીએ તો, ગુલાબ (રોઝ) અને પારસપીપળો (ટયુલિપ), ખટાટા (પોટેટોઝ) અને પાર્સનીપ્સ, ઘંઉ (વ્હીટ) અને ઓટસ અને તેમની વિવિધ જાતો અને ઉપજાતો, સર્વે જંગલી ઉપજાતોમાંથી ઉત્પન્ન થયેલી છે. આ જંગલી જાતો, તેમના માંથી જ કૃત્રિમ રીતે ઉછેરેલી ખાગાયત કે ખેતરની જાતોથી ઘણી વાર બહુ જ ભિન્ન હોય છે. કૃત્રિમ રીતે ઉછેરેલી આ વનસ્પતિઓ તેમની પૂર્વજ જંગલની વનસ્પતિઓમાંથી ‘કેવી રીતે’ ઉત્પન્ન થઈ એ પ્રશ્નનો આપણે વિચાર કરીશું નહિ, કારણ કે એ વાર્તા બહુ લાંબી અને ગુંથવાડા ભરેલી છે, અને તેની સૂક્ષ્મ જાણતોનો સંપૂર્ણ વિચાર કરવો હમેશાં કઠણ હોય છે. દાખલા તરિકે, ઘંઉની વનસ્પતિ, જે ઉછેરેલી સર્વે વનસ્પતિઓમાં આપણને બહુ જ અગત્યની છે તેની ઉત્પત્તિ લાંબા સમયથી અગમ્ય છે, અને હજુ મુખી આપણને તેનું સ્વરૂપ સંપૂર્ણ રીતે સમજાયું નથી. સ્ટ્રેફનામનો વિદ્વાન શાસ્ત્રી આપણને કહે છે, કે હાલમાં ઉછેરાતી ઘંઉની વનસ્પતિ ચાર આઘ ઉપજાતોમાંથી ઉત્પન્ન થયેલી છે. થોડાંજ વર્ષ થયાં આપણને જણાયું છે, કે જે જંગલી ઘંઉની વનસ્પતિમાંથી હાલની કઠણ ઘંઉ (હાર્ડ વ્હીટ) અને તેની બીજી ઉપજાતો ઉત્પન્ન થયેલી છે, તેના નાના છોડ હાલમાં પણ પેલેસ્ટાઇનમાં (એશિઆઈ તુર્કેસ્તાન) હર્મોન પર્વતના ઢોળાવ ઉપર ઉગે છે. નરમ ઘઉં (સોફ્ટ વ્હીટ) કઈ જંગલી

વનસ્પતિમાંથી ઉત્પન્ન થઈ છે તેની હજી મુખી આપણને કાંઈ માહિતી નથી.

જો જાળતનો ચોક્કસ ખુલાસો કરવામાં ગમે તેટલી મુશ્કેલીઓ હોય, તોપણ આપણે એટલું તો જાણીએ છીએ, કે કૃત્રિમ રીતે ઉછેરેલી જમી વનસ્પતિઓ તેમની પૂર્વજ જંગલની વનસ્પતિઓનું રૂપાંતર થઈ ઉત્પન્ન થયેલી છે. એવી જાતની ઉત્પત્તિને ઉત્ક્રાંતિ કહે છે, અને હવે આપણે એવા નિર્ણય ઉપર આવીએ છીએ, કે જેમની ઉત્પત્તિ સંબંધે આપણને જ્ઞાન છે એવી સર્વે વનસ્પતિઓ તેમની પૂર્વજ અન્ય વનસ્પતિઓમાંથી ઉત્ક્રાંત થયેલી છે.

ઉછેરેલી વનસ્પતિઓનું અને જંગલી વનસ્પતિઓનું સ્વરૂપ સમાન હોતું નથી, કારણકે તેઓ લિન્ન લિન્ન પરિસ્થિતિમાં ઉગેલી છે; તોપણ કેટલાક પુરાવાને આધારે આપણે એવું ચોક્કસ અનુમાન કરી શકીએ છીએ, કે મનુષ્યની આંખ અને હાથથી અલગ રહેલી આ જંગલની વનસ્પતિઓ પણ તેમની પૂર્વજ વનસ્પતિઓનું રૂપાંતર થઈ ઉત્પન્ન થયેલી છે, અને વિચારમાળામાં એવી જ રીતે આગળ વધતાં આપણે અતિભૂતકાલીન આદ્ય વનસ્પતિઓ સૂધી આવી પહોંચીએ છીએ. ઉત્ક્રાંતિવાદ સત્ય અને વિશ્વસનીય છે એવું લોકોને ખતાવી આપનાર મહાન્ ડાર્વિને જ પ્રથમ આવો તર્ક કર્યો. ડાર્વિન કહે છે, કે ‘વિવિધ શાસ્ત્રીય અવલોકનની શરૂઆતમાં જ મને એમ સમજાયું કે પાળેલાં પ્રાણીઓ અને ઉછેરેલી વનસ્પતિઓનો કાળજીપૂર્વક અભ્યાસ કરવાથી આ અગમ્ય

પ્રશ્નનો ખુલાસો થવા સંભવ છે. હું એ પ્રયાસ કરવામાં નાસી-પાસ થયો નહિં....મને હમેશાં એમ સમજાયું છે, કે મનુષ્યના સહવાસથી પ્રાણીઓમાં જે લેદોદ્લેદ (વેરિએશન) થાય છે, તે સંબંધે આપણું જ્ઞાન અપૂર્ણ છે, અને તોપણ અંતિમ રહસ્યની સમજૂતી માટે એ જ્ઞાન એક ઉત્તમ અને સચોટ ફૂંચી છે. ' (ઉપજાતોની ઉત્પત્તિ, પૃષ્ઠ ૩ જી)

‘ઉપજાતોની ઉત્પત્તિ’ નામના ડાર્વિનના પુસ્તકમાં આ વિષયને જ લગતાં ઘણાં અગત્યનાં પ્રકરણો છે, તોપણ, એ વિષયનું સંપૂર્ણ સ્વરૂપ તો તેણે ‘પાળેલાં પ્રાણીઓ અને ઉછેરેલી વનસ્પતિઓ’ નામના પુસ્તકમાં પાછળથી આલેખેલું છે.

ડાર્વિનનો વાદ માત્ર એટલું જ કહી બેસી નથી રહેતો કે, સજીવ વસ્તુઓમાં ઉત્કાંતિ થતી આવી છે, અને થાય છે; પણ સાથે સાથે તે ઉત્કાંતિના દૃશ્યનો ખુલાસો પણ આપે છે. એવા ખુલાસા સિવાય, તેની અત્યંત મંબંધે શાસ્ત્રીઓની અને દુનિયાની કદિ પણ ખાત્રી થાત નહિં.

‘ડાર્વિનનો મત’ એ નામથી હાલમાં પ્રસિદ્ધ પામેલો વાદ પ્રથમ ઇ. સ. ૧૮૫૮ ના જુલાઈની ૧ લી તારીખે જાહેરમાં આવ્યો. એ દિવસે લિનિયસની સભામાં ડાર્વિન અને વૉલેસે ‘નવી જાતો ઉત્પન્ન કરવાનું ઉપજાતોનું વલણ, અને નૈસર્ગિક સંવરણને (નેચરલ સિલેક્શન) લીધે ઉપજાતો અને આ નવી જાતોની સતત ઉત્પત્તિ’ એ વિષય ઉપર નિબંધ વાંચ્યો. બીજે વર્ષે ડાર્વિને આ વાદનો ‘સંક્ષિપ્ત ખુલાસો’ પ્રસિદ્ધ

કર્યો, અને એ પુસ્તકનું નામ તેણે આવું રાખ્યું: ‘ નૈસર્ગિક સંવરણના સાધનથી ઉપજતોની ઉત્પત્તિ, અથવા જીવનકલહમાં વિજયવંત થતી જતોનું સંરક્ષણ ’. પ્રસ્તુત પ્રાણી અથવા વન-સ્પતિને જે ભેદોદ્ભેદો લાલકારક હોય છે તેમની કુદરતનાં સાધનો પસંદગી કરે છે, અને એજ ડાર્વિનના વાદનું મુખ્ય સ્વરૂપ છે. એજ વાત ડાર્વિન આપણને આ રીતે કહે છે: ‘ દરેક ઉપજાત ઘણી વ્યક્તિઓને જન્મ આપે છે, પણ એ સર્વે પૈકી માત્ર થોડીજ વ્યક્તિઓ જીવવાને લાગ્યશાક્તી બને છે; તેમજ એ વ્યક્તિઓમાં જીવનકલહ પણ ઘણીવાર વધારે બળવાન અને તીવ્ર હોય છે; આ બન્ને કારણોને લીધે એવું સ્પષ્ટ અનુમાન થાય છે, કે પોતાને કોઈ પણ રીતે જરા પણ અનુકૂલ હોય એવા ભેદોદ્ભેદવાળી વ્યક્તિને જીવનના ગૂઢ અને ઘણીવાર વિકા-રશીલ સંયોગોમાં મરણથી બચી જવાનો વધારે મારો સંભવ રહે છે, અને એ રીતે કુદરતના સંયોગો સ્વાભાવિક રીતેજ તેની પસંદગી કરે છે. અન્વયના (હેરિડિટી) સળગ સિદ્ધાંતને આધારે, કોઈ પણ પસંદ થયેલી ભેદોદ્ભેદવાળી વ્યક્તિ પોતાના જેવી જ નવી વ્યક્તિઓ ઉત્પન્ન કર્યાં જશે ’ (ઉપજતોની ઉત્પત્તિ પૃષ્ઠ ૩ જી). ‘ જુદી જુદી વ્યક્તિઓના અનુકૂલ વિશિષ્ટ લક્ષણો અને ભેદોદ્ભેદોના આ સંરક્ષણને અને હાનિકારક લક્ષણોના ઉચ્છેદને ગેં નૈસર્ગિક સંવરણ અથવા ‘ અતિયોગ્યનું દીર્ઘાયુ: એવું નામ આપેલું છે ’ (એ જ પુસ્તક પૃષ્ઠ ૬૩ મું).

ડાર્વિનને ‘ સંવરણ ’ શબ્દ વધારે પસંદ હતો, કારણ

કે ઉછેરને લગતાં બધાં પુસ્તકોમાં હમેશાં તેનો જ ઉપચાર થતો હતો. યાદ નામનો એક કૃપિવિદ્યાલિંગ (એગ્રીકલ્ચરિસ્ટ) કહે છે, કે ‘સંવરણના સાધનથી ચતુર ખેડુત પાળેલાં પ્રાણીઓના સ્વરૂપમાં વિકાર ઉત્પન્ન કરી કેટલીકવાર તેનું તદ્દન રૂપાંતર કરી શકે છે.’ આગાયત વનસ્પતિઓ, અને ખેતરના પાકનું પણ એ જ પ્રમાણે રૂપાંતર થઈ શકે છે. આ બધી બાબતોમાં મુખ્ય વાત એ ધ્યાનમાં રાખવાની છે, કે ઉછેરના કાર્ય માટે પસંદ કરેલાં દરેક જાતનાં પ્રાણી કે વનસ્પતિઓ ઉત્તમ હોવાં જોઈએ; એટલે, નવી ઉત્પન્ન થનાર વ્યક્તિમાં જે ખાસ લક્ષણો પ્રગટ કરવા માળી ઇચ્છતો હોય, તેમને જ ઉદ્દેશી જનક વ્યક્તિઓની તેણે પસંદગી કરવી જોઈએ. દાખલા તરિકે, ઘેટાંની બાબતમાં સરસ ઉન, ફળની બાબતમાં કંદ અને સ્વાદ, અને ફૂલની બાબતમાં મુંદર રંગ એ જ તરફ માળીઓનું લક્ષ હોય છે.

હાર્વિન કહે છે કે ‘મનુષ્ય જાતની પસંદગી કેવળ પોતાના જ લાલને ઉદ્દેશી થાય છે, અને કુદરતની પસંદગીનું લક્ષ્ય રૂપાંતર પામતી વ્યક્તિનો જ લાલ હોય છે’ (એજ પુસ્તક પૃષ્ઠ-૬૫). ‘પોતાનાં બીને પવનથી વધારે ને વધારે દૂર ફેલાવવામાં જ જો કોઈ વનસ્પતિને લાલ હોય, તો નૈસર્ગિક સંવરણનું દૃશ્ય એ જ લાલને ઉદ્દેશી તે વ્યક્તિમાં તેવું રૂપાંતર સહેલથી ઉત્પન્ન કરે છે, પણ કપાસનો ખેડુત છંડવાંના રૂની પસંદગી કરી તેમને એટલી મહેલાઈથી મુધારી શકતો નથી’ (એ જ પુસ્તક પૃષ્ઠ ૬૭ મું). ‘નૈસર્ગિક

સંવરણ' એ શબ્દ ખરેખર અલંકારિક છે; કુદરતમાં, કોઈ વિચારશીલ સજીવ વસ્તુ પસંદગી કરતી નથી; પણ, જમીનનું સ્વરૂપ, આબોહવા, અને સહવાસી સજીવ વસ્તુઓ વિગેરે જીવનના બધા સંયોગો એ સ્થળે વસતી સજીવ વ્યક્તિઓ પૈકી જેઓ પોતાને ઉત્તમ રીતે યોગ્ય બનેલી હોય તેમને જ લાંબો સમય જીવવા દે છે.

જે વિશિષ્ટ લક્ષણોમાં એક વ્યક્તિ અન્ય વ્યક્તિથી જુદી પડે છે તેમનો સમાવેશ પણ ડાર્વિન લેદોદ્લેદોમાં જ કરે છે. આ લેદોદ્લેદો હાનિકારક, ઉદાસીન કે લાભકારક હોય છે. પસંદગીના સતત કાર્યથી લાભકારક લેદોદ્લેદો જીવંત રહે છે, અને ઉત્ક્રાંતિનો આધાર પણ એ જ નૈસર્ગિક સંવરણ ઉપર છે. એ રીતે, ઉત્ક્રાંતિના કાર્યનો અને અનુવિધાનની (એડેપ્ટેશન) આટલી મહત્તાનો વાસ્તવિક ખુલાસો પ્રથમ આપણને ડાર્વિનના જ વાદથી મળ્યો. બધી સજીવ વસ્તુઓનું સર્વ સામાન્ય લક્ષણ આ છે: તેમની અખિલ શરીરઘટના એવાં યંત્રો અને યોજનાઓની બનેલી છે, કે તેઓ પોતાનું જીવન સારી રીતે પસાર કરે છે, અને વંશજોને પાછળ મૂકી તેઓ નિશ્ચિંતે મરી જાય છે. આખી જીવવિદ્યા (બાયોલોજી) અનુવિધાનના દૃશ્યને ઉત્તમ રીતે પ્રગટ કરે છે. સર્વને પરિચિત હોય એવાં વનસ્પતિનાં અનુવિધાનનાં દૃષ્ટાંતો કાંઈ ઓછાં નથી. ઝૂકશાંગ (અર્ચિંગ) અને સ્નેહનામની વનસ્પતિનાં ફૂલમાં જીવડાંના સાધનથી અન્યોન્યફલન (ક્રોસ ફર્ટિલિઝેશન) થવા માટે કેવી સુંદર વ્યવસ્થા હોય છે !

ડેન્ડિલિઅન, બેડસ્ટ્રો અને બેલસામ નામના છોડનાં બી અથવા બીજાપુટ તેમની સરસ ઘટનાને લીધે જનક વનસ્પતિથી બહુજ દૂર જઈ શકે છે. વર્જિનિઅન કીપર, રાનબાઈ (કિલમેટિસ) અને હુદેલા (આઈવી) વેલાઓને બીજાં વૃક્ષો ઉપર ચઢી જવા માટે જે અદ્ભુત અવયવો હોય છે તે પણ અનુવિધાનનાં રમુજ દષ્ટાંતો છે.

વિદ્વાન પેલિની એવી માન્યતા હતી, કે કુદરતની ચિત્ર વિચિત્ર યોજનાનું કારણ સજીવ વસ્તુઓનાં અનુવિધાન છે. કુદરતી દશ્યોના આધારથી, આ અનુવિધાનોની ઉત્પત્તિનો 'સંતોષકારક ખુલાસો હાલમાં માત્ર ' નૈસર્ગિક સંવરણનો ' જ વાદ કરી શકે છે. એ બાબતમાં વિદ્વાન વિલિઅમ થીસલ-ટન-ડાયરનો આવો મત છે: 'કોઈ પ્રશ્ન સંબંધે એક યુગના શાસ્ત્રીઓનો વિચાર તે લવિધ્યના યુગના વિદ્વાનોના તર્કની આધારભૂત વસ્તુ બને છે. પેલિ અને ડાર્વિન બન્ને એકજ પાઠશાળામાં કામ કરતા હતા, અને ડાર્વિન પેલિની પ્રત્યે હંમેશાં માનની લાગણીથી ભેરેતો હતો. પેલિના આખા હેતુ-વાદનું (ટેલિઓલોજી) તેણે મનન કર્યું હતું, પણ પેલિએ કરેલો કુદરતી દશ્યોનો દૈવી ખુલાસો તેને કબૂલ ન હતો.

કુદરતનું દરેક દશ્ય કોઈ પણ હેતુની સિદ્ધિને ઉદ્દેશીને જ થાય છે, અને હેતુવાદ એજ માન્યતાને બહેર કરે છે. એ વાદ સજીવ વસ્તુઓને લાગુ કરીએ તો તે અનુવિધાનની જ કલ્પના બને છે. તોપણ, આપણે એ વાત ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની છે, કે ડાર્વિનના મત પ્રમાણે, જે ગ્રાણી અથવા વનસ્પ-

તિના શરીરમાં એ અનુવિધાન ઉત્પન્ન થાય છે, તેને જ તે લાલ કરે છે, અને તેનો હેતુ મનુષ્ય કોમનો લાલ નથી. એ વાત સત્ય છે, કે આ બન્ને વસ્તુઓ ઘણીવાર સાથે સાથે કાર્ય કરે છે; કારણ કે કઈ સજીવ વસ્તુઓ જીવશે અને કઈ મરી જશે તેનો નિર્ણય ઘણું અંશે માણસ જ કરે છે. દાખલા તરીકે, એશિયાખંડના થોડા છુટા છવાયા પ્રદેશોમાં ઉગનારી ઘંઉની વનસ્પતિ ઘણી જંગલની વનસ્પતિઓને હાંકી કાઢી પૃથ્વીના મોટા ભાગમાં પ્રસરી ગયેલી છે, અને એમ થવાનું કારણ માત્ર એટલું જ કે મનુષ્ય કોમે એ વનસ્પતિને પોતાના ખોરાક તરીકે પસંદ કરી. હાલના સમયમાં તો અમંજ્ય પ્રાણીઓ અને વનસ્પતિઓ પૈકી જીવનકલહમાં કોણ કોણ કેટલો વિજય મેળવશે તેનો આધાર અમુક સજીવ વસ્તુ માણસને કેટલી ઉપયોગી છે તેના ઉપર છે.

‘ નૈસર્ગિક સંવરણ ’ ડાર્વિનની દૃષ્ટિએ કેટલું મહત્વનું હતું તે આપણને નીચેના ફકરા ઉપરથી સમજાશે.

‘ સંવરણનું કાર્ય ધીમું હોવા છતાં પણ બે નિર્બળ મનુષ્ય કૃત્રિમ પસંદગીથી સજીવ વસ્તુઓનું ઘણું રૂપાંતર કરી શકે છે, તો ‘ અતિયોગ્યનું દીર્ઘાયુ: ’ એ ન્યાયથી, એટલે, કુદરતની પસંદગી કરવાની શક્તિને લીધે, બહુજ લાંબા સમયથી સર્વે સજીવ વસ્તુઓ જીવનના ભૌતિક (ફીઝિકલ) સંયોગોની સાથે, અને માંહે માંહે એક બીજાની સાથે, જે અનુવિધાનો ઉત્પન્ન કરતી આવી છે, તેમની અગમ્યતા અને સૌંદર્ય, તેમજ ઉત્પન્ન થયેલા રૂપાંતરની ધંપતા, ખરેખર

અનંદ હોય એ સ્વાભાવિક છે. ’ (ઉપજાતોની ઉત્પત્તિ, પૃષ્ઠ ૮૫ મું).

નૈસર્ગિક સંવરણનો વાદ જ્યારથી પ્રથમ પ્રસિદ્ધિમાં આવ્યો ત્યારથી તે ટીકાને પાત્ર બન્યો છે. તોપણ, ઘણા પ્રતિપક્ષીઓ એ વાદનું રહસ્ય સમજી શક્યા નથી. ઇ. સ. ૧૯૦૮ માં મી. ફ્રાન્સીસ ડાર્વિન કહે છે, કે ‘ નૈસર્ગિક સંવરણનું મહાન દૃશ્ય માત્ર એક નિષેધક (નેગેટિવ) શક્તિ છે એમ હાલમાં ઘણા શાસ્ત્રીઓ માને છે. પચાસ વર્ષ ઉપર પણ એવી જ માન્યતા હતી. ’ એટલે, લોકો માને છે, કે, અયોગ્યનો નાશ કરવા ઉપરાંત ‘ નૈસર્ગિક સંવરણ ’ બીજું કંઈ જ વધારે કાર્ય કરતું નથી. તોપણ કૃત્રિમ અને નૈસર્ગિક સંવરણની વચ્ચે યથાર્થ સાદૃશ્ય હોય તો એ વાત સ્પષ્ટ છે, કે એ શક્તિ સત્ય છે; એટલે, જેમ મનુષ્યની પસંદગીથી ઉછેરેલી સજીવ વસ્તુઓ તેમની જરૂરીઆતો માટે સંપૂર્ણ રીતે યોગ્ય હોય છે, તેમજ નૈસર્ગિક સંવરણ પણ એવી નવી સજીવ વસ્તુઓ ઉત્પન્ન કરી શકે છે, કે જેમનાં અવયવો તેમની પોતાની હાજતો સંતોષવાને સંપૂર્ણ રીતે યોગ્ય હોય.

ડાર્વિન જાતે પણ એવું કદિ માનતો ન હતો, કે નૈસર્ગિક સંવરણ ઉત્ક્રાંતિનું કેવળ સાધન છે. તેનું ચોક્કસ કહેવું છે, કે ‘ એ દૃશ્ય રૂપાંતરનું એક અતિ અગત્યનું સાધન છે, અને તે રૂપાંતરનું કેવળ સાધન નથી ’ (ઉપજાતોની ઉત્પત્તિ,

પૃષ્ઠ ૪ થું). બીજાં કારણોએ પણ ઉત્કાંતિના કાર્યમાં લાગેલીધો હોય એમ સંભવે છે.

તોપણ, લેખકનો આશય ઉત્કાંતિનાં કારણભૂત દૃશ્યો ગણાવવાનો નથી. તે તો માત્ર એટલું જ સ્પષ્ટ કરવા ઇચ્છે છે, કે નૈસર્ગિક સંવરણ ઉત્કાંતિનું કેવળ નહિ, પણ એક મહત્વનું કારણ છે, એવું પ્રથમ જાહેર કરનાર શાસ્ત્રી વિદ્વાન્ ડાર્વિન હતો; અને તેની શોધને પરિણામે ઉત્કાંતિનો વાદ વિશ્વાસપાત્ર બની આખરે સર્વાનુમતે સ્વીકારાયો.

ઉદ્ભૂતિજ્ઞોની ઉત્કાંતિના ક્રમને ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ અનુસરવું ખરેખર બહુ જ કઠણ છે, તોપણ, પાછલાં થોડાં વર્ષનાં સંશોધનોને પરિણામે તેની ઘણી બાબતો ઉપર સારો પ્રકાશ પડ્યો છે. આ પુસ્તકનું લક્ષ્ય એ જ, હેતુની સિદ્ધિ છે, તોપણ જે વનસ્પતિ સમૂહોના સંબંધે આપણી પાસે બહુજ સંતોષકારક પુરાવો છે, માત્ર તેમની જ ઉત્કાંતિને આપણે તપાસીશું. સામાન્ય રીતે, આ સમૂહો બહુ જ ઊંચી કોટિના છે, અને વળી તેઓ આપણને બહુ જ પરિચિત છે.

જે પુરાવાને આધારે આપણે એ ક્રમને અનુસરવાનું છે તેનું જ્ઞાન આપણને હાલની જીવંત વનસ્પતિઓના તુલનાત્મક, અભ્યાસમાંથી મળ્યું છે. પાછલાં બે સૈકાંઓમાં, વિદ્વાનોએ બહુ પ્રયાસ કરી વનસ્પતિઓનો પરસ્પર સંબંધ શોધી કાઢ્યો, અને પછી તેમણે તેમનું યોગ્ય વર્ગીકરણ કર્યું. એ કામ ખરેખર સફળ નિવડ્યું છે, અને વર્ગીકરણ થવાથી વનસ્પતિઓ કુટુંબોમાં વહેંચાઈ ગઈ છે. બે ઉત્કાંતિવાદ સત્ય હોય,

તો એ કુટુંબોના સભ્યો મનુષ્યના કુટુંબની પેઠે જ, પરસ્પર સંબંધ ધરાવે છે, ફેર માત્ર એટલો જ છે કે તેમનો એ સંબંધ વધારે દૂરનો હોય છે. બદ્ધે, એક કુટુંબની વનસ્પતિઓ અન્ય કુટુંબના સભ્યોની સાથે જેટલો સંબંધ ધરાવે છે તેના કરતાં પોતાના જ કુટુંબના સભ્યોની સાથે તેઓ વધારે નિકટનો સંબંધ પ્રગટ કરે છે; અને એજ રીતે એક વર્ગનાં કુટુંબો અન્ય વર્ગનાં કુટુંબોની સાથે જેટલો સંબંધ બતાવે છે તેના કરતાં પોતાના જ વર્ગનાં કુટુંબોમાં તેઓ વધારે ઘાઢ સંબંધથી જોડાયેલાં હોય છે.

તોપણ, આ બાબતમાં ઘણી ચુસ્કેલીઓ છે; આપણે કહેલું વર્ગીકરણ કુદરતી છે એવી આપણને ચોક્કસ ખાતરી નથી, અને કદાપિ એ વર્ગીકરણ કુદરતને અનુસરીને થયેલું હોય, તોપણ, એ સમૂહોના સાધનથી ઉદ્ભિન્નજ્ઞેનું વંશાવતરણ નક્કી કરવું સહેલ નથી. ઉદ્ભિન્નજ્ઞેનો જીવન-ધૃતિહાસ અને તેમના શરીરની ઘટના એ બન્નેના તુલનાત્મક અભ્યાસથી આપણને એ સંબંધે ઘણી માહિતી મળી છે. હંસરાજ (ફર્ન) વિગેરે ઉંચી કોટિની અપુષ્પ કે પ્રચ્છન્નખીન વનસ્પતિઓ (ક્રિપ્ટોગેમ્સ) અને સપુષ્પ વનસ્પતિઓ કંઈ કંઈ મુખ્ય બાબતોમાં પરસ્પર સંબંધ ધરાવે છે તે વાત હાઈમિસ્ટર નામના વિદ્વાને ૬૦ વર્ષ ઉપર બહેર કરી. પ્રચ્છન્નખીન અને લીલ (મોસીસ) વનસ્પતિઓનો સંબંધ પણ કેટલેક અંશે તેણેજ શોધી કાઢ્યો. આ મહાન વનસ્પતિસમૂહોના પરસ્પર સંબંધ વિષે આપણે જે કાંઈ બાણીએ છીએ તે સર્વાની

આધારભૂમિ એ મહાન્ વિદ્વાનનો શાસ્ત્રીય પ્રયાસ છે. પણ અવતરણને લગતા પ્રશ્નોની બાબતમાં હાલની જીવંત વનસ્પતિઓનો તુલનાત્મક અભ્યાસ આપણને બહુ ઉપયોગી નથી, કારણકે એ બધી વનસ્પતિઓ લગભગ સમકાલીન અને સમપ્રાચીન છે, એ બધી સજીવ વસ્તુઓ એકજ યુગની છે. હોર્મીસ્ટરના તુલનાત્મક અવલોકનથી આપણને સમજાયું, કે શંકુધારી (કૉનિક્સ) વિગેરે વનસ્પતિઓ ઉંચી કોટિની પ્રચલ્નબીજ વનસ્પતિઓમાંથી ઉતરી આવેલી છે, તોપણ, એ વાત સ્પષ્ટ છે, કે તેઓ હાલની જીવંત પ્રચલ્ન-બીજની કે તેમને બહુજ મળતી આવતી અન્ય ઉદ્ભિન્નજેની વંશજો નથી. શંકુધારી વનસ્પતિઓની પેઠે હંસરાજ અને સીતાહાર (કલગમ્બાસીસ) વનસ્પતિઓ પણ ગત યુગોમાં બદલાયેલી છે, તોપણ, તેમનું રૂપાંતર સહેજ જોણું છે. હાલની સજીવ વનસ્પતિઓના તુલનાત્મક અભ્યાસથી આપણે જો કેઈ પણ સત્ય નિર્ણય ઉપર આવી શકીએ તો તે આ છે: એક સમૂહના (જેને આપણે ઉંચી કોટિનો સમૂહ કહીએ છીએ) પૂર્વજો અન્ય સમૂહના (જેને આપણે નીચી કોટિનો સમૂહ કહીએ છીએ) સભ્યોને થોડે ઘણે અંશે સમાન હતા.

તોપણ, ‘ઉંચી કોટિ’ અને ‘નીચી કોટિ’ નો વિચાર આપણને ભૂલ ખવરાવે એવો છે. ઘણા લોકોનું એવું ધારવું છે, કે ઉંચી કોટિના સભ્યો બનવા માટે નીચી કોટિના સભ્યો જે પ્રગતિ કરે છે તેને, અથવા, સરળ ઘટનાવાળું અવયવી કિલ્લ ઘટનાવાળું અવયવી થવા માટે જે

પ્રગતિ કરે છે તેને ઉત્કાંતિ કહે છે; અને તેથી તેઓ એમ સ્વીકારી લે છે, કે સરળ ઘટનાવાળો વનસ્પતિ સમૂહ તેની સાથે સંબંધ બતાવનાર વધારે ક્લિષ્ટ ઘટનાવાળા વનસ્પતિ સમૂહનો પૂર્વજ છે; તોપણ ઘણીવાર, એનાથી ઉલટી જ વાત સત્ય હોય છે.

દાખલા તરીકે, શરૂઆતનો વિદ્યાર્થી સ્વાભાવિક રીતે એમ ધારે, કે બતકી (હકવીડઝ) નામની સપુષ્પ વનસ્પતિ જેની શરીરઘટના શસ્કશૈલ (લીવરવટર્ઝ)ના જેટલી જ સરળ છે, અને જેના થડ અને પાંદડાની વચ્ચે નિયમિત અને સ્પષ્ટ ભેદ નથી, તે સપુષ્પ વનસ્પતિઓનાં ઉંચી કોટિનાં કુટુંબોની ઉત્કાંતિમાં આદ્ય અને પૂર્વજ કલા છે. તોપણ, બધા ઉદ્દલિન્ગવિદ્યાભિજ્ઞોએ હાલમાં એકમતે કબૂલ કર્યું છે, કે બતકી વસ્તુતઃ જલવાસી ઉદ્દલિન્ગજ્ઞેનું એક અવનત સ્વરૂપ છે; તેનો જીવનક્રમ લિન્ન હોવાથી ઉંચી કોટિની ઉદ્દલિન્ગજ્ઞેમાંથી તેની અધોગતિ થયેલી છે; અને તે વનસ્પતિ નક્કી આદ્ય કે પૂર્વજ નથી. બતકીની બાબતમાં તો બધા શાસ્ત્રીઓ એકમત છે, પણ એવી જ બીજી ઘણી વનસ્પતિઓ છે, કે જેમની બાબતમાં સરલ ઘટનાં પ્રાચીનતા અને આદ્ય વસ્તુતું લક્ષણ છે, કે તે ઉંચી કોટિમાંથી થયેલી અવનતિનું ચિહ્ન છે તેનો નિર્ણય વિદ્વાનો એકમતે કરી શક્યા નથી.

હંસરાજ વિગેરે પ્રચલ્નખીજ વનસ્પતિઓ અને લીલ વિગેરે રક્ષાચિની (પ્રાયોફાઇટા) વનસ્પતિઓની વચ્ચે કથો

સંબંધ છે તે હવે આપણે જોઈએ. લીલના વર્ગથી હંસરાજનો વર્ગ ખરેખર ઉંચી કોટિનો છે, અને ઘણા ઉદ્દલિંગ-વિદ્યાલિંગોની એવી માન્યતા છે, કે હંસરાજ વિગેરે વનસ્પતિઓ સ્કાયિની કે તેના જેવી જ અન્ય વનસ્પતિઓમાંથી ઉત્ક્રાંત થઈ છે. પણ, હવે આ મતનો તિરસ્કાર થયો છે, અને આધુનિક શાસ્ત્રીઓને એ વાત વધારે સંભવિત લાગે છે, કે ઉંચી કોટિની પ્રચલ્નખીજ વનસ્પતિઓ સ્કાયિની વર્ગના સહયોગી વધારે પ્રાચીન અને આદ્ય છે, અને વધારે ઉંચી કોટિના કોઈ અન્ય પૂર્વજોની અવનતિ થઈ તેઓ ઉત્પન્ન થયેલી છે (૮ મું પ્રકરણ જુઓ).

જેમાં કોપેશ (ન્યુક્લીઅસ)ની હાજરી પણ ચોક્કસ રીતે સ્પષ્ટ થઈ શકતી નથી, એવાં માત્ર એક જ કોષના શરીરવાળાં વેત્રાંકુરો (એક્ટેરિઆ)ની બાબતમાં પણ, તેઓ આદ્ય સ્વરૂપ છે કે ઉંચી કોટિનાં ઘટિતાંગીઓની અવનતિનું પરિણામ છે તેનો નિશ્ચય કરવો સહેલ નથી; તોપણ, ઘણે ભાગે તેઓ ઉંચી કોટિનાં અધોગતિ પામેલાં સ્વરૂપ છે.

તોપણ, આ પુસ્તકની શરૂઆતમાં આપણે જોઈ ગયા તે પ્રમાણે, માત્ર એક જાતની વનસ્પતિઓના સંબંધે આપણે જરા પણ ભૂલ કરીએ તેમ નથી; કૃત્રિમ રીતે ઉછેરેલી વનસ્પતિઓ નિઃસંદેહ તેમને મળતી આવતી જંગલની વનસ્પતિઓમાંથી જ ઉતરી આવેલી છે. આ વાત પણ હમેશાં નક્કી નથી; ઘંઉના ઇતિહાસને અનુસરતાં

આપણે એ વાત ધ્યાનમાં રાખવાની છે, કે હાલમાં જંગલી મનાતી જાત ભૂત કાળમાં કૃત્રિમ રીતે ઉછેરાતી હોય, અને ભવિષ્યમાં મનુષ્યની તેની તરફ બેઠરકારી થવાથી તે ફરીથી જંગલી બની હોય. જો કોઈ ઉછેરેલી વનસ્પતિના ઇતિહાસથી આપણે વાકેફ હોઈએ તો આપણે માત્ર તેની જનક વનસ્પતિને ચોક્કસ રીતે શોધી કાઢીએ. તેથી હવે આપણે મુખ્ય મુદ્દા ઉપર આવ્યા. આ બાબતમાં ઐતિહાસિક પુરાવાની આપણને ખાસ જરૂર છે. ઉછેરેલી વનસ્પતિઓના દૃષ્ટાંત ઉપરથી આપણને સમજાય છે, કે વનસ્પતિઓના અવતરણ ક્રમના ચોક્કસ જ્ઞાનને માટે તેમના ભૂતકાળના ઇતિહાસ સંબંધે આપણને કાંઈક માહિતી હોવી જ જોઈએ; એ બાબતમાં ખરેખરા પ્રત્યક્ષ પુરાવાની ખાસ જરૂર છે.

આપણી પાસે આવો ઘણો ઐતિહાસિક પુરાવો છે, ઉત્કાંતિના ઇતિહાસમાં ભાગ્યેં તુટ્યાં પણ બહુજ અગત્યનાં પ્રકરણો પૃથ્વીના ખડકોમાં હજી પણ લેખ રૂપે સચવાઈ રહેલાં છે. જીવશોષ રૂપી લેખનું મહત્ત્વ અને લાભ પ્રાણીસૃષ્ટિના સંબંધે તો સર્વ કોઈ સ્વીકારે છે. માધ્યમિક યુગના ખડકોમાંથી પ્રાપ્ત થતા રાક્ષસી ઉરગો (રિપ્ટાઇલ્સ) ‘હવાના દૈત્યો’ અને દાંતવાળાં પક્ષીઓ, તથા મંદગ (સ્લૉથ્સ) અને ભૂતકાલીન રાક્ષસી હાથીઓ (મેમથ્સ)ની માહિતી તો સામાન્ય લોકોને પણ હોય છે; ઘોડા અને હાથીનાં જીવશોષના ઇતિહાસથી ઉત્કાંતિના વિષય ઉપર કેટલો ખંધો પ્રકાશ પડ્યો છે તે વાત ઘણા માણસોને મુવિદિત છે.

ઉદ્ભવિજ્ઞાનેનાં જીવશેષ આપણને ઓછાં પરિચિત છે, તોપણ ઐતિહાસિક લેખ તરિકે તેમનું મહત્વ. પ્રાણીનાં જીવશેષથી જરા પણ ઓછું નથી. કેટલીક બાબતમાં ઉદ્ભવિજ્ઞાનવિદ્યાલિજ્ઞ, ખરેખર, પ્રાણિવિદ્યાલિજ્ઞના કરતાં ઓછા ભાગ્યશાળી છે, તોપણ બીજી બાબતોમાં તેને વધારે લાભ છે. પ્રાણીઓની બાબતમાં, તેમનું અંદરનું કે બહારનું હાડપિંજર સંરક્ષણને માટે અતિયોગ્ય અને પુરાવાને માટે બહુ જ કીમતી છે. વનસ્પતિઓના શરીરમાં એવી કોઈ પણ વસ્તુ નથી, તોપણ તેમના શરીરનો બહારનો આકાર, અને તેમની અંદરની ઘટના વનસ્પતિનાં જીવશેષનો અભ્યાસી વધારે સારી રીતે જાણી શકે છે. થડ અને પાંદડાં વિગેરેનાં અને મુદ્રાઓ (છાંપ) ઉદ્ભવિજ્ઞાનેનાં ઉત્તમ જીવશેષ છે. એ ઉપરાંત અશ્મીભૂત જાનેલાં વધારે કીમતી જીવશેષો પણ જમીનમાં સુરક્ષિત રહેલાં છે. દ્રાવણમાં ઓગળેલા ખનિજ પદાર્થો એ જીવશેષોની પેશિઓમાં સર્વસ્થળે પસરી જઈ ત્યાં જામી ગયેલા હોવાથી ઉદ્ભવિજ્ઞાનેની સૂક્ષ્મ ઘટના પણ બહુજ સારી રીતે જાણવાયેલી છે. એ રીતે અંગારસ્તર યુગનાં (કોલમેઝર્સ) આવાં જીવશેષોના પાતળા પરિચ્છેદો ઉતારી, તે યુગની ઘણી વનસ્પતિઓની સૂક્ષ્મ શરીર ઘટના આપણે જાણી શકીએ છીએ. લાખો વર્ષથી જમીનમાં દટાયેલાં એ જીવશેષો એટલાં બધાં સુરક્ષિત છે અને તેમની શરીર ઘટના આપણને એવી આબેહુળ જણાય છે, કે જો તેમને બાગમાંથી હાંમેલાં એકઠી કરેલી હોય એમ આપણને લાગે છે.

આવો ઉત્તમ પુગવો હમેશા આપણને મળતો નથી, અને દરેક વિદ્વાન જાણે છે, કે જીવજોષકપી લેખ અપૂર્ણ છે, તોપણ આવો અપૂર્ણ લેખ આપણને આટલી બધી માહિતી આપે છે એ વાત ખરેખર નવાઈ ભરેલી છે આ પુસ્તક 'ઉદ્ભિજ્ઞોની ઉત્ક્રાંતિ' એ વિષયનું વિવેચન કરે છે, અને તેમા વાર વાર જીવજોષના પુરાવાનો આધાર લીધેલો છે બધી વનસ્પતિઓની ઉત્ક્રાંતિને અનુમરવું અશક્ય હોવાથી અત્રે માત્ર ઉચ્ચી કોટિના વનસ્પતિસમૂહો મળેલા વિચાર કરેલો છે ઉદ્ભિજ્ઞસૃષ્ટિના આ વર્ગને માટે જીવજોષ કપી લેખ હમેશા મુલભ અને બહુજ અગત્યનો છે

આ પુસ્તકમા આપણે માત્ર નીચેના પ્રશ્નો મળે વિચાર કરીશું —

યથાર્થ સંપુષ્પ વનસ્પતિઓ અથવા આવૃતબીજ વનસ્પતિઓ (એન્જિઓસ્પર્મ્સ) ની ઉત્ક્રાંતિ (પ્રકરણ ૨ જી અને ૩ જી)

બીજધારી વનસ્પતિઓની (મીડ-રહેન્ટસ) ઉત્ક્રાંતિનો સામાન્ય વિચાર (પ્રકરણ ૪ થી)

ઉચ્ચી કોટિની પ્રચ્છન્નબીજ વનસ્પતિઓના મોટા સમૂહો, એટલે બીજધારી વનસ્પતિઓની પેઠે વાહિની તરવાળી (વેન્કયુલર સિસ્ટમ) [કાષ, (લુક), અને વટકક, (ફ્લોએમ)] અલિંગકોષધારી (સ્પોરોફેન્ટસ) વનસ્પતિઓની ઉત્ક્રાંતિ (પ્રકરણ ૫ થી ૭)

આ સાથે ભૂસ્તરવિદ્યાનાં પ્રસ્તરોનો કોઠો આપેલો છે, અને તેમાં ટ્રેટિસિટનની ભૂમિનાં ત્રિખંડી સ્તરક્રમ (કેમ્બ્રી-અન) મુધીનાં વિવિધ વર્ણાની જાડાઈ પણ બતાવેલી છે. હવે પછીનાં પ્રકરણોમાં જે વર્ણા મંબંધે આપણે ઉદ્દેશ કરવાનો છે તેમના વિશે થોડી માહિતી આપવી અને જામ જરૂરી છે.

ભૂસ્તરવિદ્યાની દૃષ્ટિએ વિચારતાં, તૃતીયયુગનાં પ્રસ્તરો (ટર્શ્યરિ) આધુનિક સમયને લગતો લેખ છે. વનસ્પતિઓની જાળમાં તો, તૃતીયયુગમાં કાંઈ પણ મહાન રૂપાંતર થયું નથી; એટલે હાલની જીવંત વનસ્પતિઓના જ વર્ગની ઉદ્ભવિત્ત્વે તે યુગમાં ઉગતી હતી, અને તેમની વસ્તીનું પ્રમાણ પણ હાલમાં છે તેજ હતું. ઉદ્ભવિત્ત્વવિદ્યાલિજોને તૃતીય યુગના અભ્યાસમાં બહુજ મજા પડે છે, કારણકે ઉચી કોટિની અપુષ્પ વનસ્પતિઓનાં ઘણાં કુટુંબોની ઉત્ક્રાંતિ એજ યુગમાં થયેલી છે. તોપણ આ પ્રશ્નો મંબંધે ચર્ચા કરવી હમણાં આપણે મુલતવી રાખીશું. ઇંગ્લાંડના દક્ષિણ ભાગમાં તૃતીય યુગનાં પ્રસ્તરો વધારે સુરક્ષિત રહેલાં છે. દાખલા તરીકે, લંડનની આમપાસની ખીણમાં બેગશૉટ^૧ની રેતીનાં, લંડનની માટીનાં, અને વુલવીચ^૨ અને રીડીંગનાં^૩ પ્રસ્તરો તૃતીય યુગનાં જ છે. વાઈટના ટાપુમાં અને કેમ્પશાયરના કિનારા

ઉપર તૃતીય યુગના ઉત્તરાર્ધના, એટલે વધારે તાજાં વળાં આપણે હાથ ચઢયા છે.

તૃતીય યુગ (ટર્શરિ)	
ખટિકાયુગ (ક્રિટેશીઅમ)	મધ્યજીવયુગ (મેસોઝોઇક)
વિવૃતખીજસ્તરક્રમ (જુરેમિક)	
ત્રિગુણિતસ્તરક્રમ (ટ્રિએસિક)	
ક્રોડોરગસ્તરક્રમ (પર્મિઅન)	
અગારસ્તરક્રમ (કાર્બોનિફરમ)	પ્રાચીનજીવયુગ (પેલિઝોઝોઇક)
મત્સ્યસ્તરક્રમ (ડિવોનિઅન)	
ઉપરોક્ત મત્સ્યસ્તરક્રમ (અપા મીસુરિઅન)	
નીચો વૃદ્ધ મત્સ્યસ્તરક્રમ (લોઅર મીસુરિઅન)	પ્રાચીનજીવયુગ (પેલિઝોઝોઇક)
ત્રિખડીસ્તરક્રમ (ટ્રેમ્પીઅન)	

ખટિકા યુગનાં પ્રસ્તરો મધ્ય જીવયુગમાં બંધાયાં. તોપણ, ખૂસ્તરવિધાને લગતી આ સરહદો વનસ્પતિસૃષ્ટિમાં અગત્યનું રૂપાંતર થયેલું છે એમ સૂચવતી નથી ખટિકા

યુગનાં ઉપલાં પ્રસ્તરોમાંથી હાલની ઘણી વનસ્પતિઓનાં જીવશેષ મળી આવે છે, અને એ જ યુગનાં નીચલાં વળાંઓમાં પણ હાલની કેટલીક ઉદ્ભિજ્જો દટાયેલી નજરે આવે છે. તોપણ, આ નીચલાં પ્રસ્તરોનાં જીવશેષોમાં શંકુધારી વિગેરે વિવૃતખીજ વનસ્પતિઓ (જાઇમ્નોસ્પર્મ્સ) અને વધારે અને વધારે પ્રાચીન ઉદ્ભિજ્જો મુખ્ય છે. ઇંગ્લાંડની ઇશાન કોણમાં પથરાયેલો પુષ્કળ ચાક ખટિકા યુગનાં ઉપલાં વળાંનો, અને કેન્ટ, સરે અને સેક્સ પરગણાંઓમાં સારી રીતે સ્પષ્ટ થતાં લીલી-રેતીનાં નીચલાં પ્રસ્તરો (લોઅર ગ્રીનમેન્ડ) ખટિકાયુગનાં નીચલાં પ્રસ્તરોનો આપણને ચિતાર આપે છે. ખટિકાયુગની શરૂઆતમાં જ અંધાયેલાં પ્રસ્તરોમાં અગત્યનો ગાળ વીહડનાં જંગલોનો છે; અને ભૂસ્તરવિદ્યામાં એ જગ્યાની જાતના ગાળને વીહડનો ગાળ કહે છે. આ ગાળ મીઠા પાણીમાંથી આવેલો હોવાનું સ્પષ્ટ થાય છે, અને તેમાંથી મધ્ય જીવયુગની વિશિષ્ટ વનસ્પતિઓનાં પુષ્કળ જીવશેષો આપણને પ્રાપ્ત થાય છે, (૭૩ મું પૃષ્ઠ).

ઇંગ્લાંડના વિવૃતખીજસ્તરક્રમમાં પણ એ જ જાતની વનસ્પતિ મોટા જગ્યામાં આપણને મળી આવે છે. મિડલેન્ડના મોટા ભાગમાં પથરાયેલાં અડોપલવાળાં (ઉલિટિક) પર્બેકનાં પ્રસ્તરો, અને ઉરગનાં (રેપ્ટાઇલ્સ) જીવશેષ માટે

૧, કેન્ટ, સેક્સ અને સરે પરગણાંમાં આવેલું એક મોટું જંગલ છે.

૨, પર્બેક એ એક નાનો ખેટ છે.

પ્રખ્યાત ચૂર્ણોપલસ્તરક્રમ વિવૃત્તબીજસ્તરક્રમના પેટા ભાગો છે ચૌકશાયરના કિનારે આવેલાં અંડોપલવાળાં નીચલાં વળાંમાં વનસ્પતિનાં એટલાં બધાં જીવશેષો છે, કે એ પ્રસ્તરો શાસ્ત્રીઓમાં ' અંડોપલી-અંગાર પ્રસ્તરોના ' નામથી પ્રસિદ્ધ છે.

મિડલેન્ડ અને ઇંગ્લાંડના પશ્ચિમના ભાગોમા ઘણા ગાઉ મુઘી પથરાયેલાં ' નવા લાલ વાલુકાસ્થનાં ' પ્રસ્તરો (ન્યુ રેડ મેન્ડ સ્ટોન) જેઓ ડિવેન શાયરના દક્ષિણ કિનારા સૂધી પહોંચી ત્યાં આવેલી સિડમાઉથની લાલ ટેકરીઓમાં પરિણમે છે તેમનો ઘણો ભાગ ત્રિગુણિતસ્તરક્રમને લગતો છે. ઇંગ્લાંડમાં વનસ્પતિનાં જીવશેષોની સંખ્યા બહુ મોટી નથી, પણ યુરોપના અન્ય દેશોમાં તેઓ જોશુમાર છે. ફ્રાન્સ વિગેરે દેશોમાંથી પ્રાપ્ત થતાં જીવશેષોનું ' સ્વરૂપ ત્રિગુણિતસ્તરક્રમની ઉદ્ભિન્નજોથી સહેજ જુદું છે, અને તે કેટલેક અંશે પ્રાચીન જીવયુગની ઉદ્ભિન્નજાનિને મળતું આવે છે.

પ્રસ્તરક્રમની શ્રેણિમાં નીચે ઉતરતાં હવે પ્રાચીન જીવયુગના વળાંની શરૂઆત થાય છે. પ્રથમ વૃદ્ધોરગસ્તક્રમ (પ્રાચીન જીવયુગનો એક પેટાભાગ) દેખાય છે, અને તે આપણને ઉત્તર ઇંગ્લાંડમાં મુવંગી ચૂર્ણોપલનાં (મેગ્નેશીઅન લાઇમસ્ટોન) વળામાં અને ડિવેન શાયરમાં એકસ નામની નદીની પશ્ચિમે આવેલી લાલ ટેકરીઓમાં સ્પષ્ટ થાય છે, રશિયા વિગેરે યુરોપના અન્ય દેશોમાં વૃદ્ધોરગસ્તરક્રમ મોટા જથ્થામાં બંધાયેલો છે અને તેનાં નીચલાં પ્રસ્તરોમાં પુષ્કળ વનસ્પતિ-

ઓનાં જીવશેષો છે. એ નીચલાં વળાંની ઉદ્દલિન્નને મધ્ય જીવયુગની વનસ્પતિઓથી તફાવત જુદી પડે છે. જુદોરગસ્તરક્રમમાં પ્રાચીનજીવયુગની આદર્શરૂપ ઉદ્દલિન્નસૃષ્ટિ આપણી નજરે આવે છે. આ જીવશેષોનું સ્વરૂપ અંગારસ્તરક્રમનાં જીવશેષોને સામાન્ય રીતે મળતું આવે છે; એટલે, જુદોરગસ્તરક્રમનાં જીવશેષો, સીતાહાર (કલણ-મોસીસ) અને અશ્વપુરુષી (હોર્સટેલ્સ) અને હાલની ઉદ્દલિન્ન-સૃષ્ટિમાં ગેરહાજર રહેલી આદ્ય ખીજધારી અને વિવૃતખીજ ઉદ્દલિન્નને વંધારે મળતાં આવે છે. જુદોરગસ્તરક્રમની આ વનસ્પતિઓ ઉદ્દલિન્નસૃષ્ટિમાં ખરેખર બહુજા અગત્યની છે.

ધગલાંડનો અંગારસ્તરક્રમ ત્રણ મુખ્ય ભાગોનો બનેલો છે: કોલસી સ્તરો (કોલ મેઝર્સ) કંકરોપલ (મીલસ્ટોન ગ્રીટ), અને અંગારમય ચૂર્ણોપલ (કાર્બોનિફરસ લાઇમસ્ટોન).

કોલસી સ્તરો, મુખ્યત્વે, લીની જમીનમાં ઉગેલાં વિશાળ જંગલો દટાઈ જવાથી ઉત્પન્ન થયેલાં છે, અને તેથી એ સ્તરક્રમનાં પ્રસ્તરોમાં બધી જાતની વનસ્પતિઓનાં પુષ્કળ જીવશેષો છે. આ જીવશેષો ત્યાં વિવિધ રીતે સંચવાઈ રહેલાં છે. લેંકેશાયર અને ચોર્કેશાયરનાં કોલસી સ્તરોના નીચલા ભાગનાં વળામાં મુખ્યત્વે કોલસાના ચૂર્ણમય ગઢાઓ (કેલ્કેરિ-અસ કોનક્રીશન્સ) મોટા જથ્થામાં હાજર હોય છે. આ કોલસાના દડાઓ વનસ્પતિઓના અશ્મીભૂત કંડકાઓથી ભરપૂર હોય છે,

અને તેઓ બહુ જ સારી રીતે સચવાઈ રહેલા છે. કોલસાનાં સંધિસ્તરોના (સીમ્સ) ઉપલા ભાગમાં પણ કોલસાના દડાઓ આપણી નજરે આવે છે, અને સંધિસ્તરોમાં દટાયેલી વનસ્પતિથી કાંઈક જુદીજ ભતની વનસ્પતિઓ એ દડાઓમાં હાજર હોય છે. ઑસ્ટ્રિયા અને જર્મનીની કોલસાની ખાણોમાં 'પણુ એવાજ કોલસાના દડાઓ છે.

ફ્રાન્સના ઉપલાં કોલસી સ્તરોમાં અને વૃદ્ધોરગસ્તર ક્રમમાં પ્રાપ્ત થતાં જીવશોષો મુખ્યત્વે રેતીમાં સચવાઈ રહેલાં છે.

આ આખા ક્રમમાં ઉદ્ભિન્નજ્ઞેની મુદ્રાઓ (છાપ) અને ખીખાંઓ મોટા જથ્થામાં હાજર છે, અને વનસ્પતિઓનાં શરીરનાં બહારનાં લક્ષણો સ્પષ્ટ કરવામાં તેઓ ખરેખર બહુજ ઉપયોગી છે.

અંગાર સ્તરનાં ઉપલાં વળાંમાં બધાં કોલસી સ્તરોનાં (ઉપલાં, વચલાં અને નીચલાં) અને તેમની નીચે આવેલા કંકરોપલનો સમાવેશ થાય છે. ઈંગ્લાંડમાં, પેનાઈન પર્વતો અને મેન્ડિપની ટેકરીઓનો અંગારમય ચૂર્ણોપિલ, અને સ્કોટલેન્ડના દક્ષિણ અને મધ્ય ભાગોમાં ચૂર્ણમય વાલુકાશ્મ અંગારસ્તર ક્રમનાં નીચલાં પ્રસ્તરો છે. અંગારસ્ત્રક્રમનાં ઉપલાં અને નીચલાં વળાંની વનસ્પતિઓનાં સ્વરૂપમાં બહુજ ભેદ છે. નીચલાં પ્રસ્તરોની વનસ્પતિઓ મત્સ્યસ્તર યુગની ઉદ્ભિન્નજ્ઞેને વંધારે મળતી આવે છે. સ્કોટલેન્ડના ચૂર્ણમય વાલુકાશ્મમાં

દટાચેલી વનસ્પતિઓ વધારે 'અગત્યની' અને કાંઈક જુદાજ સ્વરૂપવાળી છે.

ડિવેન શાયરનાં વળાં અને સ્કાટલેન્ડનાં જૂના લાલ વાલુકાશ્મનાં વળાં મત્સ્યસ્તરયુગમાં બંધાયેલા છે. ઉદ્ભિજ્જ વિદ્યાની દૃષ્ટિએ જોતાં, એ પ્રસ્તરો બહુજ ઉપયોગી છે, કારણ કે જે અત્યંત પ્રાચીન ભૂનિવાસી વનસ્પતિઓ સંબંધે આપણને સંતોષકારક માહિતી છે તે બધી તે પ્રસ્તરોમાંથી આપણને મળી આવે છે. ગ્રેટબ્રિટનના ટાપુઓ પૈકી માત્ર આયર્લેન્ડમાં જ થોડી જગાઓએજ મત્સ્યસ્તરક્રમનાં વળાંમાં વનસ્પતિનાં પુષ્કળ જીવશેષો છે, પણ ઉત્તરઅમેરિકામાં એ ક્રમનાં વળાંમાં બહુજ ઉદ્ભિજ્જો દટાચેલી છે.

આ વનસ્પતિઓ અંગારસ્તરનાં નીચલાં પ્રસ્તરોની ઉદ્ભિજ્જોથી બહુ જ જુદી પડતી નથી; તોપણ કેટલીક વનસ્પતિઓમાં કાંઈ ખાસ વિચિત્રતા હોય છે. તેમનાં શરીરમાં 'બહુ' જ ઉંચી જાતનો અવયવ વિભાગ ક્યારનોયે થયેલો છે; તેમની ઉત્પત્તિને આ કલાની સાથે સાંધનાર ભૂતકાલનો ઇતિહાસ, બહુ જ લાંબો હોવો જોઈએ, પણ એ સંબંધે આપણને વસ્તુતઃ કાંઈજ માહિતી નથી. હાલમાં તો મત્સ્યસ્તરક્રમનાં માત્ર ઉપલાં જ પ્રસ્તરોની ઉદ્ભિજ્જો વિષે આપણને વધારે સાફ જ્ઞાન છે.

વૃદ્ધ મત્સ્યસ્તરક્રમ અને ત્રિજંડીસ્તરક્રમના નામથી પ્રસિદ્ધ વિશાળ જૂના ખડકો વિષે આપણે આ પુસ્તકમાં

વિવેચન કરીશું નહિ, કારણકે એ પ્રસ્તરોમાંથી આપણને ભૂનિવાસી ઉદ્દલિન્ગને વિષે કંઈ જ માહિતી મળતી નથી. વૃદ્ધ મત્સ્યસ્તરકમની કેટલીક વનસ્પતિઓ હંસરાજ અને સીતાહારના જીવશેષો છે એમ કેટલાક શાસ્ત્રીઓનું હાલમાં માનવું છે, પણ, એ સંબંધે હજી ચોક્કસ નિર્ણય થયો નથી. તોપણ, વાહિનીમય ઉદ્દલિન્ગને (વેસ્કયુલર પ્લેન્ટસ) એ યુગોમાં ઉગતી હશે એમ ચોક્કસ અનુમાન થાય છે. વૃદ્ધ મત્સ્યસ્તરકમના, અને ઘણે લાગે ત્રિખંડીસ્તરકમના ખડકોમાં સુરક્ષિત દટાયેલી કેટલીક દરિઆઈ વનસ્પતિઓ છે. શૈવલાદિ ઉદ્દલિન્ગનેનો જીવન-ઇતિહાસ ખડું જ રમુજ છે, તોપણ આ પુસ્તકની વિષય-મર્યાદામાં તેનો સમાવેશ થતો નથી.

મામાન્ય રીતે, આપણી જાણમાં, વસ્તુતઃ મુખ્ય ચાર ભૂતકાલીન ઉદ્દલિન્ગને છે:

૧. તૃતીય યુગની, અને ખટિકા યુગનાં ઉપલાં પ્રસ્તરોની; હાલની વનસ્પતિઓ, અથવા, આવૃતખીજ વનસ્પતિઓ.
૨. મધ્ય જીવયુગની વનસ્પતિઓ; અથવા, વિવૃતખીજ વનસ્પતિઓ.
૩. પ્રાચીનજીવયુગના ઉત્તરાર્ધની ઉદ્દલિન્ગને; અથવા, આદ્ય ખીજધારી અને પ્રચ્છન્નખીજ વનસ્પતિઓ.
૪. પ્રાચીનજીવયુગના પૂર્વાર્ધની ઉદ્દલિન્ગને; અથવા, શૈવલાદિ વનસ્પતિઓ.

શૈવલાદિ વનસ્પતિઓ સંબંધે આપણને એટલી બધી ઓછી માહિતી છે, કે તેમને બાકીની ઉદ્ભવિજ્ઞાની સાથે વાસ્તવિક રીતે સરખાવી શકાય તેમ નથી.

આ પુસ્તકમાં આપણે માત્ર પહેલી ત્રણ બાતની વનસ્પતિઓ સંબંધે વાત કરીશું. આપણે આશય માત્ર એટલો જ છે, કે આપણને પ્રાપ્ત થયેલા ભાગ્યા તૂટ્યા પુરાવાના સાધનથી, ઉંચી કોટિની વનસ્પતિઓના અવતરણને મુખ્ય મુખ્ય બાબતોમા પ્રાચીન જીવયુગ મુધી યથાશક્તિ આપણે અનુસરવું.



પ્રકરણ ૨જું.

સપુષ્પ વનસ્પતિઓની ઉત્ક્રાંતિનો પ્રશ્ન

બ્રિટિશ સમિતિના (એસોશીએશન) ઉદ્દલિન્ન-
 વિદ્યાલિજોની સમક્ષ દસ વર્ષ ઉપર વિદ્વાન વાઈન્સે એક
 અગત્યનો નિબંધ વાંચ્યો. તેમાં તેણે તે સમયની ઉત્તમ અને
 લક્ષ્ય ગણતરીને આધારે, આખી વનસ્પતિસૃષ્ટિનું વસ્તીપત્રક
 આપવા સારો યત્ન કર્યો હતો. મનુષ્યની અને ઉદ્દલિન્નજોની
 વસ્તીની ગણતરીમાં બહુજ સેદ છે. વનસ્પતિની બાબતમાં
 માત્ર તેની ઉપજતોની જ સંખ્યા ધ્યાનમાં લેવાય છે, અને
 મનુષ્યની બાબતમાં વ્યક્તિઓનો હિસાબ થાય છે. ઉપજતોની
 ધંધતા વિષે ઉદ્દલિન્નવિદ્યાલિજોમાં મતસેદ છે; દાખલા
 તરિકે, ‘ વિદ્યાર્થીઓની વનસ્પતિઓ ’ એ નામના પુસ્તકમાં
 હુકર લખે છે, કે રૂબસની (બ્લેકબેરિ અને રેસ્પબેરિની
 એક જાત) માત્ર ચારજ ઉપજતો ગ્રેટબ્રિટનમાં વસે છે; અને
 ‘ બ્રિટનની વનસ્પતિઓની નામાવલિ ’ એ નામના પુસ્તકમાં
 વિદ્વાન ડુસ એ જ જાતની ૧૩૩ ઉપજતોનાં નામ આપે છે.
 તોપણ મતસેદનાં આવાં દષ્ટાંતો થોડાં છે, અને વનસ્પતિઓના
 વસ્તીપત્રકનું લક્ષ્ય ચોક્કસ સંખ્યાઓને બાબુએ મૂકી માત્ર
 તેમની સપ્રમાણ સંખ્યાઓ નોંધવાનું હોવાથી, ઉપજતોના
 સંબંધે ઉત્પન્ન થતો મતસેદ બહુ અડચણરૂપ થતો નથી. ઇ.

સ ૧૯૦૦ પછી બીજી ઘણી નવી ઉપજતોની શોધ થયેલી છે એ વાત પણ આપણા પ્રસ્તુત કાર્યમા વિઘ્નરૂપ થવાની નથી

વિદ્વાન વાઈન્સના મત પ્રમાણે ઉદ્ભવિત્ત્વોનુ વસ્તીપત્રક નીચે પ્રમાણે છે અત્રે આપેલી સખ્યાઓમા અપૂર્ણાંક અંકોનો હિસાબ લીધેલો નથી

આવૃત્તબીજા અથવા

સપુષ્પ વન-પતિઓ ૧૦૩૦૦૦

વિવૃત્તબીજા વન-પતિઓ

(૨૧ કુદ્યાડી-વિગેરે)- ૨૫૦૦

વાહિનીમય પ્રચલ્નબીજા

વનસ્પતિઓ (હંસરાજ વિગેરે) ૩૫૦૦

લીલ અને શંકરશૈલ ૭૫૦૦

કુગ (કંગસ) અને વેત્રાકુરો

(બેક્ટેરિઆ) ૪૦૦૦૦

છડિલો વનસ્પતિઓ

(લીચન્સ) ૫૫૦૦

ગેવવાદિ વનસ્પતિઓ,

(દરિઆઈ વનસ્પતિઓ) ૧૪૦૦૦

૧૭૬૦૦૦

એ રીતે હાલમા આપણી જાણમા જેટલી વન-પતિઓ

છે તેનો કુલ કરતા પણ ધધારે લાગ આવૃત્તબીજા કે સપુષ્પ વન-પતિઓનો છે એ વાત સર્વને સુવિદિત છે કે પૃથ્વી

ઉપરની હાલની ઉદ્ભિજ્જનસૃષ્ટિમાં અગ્રગણ્ય અને ઉત્તમ પ્રસાર પામેલો વર્ગ આવૃતખીજ કે સપુષ્પ વનસ્પતિઓનો છે. સપુષ્પ વનસ્પતિઓમાં શંકુધારી વિગેરે વિવૃતખીજ વનસ્પતિઓનો પણ સમાવેશ થાય છે; તોપણ, આ પુસ્તકનો લેખક માત્ર આવૃતખીજ વનસ્પતિઓનેજ સપુષ્પ વનસ્પતિઓની સંજ્ઞા આપે છે. સામાન્ય વ્યવહારમાં, આમોપાલવ (ફેર) ના શંકુને આપણે ‘ફૂલ’ કહેતા નથી, અને આ ખાખતમાં લૌકિક ભાષા આ બુદ્ધિને વર્ગની વનસ્પતિઓની વચ્ચે રહેલો અગત્યનો ભેદ સારી રીતે સ્પષ્ટ કરે છે. હાલની જીવંત વિવૃતખીજ વનસ્પતિઓના શંકુઓ અને યથાર્થ ફૂલની વચ્ચે બહુ સમાનતા નથી; અને જો કે જૂની ઢબથી લંબાયેલાં ઉદ્ભિજ્જનવિદ્યાનાં પુસ્તકોમાં હજી પણ આ ભેદ સ્પષ્ટ કરવામાં આવતો નથી, તોપણ વસ્તુતઃ એ બે મહાન વર્ગોના અભ્યેમાં અગત્યનાં ભેદ-દર્શક લક્ષણો હાજર છે.

હાલની ઉદ્ભિજ્જનસૃષ્ટિમાં અગ્રગણ્ય સ્થાન આવૃતખીજ વનસ્પતિઓનું છે એ વાત સ્પષ્ટ કરનાર માત્ર તેમની ઉપજતોની સંખ્યા છે એમ નથી; હાલની સૃષ્ટિમાં તેમના કાર્યનું મહત્ત્વ પણ કાંઈ ઓછું નથી. જંગલમાં ઉગતી આવૃતખીજની સાથે કેટલાંક શંકુધારી વૃક્ષો હરિફાઈ કરી શકે છે; સુખાલ્પ (એકનર્ન) અથવા બાગ-મોસ ઘણીવાર બહુજ વિશાળ જમીનનો કબજો લઈ લે છે; નહિં તો, સામાન્ય રીતે આવૃતખીજ વનસ્પતિઓજ પૃથ્વીના મોટા ભાગને ઢાંકી દે છે. આ વનસ્પતિઓ દરેક જાતની આબોહવાને

યોગ્ય બનેલી છે બર્નીસ ઓબરલેન્ડમાં આવેલાં ૧૪૦૦૦ કુટુંબો પછી વધારે ઉંચા અને હમેશાં બરફથી ઢંકાયેલા આફ્રિકા પર્વતના શિખરો ઉપર પણ રેનન્ડયુલસ ગ્લેશીયોલિસ નામની આવૃત્તીબીજ વનસ્પતિ ઉગે છે; તેમજ મધ્ય-આફ્રિકા અને અમેરિકાનાં બહુજ ગરમ અને વરસાદહીન રણમા પણ રાક્ષસી દુધેલી થોર (યુફોર્બિઅસ) અને હાથલો થોર (કેકટી) નામની એજ વર્ગની ઉદ્ભિજ્જો યથેચ્છ વિકાસ અનુભવે છે.

આવૃત્તીબીજ વનસ્પતિઓએ પૃથ્વીના પૃષ્ઠને જંગલોથી, મેદાનોથી અને ચરાઓથી ઢાકી દીધું છે, અને ઉદ્ભિજ્જ-જીવનને યોગ્ય હોય એવા સર્વે સ્થળોમાં એ વર્ગની વનસ્પતિઓ ઉગતી આપણી નજરે આવે છે.

ઉષ્ણકટિબંધમાં અને અન્ય સ્થળે લેજવાળાં જંગલોમાં વૃક્ષો અને ઝાડીઓની ઉપર એ વર્ગની એકઠો અંતરિક્ષજ (એપિક્ષાઇટિક) ઉપજતો ઉગેલી હોય છે. કૃત્રિમ ગરમ માંડવાઓમાં શોભાને માટે ઉછેરેલી રૂકશાંગ 'અને' અનેનાસ (પાંઈન એપેલ) કુટુંબના ઘણાં સભ્યો અંતરિક્ષજ ઉદ્ભિજ્જોનાં દૃષ્ટાંત છે. અંતરિક્ષજ વનસ્પતિઓ, કેટલીકવાર, તેમના ખામ જીવનક્રમને બહુ જ અદ્ભુત રીતે યોગ્ય થયેલી હોય છે, કેટલીક રૂકશાંગ વનસ્પતિઓમાં પાદડાં ગેરહાજર હોય છે, અને મૂળીઓએ તેમનું સ્થાન લીધેલું હોય છે. એ મૂળીઓને પાદડાંનું કામ કરવાનું હોવાથી, તેઓ લીલા રંગનાં બની ચપટાં થઈ પોતાના આધારભૂત વૃક્ષની ઉપર ચોટી નાથ છે, અને પછી તેઓ શદ્કશૈલના જનનપર્ણની (સ્ટ્રાન્ડ) પેઠે

ત્યાં વૃદ્ધિંગત થાય છે. બીજી બાજુએ, વાયવ્ય-અમેરિકામાં ઉગતી ધોળી દાઢી, અથવા તળાદી વનસ્પતિનાં (એલ્ડ મેન્સ બીઅર્ડ, ટિલેન્ડમીઆ યુસ્ની એઇડિસ) મૂળી-આંને તદ્દન લોપ થયેલો છે, અને છડિલો વન-વનસ્પતિઓની પેઠે તેનાં ભૂખરાં લાંબાં ઝુમખાં ડાળીઓની ઉપર લટકી રહે છે. ઇસ્ટ ઇન્ડિઆમાં વસતી ડિસ્ચીડિઆ રેફ્લેસિઆના નામની અંતરિક્ષજ એ પોતાનાં પાંદડાંઓનું રૂપાંતર કરી તેમને કુંભી અથવા શિરોહીના આકારનાં બનાવ્યાં છે એ શિરોહીઓ ‘કુદરતી ફૂલનાં ફૂડાં’ની ગરજ સારે છે, કારણકે તેમને કીડીઓ માટીથી ભરે છે અને તેના આધારભૂત વૃક્ષમાંથી ટપકતું પાણી એ કુદરતી કુંડાંમાં એકઠું થાય છે, અને એ રીતે એકઠી થયેલી લીની જમીનમાથી ખોરાક મેળવવા માટે આ અંતરિક્ષજ વનસ્પતિ મૂળીઆંને ‘કુંભી-ઓમાં ફેલાવે છે.

નેપેન્થીસ, વિગેરે પ્રસિદ્ધ કુંભી વનસ્પતિઓની શિરોહીઓ અને ડિસ્ચીડિઆનાં ‘કુદરતી ફૂલનાં-ફૂડાંની’ વચ્ચે બહુજ લેદ છે. કુંભી વનસ્પતિઓની શિરોહીઓ જીવડાંને પકડવાની સુંદર યોજના છે, કારણકે અરૂણી (સનડયુ); અને વિનસની ફ્લાયટ્રેપની પેઠે આ વનસ્પતિઓ પણ માંસાહારી છે. સામાન્ય રીતે, કુદરતમાં વનસ્પતિઓ પ્રાણીનો ખોરાક બને છે, પણ કુંભી વનસ્પતિઓ આ કુદરતી નિયમનો એક નવાઈ ભરેલો અપવાદ છે.

આવૃતબીજ ઉદ્દેશિજ્ઞાનેના સાહસનું આ એક અદ્ભુત

દયાંત છે. એજ વર્ગની પરોપણવી વનસ્પતિઓં કુગનું પણુ
 ઝીનુકરણ કરે છે. તેઓ અન્ય વનસ્પતિઓની ઉપર ઉગે છે,
 અને તેમના જ શરીરમાંથી પોતાનો ખોરાક મેળવે છે.
 અતિથિસિદ્ધ મિસલટો વિગેરે લીલા રંગની પરોપણવી
 ઉદ્ભલિજ્જે એરીતે પોતાનો જીવનનિર્વાહ ચલાવે છે. ધખણો
 (આઈ-ગ્રાઈટ) અને પૈસો (મની, હીનેન્થસ, ફીસ્ટોગેલી)
 વનસ્પતિઓ પ્રજા બીજા ઉદ્ભલિજ્જેનાં, મૂળીઆની ઉપર જીવે
 છે અને તેમને ખડુજી નુકશાન કરે છે. એક એવી કહેતી છે,
 કે જે ખેડુતના ખેતરમાં પૈસો ઉગે છે તેના જીરૂમાં પૈસો
 આવતો નથી. પણ, યુમરેપ અને આકાશવેલની ઉદ્ભલિ-
 જ્જેમાંથી લીલા રંગના લોપ થયેલા હોવાથી તેમનો શિકાર
 બનેલી વનસ્પતિની ઉપર તેમણે જીવન તદ્દન પરાશ્રયી બને છે.
 આકાશવેલને પાંદડાં કે મૂળ હોતાં નથી; એ વનસ્પતિ કેવળ
 દોરીઓની યુગ્મના જેવી દેખાય છે. અને તે ફર્જ-ખુશ કે કોઈ
 બીજા શિકાર ઉપર ઉગે છે. ત્યારે તેને ફૂલ બેસવાની શરૂઆત
 થાય છે ત્યારે તેનું ચથાથ સ્વરૂપ પ્રગટ થાય છે. અન્ય
 વનસ્પતિઓની મહેનતના ફળ ઉપર જીવવાથી પરોપણવી વન-
 સ્પતિનાં પાંદડાં અવધવાની અવનતિ કેટલીકે ગરમ દેશની
 પરોપણવી ઉદ્ભલિજ્જેમાં ખડુજી વધારે થયેલી હોય છે.
 સુમાંત્રાના ટાપુમાં ઉગતી દ્રાક્ષાલતાની ઉપર જીવનારી પ્રખ્યાત
 મહાફૂલી (રેફ્લેક્સિઆ આર્નોલ્ડિ) વનસ્પતિનું ફૂલ દુનિયામાં
 મોટામાં મોટું છે, અને તેનો વ્યાસ ૧ યાંડનો હોય છે. એ
 વનસ્પતિની ખાખતમાં આપણને ફૂલ સિવાય બીજા કંઈ જ

દેખાતું નથી. તેનાં થડ, પાંદડાં અને મૂળીઆં સર્વેનો લોપ થયેલો છે, અને તેમનાં અવશેષ-ચિન્હ તરિકે માત્ર રેસાઓની ગુંછળી બાકી રહેલી છે. આ ગુંછળી કુગના બલતંતુના જેવી દેખાય છે અને તે આશ્રયીભૂત વનસ્પતિના શરીરમાં જંડી ઉતરેલી હોય છે. એ રીતે વનસ્પતિસૃષ્ટિનો ઉંચામાં જંચી કોટિનો સભ્ય પણ કેટલીકવાર જીવનકલકમાં કાંઇક લાભ મેળવવા માટે અવનત થઇ કુગના જેવું કાર્ય કરે છે. તો પણ, તેનાં કૂલની ઘટના એ વનસ્પતિનું યથાર્થ સ્વરૂપ હજી પણ પ્રકટ કરે છે.

ખીજ કેટલીક સપુષ્પ વનસ્પતિઓ અન્ય વનસ્પતિઓનાં સડતાં અવશેષોની ઉપર જીવનારી કુગોનું જીવન ગાળે છે. એનું દૃષ્ટાંત ઇંગ્લાંડનાં જંગલોમાં ઉગતી સલંગન (બડસ નેસ્ટ ઓર્ચીસ) અથવા હિકાઇ વનસ્પતિ (નિઓદિઆ નિડસ-એવિસ) છે. તોપણ, આ બાબતમાં થતું કાર્ય બહુ જ ગુંચવાડા ભરેલું છે, કારણ કે એ વનસ્પતિ યથાર્થ કુગના બહુ જ નિકટ સહવાસમાં ઉગે છે અને એ કુગની જ મદદથી તે પોતાનો ખોરાક મેળવે છે. રૂકશાંગ અને અન્ય વનસ્પતિઓ બંને સામાન્ય રીતે એ પ્રમાણે કુગની મદદ લે છે, તોપણ સાધારણ રીતે એ બે ભાગીદારો પૈકી આવૃતખીજ (સલંગ-નથી અસમાન) પોતાનાં લીલા રંગનાં પાંદડાં કાયમ રાખે છે, અને તેથી તેઓ વધારે સ્વતંત્ર હોય છે.

ઉદ્ભિજ્જ સૃષ્ટિનો ઉચ્ચતમ વર્ગ કેવું અદ્ભુત અનુ-વિધાન પ્રકટ કરે છે તે બતાવવા માટે સપુષ્પ વનસ્પતિઓનાં

આ દેખાંતો આપ્યાં છે. એ વર્ગની વનસ્પતિઓના વિજયવંત પ્રસારનું આ પણ ખરેખર એક કારણ છે. જીવડાં ખાનારી અને પરોપજીવી ઉદ્દભિન્નને ખરેખર આશ્ચર્યકારક છે; કારણ કે કુગાદિ વનસ્પતિઓથી ઉંચી કોટિનો કોઈ પણ સભ્ય પોતાનો જીવન નિર્વાહ એ રીતે કરતો નથી. ભૂતકાળની વનસ્પતિઓની આબતમાં શું બન્યું હશે તે આપણે જાણતા નથી. તોપણ વર્તમાન વનસ્પતિઓના સંબંધે તો ઉપરની વાત સત્ય હોવાનું જણાય છે.

આવૃત્તખીજ વનસ્પતિઓના અનુવિધાનનો વિષય પૂરો કર્યા પહેલાં, જલવાસી વનસ્પતિઓ સંબંધે આપણે કાંઈક કહેવું જોઈએ. આપણે બધા જાણીએ છીએ, કે ઘણી સપુષ્પ વનસ્પતિઓ મીઠા પાણીમાં જીવે છે. જળ-કમળની (વોટર-લીલી) પેઠે કેટલીકનાં માત્ર પાંદડાંઓ જ તરતાં રહે છે; બતકીની પેઠે કેટલીક વનસ્પતિઓ આખીને આખી પાણીમાં તરે છે, અને હોર્નવર્ટ (સીરેટો ક્ષાઇલમ) ની પેઠે કેટલીક સપુષ્પ ઉદ્દભિન્નને તદ્દન પાણીમાં ડૂબેલી રહે છે. આવી વનસ્પતિઓ આ સ્થિતિમાં પણ પોતાનું જીવન અને સ્થાન સારી રીતે ટકાવી શકે છે, અને શેવલાદિ વનસ્પતિઓના કરતાં પણ તેઓ મીઠા પાણીનાં સરોવરો, તળાવો અને નદીઓમાં, વધારે અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. તોપણ, જલવાસી સપુષ્પ વનસ્પતિઓ હમેશાં અત્યંત વિજયવંત થતી નથી, કારણ કે હેપ્રાઇડિઝનાં કેટલાંક સરોવરોમાં આવીન સ્થિતિની અક્યુચ્છી વનસ્પતિઓ વધારે

પ્રિયાર પામી છે, અને તેઓ 'ખંડ' (રીડઝ) અને સરખા
(રશીઝ) જેવી વેધારે ઉંચી કોટિની જલવાસી વનસ્પતિઓને
એ જલાશયોમાથી હાકી કાઢે છે

જલવાસી વનસ્પતિઓ, અને મુખ્યત્વે, પાણીમાં ડૂબેલી
રહેનાર ઉદ્ભિન્નજ્ઞેની શરીરઘટના ભૂનિવાસી વનસ્પતિઓથી
વધારે સાદી હોય છે, કારણ કે તેમની - હાજતો તદ્દન, જુદીજ
બાતની છે એ વનસ્પતિઓના પુષ્પની રચના પણ આદી હોય
છે, અને કેટલાક ઉદ્ભિન્નજ્ઞેનાઓની એવી માન્યતા છે, કે
જલવાસી વનસ્પતિઓ ખરેખર આવૃત્તબીજ વનસ્પતિઓના
આદ્ય સભ્યો છે વાસ્તવિક રીતે, આ માન્યતા અસંભવિત છે,
કારણ કે ઘણી જલવાસી વનસ્પતિઓની બાબતમાં તેઓ કયા
ભૂનિવાસી કુટુંબોના સભ્યો છે તેના પ્રપ્ત નિષ્કૃષ્ટ થઈ શકે
છે ઘણે ભાગે, જલવાસી આવૃત્તબીજ પૈકી ઘણી વનસ્પતિ-
ઓએ ભૂનિવાસનો ત્યાગ કરી જલાશયનો સ્વીકાર કર્યો
છે, અને આ પ્રધાનાંતરને ઉદ્દેશીને જ તેમની શારીરિક
ઘટનામાં પણ ફેરફાર થયેલો છે આ વાતનું અત્યંત દૃષ્ટાંત
પહેલાં પ્રકરણમાં વર્ણવેલી બેટકી વનસ્પતિ છે એ વનસ્પતિ
પ્રથમ ભૂનિવાસી હતી, અને પછી તેણે જલવાસને સ્વીકાર્યો
તેથી તેના શરીરમાં એટલા બધા ફેરફાર થઈ ગયો, કે તેનું
પાદકું અને થડ લગભગ સંધાન લાગે છે તે બંનેમાં કાંઈજ
ફેર જણાતો નથી એ અવયવોએ એક નાનકડા જનેન પર્ણનું
(ક્રાન્ડ) સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે, તેની વાલ્કીઓ નામના
બાંતને તો મૂળીઆ પર્ણ હોતાં મેંથી તેમનાં ફૂલ પર્ણ બહુ જ

સાંધાં હોય છે, જામાન્ય સપુષ્પ વનસ્પતિઓથી, હવે તદ્દન જાદી પડતી આ સૂક્ષ્મ જલવાસી વનસ્પતિઓ બહુ જ વિજયવંત થયેલી છે, અને આખી પૃથ્વીનાં મીઠાં જલાશયોમાં તેઓ પ્રસરેલી છે. તેમણે પોતાની પ્રથમની 'કિલબટ' રચનાને, હવે સાદી કરેલી છે, અને તેથી મીઠાં ખાણીમાં ઉગનારી શેવાલની સાથે તેઓ સારી સ્પર્ધા કરી શકી છે, અને ઘણીવાર તો તેમણે તેમને, તેમના જ રહેઠાણમાં હરાવેલી છે. આ વનસ્પતિઓએ વિજયવંત થવાને જ માદાઈ સ્વીકારેલી છે. પોડોસ્ટેમેસી નામનું જલવાસી આવૃતખીન્ન વનસ્પતિઓનું એક કુટુંબ છે, અને તેણે પણ નીચી કોટિની ઉદ્ભિન્નતાને જાદી શરીરઘટના ધારણ કરી છે, ગરમ દેશોમાં ખંડકોની ઉપર નવાં અશઓનાં ધોધ પડે છે ત્યાં એ ધોધના સપાટાં ધ વહેતાં ખાણીમાં એ કુટુંબનાં સભ્યો સારી રીતે ઉછરે છે. તેમનું પણ સંપૂર્ણ રૂપાંતર થયેલું છે, એટલે, સપુષ્પ વનસ્પતિઓથી તેઓ બહુ જ અસમાન છે. તેઓ ઘણીવાર લીલ અથવા શેકકૌલ ઉદ્ભિન્નતાને અને કેટલીકવારે ઇંડિલો અને શેવાલને મળતી આવે છે. એ રીતે, આ રૂપાંતર પામેલા કુટુંબના સભ્યો બહુ જ વિવિધતાવાળા હોય છે, અને તેઓ સર્વ આવૃતખીન્નના સભ્યોથી તદ્દન વિચિત્ર અને અસમાન હોય છે.

માત્ર દરિયામાં જ આવૃતખીન્ન બહુ જ થોડી પ્રસરેલી છે. એટલિટનના કિનારા ઉપર માત્ર ગ્રાસરેક (ઝોરેરા) જામની એક જ સપુષ્પ વનસ્પતિ ઉછરે છે, ગરમ પ્રદેશના

સમુદ્રોમાં ખીજ કેટલીક વધારે સપુષ્પ વનસ્પતિઓ. 'જીવે છે, પણ કુલ સરવાળે વિચાર કરતાં એમ સ્પષ્ટ સમજાય છે, કે 'કૂલ' દરિયાઈ જીવનને યોગ્ય થયેલું નથી. તેની ઉત્પત્તિ અને તેનો વિકાસક્રમ સમુદ્રના જીવનથી કેવળ અલગ અને સ્વતંત્ર છે. ઉદ્ભિન્નજસૃષ્ટિમાં પુષ્પોની ઉત્પત્તિ થઈ તે પહેલાં જે વસ્તુસ્થિતિ હતી તે જ વસ્તુસ્થિતિ હતી પણ સમુદ્રમાં ચાલુ છે. ખાયરન કવિ સમુદ્રને ઉદ્દેશી કહે છે, કે 'સૃષ્ટિના ઉત્પત્તિ-કાલથી તે આજ મુધી તું એક જ રૂપે રહેલો છું'. એ મહાન કવિનું આ વાક્ય સમુદ્રની વનસ્પતિઓના સંબંધે પણ સત્ય છે.

તોપણ, એ વાત ખાસ ધ્યાનમાં લેવા જેવી છે, કે ઉંચી કોટિની બધી વનસ્પતિઓ પૈકી માત્ર આવૃતખીજાં જ સમુદ્રની ઉદ્ભિન્નજસૃષ્ટિની ઉપર કાંઈક અસર કરી છે. સમુદ્રની લીલ, સમુદ્રની હંસરાજ અને સમુદ્રની વિવૃતખીજાં વનસ્પતિઓ ઉદ્ભિન્નજસૃષ્ટિમાં હાજર નથી. માત્ર આવૃત-ખીજાં, અને મુખ્યત્વે ઉંચી કોટિની આવૃતખીજાં વનસ્પતિઓ જ સમુદ્રમાં ઘુસી શકી છે.

જમીનની બાબતમાં તો, હાલમાં આવૃતખીજાં વનસ્પતિઓ જ અગ્રગણ્ય સ્થાન ભોગવે છે. જમીન ઉપર તેઓ લગભગ સર્વસ્થળે પ્રસરેલી છે, અને જીવનની લગભગ બધી પરિસ્થિતિને તેઓ યોગ્ય બનેલી છે. ખરેખર, તેમની વિવિધતા અનંત છે. સહસ્રાંશ-મીટર (મીલીમીટર) ના જનનપર્ણથી શરૂ કરી (ખતકી વૅલ્ડ્રીઆ) ૧૦૦ મીટરની ઉંચાઈ મુધી

(યુકેલિપ્ટસ) તેમનું ગમે તે કદ હોય છે, અને સાદાં કોષોના માત્ર સમૂહથી શરૂ કરી ગરમ પ્રદેશના વેલાના થડમાં રહેલા અનેક પેશિતંત્રોની દુઃસાધ્ય ઘટના સુધી તેમની શરીરરચના ગમે તેવી કિલ્લટ હોય છે.

તોપણ, ભૂસ્તરવિદ્યાની દૃષ્ટિએ વિચારતાં આપણને સમજાય છે, કે આવૃતખીળ વનસ્પતિઓ થોડા સમય ઉપર જ ઉત્પન્ન થયેલી છે, એટલે, તેઓ આધુનિક વનસ્પતિઓ છે. જે સમયે અંગારસ્તરયુગનાં જંગલો લગભગ આખી પૃથ્વી ઉપર છવાયેલાં હતાં ત્યારે એ વનસ્પતિઓ અસ્તિત્વમાં ન હતી; વસ્તુતઃ એ સમય પછી પણ ઘણા યુગ સુધી તેમનું એક પણ અવશેષચિહ્ન આપણે હાથ આવતું નથી. માધ્યમિક યુગના ખડકોના ઉત્તરાર્ધમાંજ આપણને આવૃતખીળ વનસ્પતિઓ પ્રથમ દૃષ્ટિગોચર થાય છે. એ રીતે પ્રાચીન જીવવેત્તા (પેલિઓન્ટોલોજિસ્ટ) તેમના આખા ઉત્ક્રાંતિક્રમને સહેલાઈથી તપાસી શકે છે એમ છે, અને ખરેખર તેઓ જીવશેષરૂપી લેખનો પાછલો અને તાજો ભાગ છે. બધા હરિક્ષામાં શ્રેષ્ઠ આ મહાન્ આધુનિક વનસ્પતિવર્ગની ઉત્પત્તિ કદ ઉદ્ભવિજ્ઞ-માંથી થઈ એ પ્રશ્ન ખરેખર બહુ રમુજી અને અગત્યનો છે, અને તેનો ખુલાસો કરવો બહુ કઠણ નથી; તોપણ વનસ્પતિ-વિદ્યાના ઉત્ક્રાંતિવેત્તાઓને તેણે હમેશાં ગુચ્ચવેલા છે, અને હાલમાં થોડોજ સમય થયાં એ પ્રશ્નના ખુલાસા માટે કેટલીક અગત્યની હકીકત આપણને પ્રાપ્ત થઈ છે.

ઈ. સ. ૧૮૭૬ માં ડાર્વિન સર નોંસેફ હુકરને લખે છે,

કે બૂસ્તરવિદ્યાના બહુ જ થોડાં સંખ્ય ઉપર પસાર થયેલા યુગોમાં ઉચ્ચકોટિની બધી વનસ્પતિઓનો જે સ્વરિત વિકાસ થયેલો છે તે ખરેખર બહુ જ અગમ્ય છે. અને એ પ્રશ્નનું સ્વરૂપ એક કે બે વર્ષ અગાઉ એવું ને એવું જ હતું; આજે પણ એ સંખ્યા જે ફૂંચી આપણે હાથ આવી છે તે કેટલાક શાસ્ત્રીઓના મત પ્રમાણે અસંતોષકારક અને અનિશ્ચિત છે, તોપણ તેના વિશેષ અભ્યાસથી લવિધ્યમાં સારો લાલ થવાની આશા રહે છે.

આવૃત્તખીન વનસ્પતિઓનો બૂસ્તરવિદ્યાને લગતો ઇતિહાસ સમજવો ખરેખર કઠણ છે, તેમની ખાળતમાં પુષ્કળ પુરાવો પ્રાપ્ત થયેલો છે, તોપણ તે સામાન્ય રીતે નિશ્ચયાત્મક નથી. તેમની ઘણાં જીવશેષ પાંદડાંઓની છાંયો છે, અને તેથી એ વનસ્પતિ કયા કુટુંબની સભ્ય હશે એ ખાત્રીથી કહેવું ઘણીવાર અશક્ય છે. આ પ્રશ્ન સંખ્યા ફરીથી અવલોકન અને વિચાર થવાની ખાસ જરૂર છે, તોપણ હાલમાં એ સંખ્યા જે થોડાં સામાન્ય સિદ્ધાંતો નક્કી થયેલા છે તેમની માહિતી આપવા કાંઈ વાંધો નથી.

આખા તૃતીય યુગમાં આવૃત્તખીન વનસ્પતિઓ પુષ્કળ હતી; હાલની પેઠે તે સમયે પણ તેઓ અગ્રગણ્ય હતી. તે સમયે પણ તેમની વિવિધ હતો. હયાત હતી અને હાલનાં જીવંત કુટુંબોની મોટી સંખ્યા એ યુગનાં જીવશેષોમાં આપણે હાથ આવે છે. એકદળ અને દ્વિદળ બને નતની આવૃત્તખીન તે સમયે અસ્તિત્વમાં હતી, પણ એ પૈકી દ્વિદળ વનસ્પતિઓની સંખ્યા હાલની પેઠે મોટી હતી.

માધ્યમિક યુગના ઉત્તરાર્ધમાં પણ કેટલેક અંશે એ જ સ્થિતિ હતી. ખટિકા યુગનાં ઉપલાં પ્રસ્તરોમાંથી, એટલે જંગલોમાં ચાકવાળા ખડકોમાંથી આવૃતખીન્નોનાં ઘણાં જીવશેષો પ્રાપ્ત થયાં છે. એ વનસ્પતિઓએ તે સમયે અગ્રગણ્ય સ્થાન મેળવ્યું હતું, અને એ યુગમાં તેમને ફેલાવો પણ મોટો હતો. એ જીવશેષોના અવલોકન ઉપરથી આપણને સમજાય છે, કે ખટિકા યુગની આવૃતખીન્ન એ વર્ગની કેવળ સામાન્ય સભ્યો હતી. લોજ (ખર્ચ), લક્ષી (ખીચ), માડ (ચોક), અખરોટ (વાલનટ), પ્લેન્સ, તરખણ (મેપલ), કલચણ (હોલીસ), હુદ્દલા (આઈવી) અને ખીન્ન કેટલાંક પરિચિત વૃક્ષો અને વનસ્પતિઓ ખટિકા યુગના ઉપલા ખડકોમાંથી વર્ણવેલી છે. એ જીવશેષો અત્યુક્ત જ વનસ્પતિઓનાં છે, એવું આપણે ચોક્કસ કહી ન શકીએ, તોપણ હાલની ઘણી દ્વિજ વનસ્પતિઓના જેવી જ દ્વિજ ઉદ્ભવિજનોનાં તે અવશેષ છે એવું ચોક્કસ કહેવા આપણી પાસે પૂરતો પુરાવો છે, કેટલીક એકદળ વનસ્પતિઓનાં જીવશેષો પણ આપણને એ ખડકોમાંથી મળી આવે છે. તોડનાં (પાંખ) મહાન કુટુંબના સભ્યો તો આપણી પાસે પુષ્કળ પુરાવો છે, કારણ કે ખટિકા યુગના ખડકોમાં તેનાં પાંદડાં, ફળ અને થડ અકબંધ સંચવાઈ રહેલાં છે. તોડની નીચતાનું જૂનામાં જૂનું સંચવાઈ રહેલું જીવશેષ નાંજિયેર (અથવા, નાંજિયેરના જેવું જ એક ફળ) છે, અને તે ક્રાન્સના ખટિકા યુગના ખડકોમાંથી એટલે, જે યુગમાં ઈંગ્લાંડનાં લીલી રેલીનાં ઉપલાં પ્રસ્તરો

(અપર ગ્રીનલેન્ડ) ખંધાયાં તે સમયના ખડકોમાંથી આપણને મળી આવ્યું છે. એ રીતે, એ યુગમાં જો કે દ્વિદળ વનસ્પતિઓ પુષ્કળ હતી, તોપણ આવૃતખીજ વનસ્પતિઓમાં અત્યંત પ્રાચીન કુટુંબ ખરેખર તાડનાં વૃક્ષોનું હતું.

ડોક્ટર મેરિ સ્ટોપ્સ અને વિદ્વાન્ કુલએ થોડા જ સમય ઉપર જાપાનના ખટિકાયુગના ઉપલા ખડકોમાંથી શરીર-ઘટના સાથે અકબંધ સચવાઈ રહેલાં વનસ્પતિઓનાં અશ્મીભૂત બનેલાં અસંખ્ય જીવશેષો શોધી કાઢ્યાં છે. એ વિદ્વાનોએ તેમની થોડી ઉપજાતોનું જે વર્ણન કરેલું છે, તે ઉપરથી આપણને સ્પષ્ટ સમજાય છે, કે એ જીવશેષોમાં આવૃતખીજ અને વિવૃતખીજ બન્ને ઉદ્ભિજ્જેની સમાન સંખ્યા છે. આવૃતખીજનાં જીવશેષો પૈકી એક, ઘણું લાગે, કમળ-કુટુંબનું (લીલી ફેમિલી) છે.

જ્યારે આપણે ખટિકા યુગના નીચલા ખડકોને (ઇંગ્લાંડના લીલી રેતીના નીચલા ખડકોને મળતા આવતા) તપાસીએ છીએ, ત્યારે આપણને જણાય છે, કે આપણે આવૃતખીજ વનસ્પતિઓના ઇતિહાસના પ્રથમ પ્રકરણ આગળ આવ્યા છીએ. આ યુગનાં ઘણાં વળાંમાં તેમનાં જીવશેષોની સંખ્યા ખડું જ આછી છે; પણ માત્ર બે સ્થળે, એટલે પોર્ટુગાલ અને વર્જિનિઆના સંસ્થાનમાં આ યુગનાં પ્રસ્તરોમાં તેમની સંખ્યા ખડું જ મોટી છે. ખુતસ (પોર્ટુગાલ), કલચણ (વીલોઝ), અંજર (શ્રીગ-વૃક્ષ), અને જવાસો (લોરલ્સ) વિગેરે હાલની જીવંત ઉદ્ભિજ્જેને એ જીવશેષો ઘણું અંશે

મળતાં આવે છે; એ ખડકોમાં એકદળ વનસ્પતિઓનાં પણ ઘણાં જીવશેષો હાજર છે. તેમની પાસેના નીચલા ખડકોમાં જ આવૃતખીજનાં જીવશેષો તદ્દન ગેરહાજર છે; તેથી તેમની ઉત્પત્તિનું પ્રથમ પ્રકરણ નિઃસંદેહ ખટિકાયુગના પૂર્વાર્ધથી શરૂ થાય છે. ખરેખર, પૃથ્વીના કોઈ પણ ભાગમાં આ વર્ગની વનસ્પતિનું વધારે પ્રાચીન અને વિશ્વસનીય જીવશેષ હજી મુખી આપણે હાથ આપ્યું નથી.

ખડુ જ સારો વિકાસ પામેલી સપુષ્પ વનસ્પતિઓના આ આકસ્મિક દર્શનનો ખુલાસો કરવો, ખરેખર ઉત્કાંતિના ઉલ્લેખ સંજોગે ઉત્પન્ન થતી એક મોટામાં મોટી મુશ્કેલી છે. આવૃતખીજ વનસ્પતિઓનો આથી પણ વધારે પ્રાચીન કોઈ પણ જાતનો પૂર્વઘટિકાસ હોવો જ જોઈએ, અને તેઓ કોઈ વધારે પ્રાચીન વનસ્પતિસમૂહમાંથી ઉત્પન્ન થયેલી હોવી જોઈએ. એ વનસ્પતિસમૂહ કયો હશે એ આપણે કહી શકીશું? આ પ્રશ્નનો ખુલાસો કરવા શાસ્ત્રીઓએ પાછલાં થોડાં વર્ષો કાંઈક યત્ન કર્યો છે. આ યત્નનું સ્વરૂપ અને તે કેટલે અંશે ફલીભૂત થયો છે તે આપણે હવે પછીના પ્રકરણમાં જોઈશું.

આ વિષયની ખરાબર સમજૂતી માટે આવૃતખીજ વનસ્પતિઓનાં વિશિષ્ટ લક્ષણોનું આપણને વધારે સારું જ્ઞાન હોવું ખાસ જરૂરનું છે; કારણ કે તેથી આપણે તેમને અન્ય વર્ગની ઉદ્દલિજ્જોની સાથે વધારે સારી રીતે સરખાવી શકીશું.

આવૃત્તેખીજે વનરૂપતિઓનું પ્રથમ મંદાન વિશિષ્ટ લક્ષણ એ છે કે હાલની બધી સંજીવ ઉદ્ભિન્નજ્નેમાં માત્ર તેમને એકલીનેજ યથાર્થ કૂલ હોય છે. કૂલ એટલે શું? સામાન્ય જીવનમાં કૂલ સંબંધે આપણને માત્ર એટલો જ ખ્યાલ હોય છે, કે તે મુંદર રંગવાળું અને ઘણીવાર મુવાસવાળું હોય છે. પણ હવે આપણે જાણીએ છીએ, કે તેના રંગ અને મુવાસ કેવળ આપણા જ આનંદને માટે નથી, પણ એ જ વસ્તુઓ વનરૂપતિને બહુ જ ઉપયોગી છે. તેમનાથી લોભાઈ જીવડાંઓ વનરૂપતિની વારંવાર મુલાકાત લે છે. વાસ્તવિક રીતે, ઘણીવાર કૂલની સંબંધ કે રંગ, આપણને કંઈ જ આનંદ આપતાં નથી; કારણ કે આપણાથી કેવળ ભિન્ન રૂચિવાળી મુડાંની ઉપર જીવનારી માખીઓ વિગેરે જીવડાંને લોભાવવા માટે એવા કૂલ સરખાયેલાં છે. પ્રાણી વર્ણવેલું મહા રૂઢી (રેફ્લેક્સિયા) અને એરમ કુટુંબનાં ધુણાં પુષ્પો એ જાતનાં છે. હાવિને સાળીત ફરી ખતાવ્યું છે, કે જીવડાંની મુલાકાતથી (અને કેટલીક વનરૂપતિઓની પ્રાણતમાં ગણગણતાં પંક્ષીઓ વિગેરે અન્ય પ્રાણીઓની મુલાકાતથી) વનરૂપતિને બહુ જ લાભ થાય છે. તેથી વિવિધ પુષ્પો અથવા વિવિધ વનરૂપતિઓની વચ્ચે અન્યોન્યકૂલનનું અગત્યનું દેશ્ય બને છે. એ જ વાત ખીજી રીતે કહીએ તો, નમુનારૂપ કૂલ, પ્રાણીઓની અને સુખ્યત્વે જીવડાંઓની મુલાકાત દ્વારા અન્યોન્ય કૂલનનું દેશ્ય ઉત્પન્ન કરવા યોગ્ય બનેલું ઉત્પાદક અવયવ છે. ઘણી ઉદ્ભિન્નજ્ને સ્વકૂલની ટુંકી રીતથી પોતાનું કૃત્રિમ સંધિ છે,

પણ આવાત આપણા મુખ્ય સિદ્ધાંતને કોઈ પણ રીતે બાધ કરતી નેથી; કારણ કે એ વનસ્પતિઓ ભેંકે હાલમાં સ્વફલન કરે છે; તેપણ ભૂતકાળમાં એ પૈકી ઘણી ઉદ્ભવિન્યતે એકવાર અન્યોન્ય ફલનને યોગ્ય બનેલી હતી; દાખલા તરિકે, બી-ઓર્ચિસની બાળતમાં આવાત બહુ જ સ્પષ્ટ છે; તેના ફલમાં અન્યોન્ય ફલનની સિદ્ધિને માટે તેના જેવીજ અન્ય ફલશાંગોની પેઠે સુદૃઢ અને શ્રમસાધ્ય યંત્રરચનાઓ હાજર છે; પણ પરાઈકોશનાં તંતુઓ લાંબા અને મળળા હોવાથી નમી ગયેલા હોય છે અને તેથી પરાગકણ પવનના સપાટાને લીધે તે જ ફલનો સ્થિકેસરંબુખમાં ('સ્ટિંકમા') ઉડીને પડે છે. સામાન્ય લોકો જે અર્થમાં ફલ શબ્દનો ઉપયોગ કરે છે તે અર્થમાં હાલની અને ભૂતકાલીન ઉદ્ભવિન્યસૃષ્ટિમાં સ્પષ્ટ થતા નમુનારૂપ ફલ નામના અવયવના યથાર્થ સ્વરૂપનો ખરાબર સમાવેશ થાય છે. ભૂતકાળની વનસ્પતિઓને હાલના જેવા જ ફલ હતાં એ વાત, ભૂસ્તરવિદ્યાનો ઉલ્લેખ ખરાબર સાબીત કરે છે. એમ સંભવે છે કે ફલનો જીવડાંઓની સાથેનો સંબંધ આવૃત્તબીજા વનસ્પતિઓની ઉત્ક્રાંતિનું અને હાલની સજીવ ઉદ્ભવિન્યસૃષ્ટિમાં તેના અગ્રગણ્ય સ્થાનનું મુખ્ય કારણ છે. પુષ્પોનો ફલનેમાં ખાસ લાગ લેનારાં જીવડાંનાં ઉંચી કોટિનાં કુટુંબો પ્રથમ આપણને માધ્યમિક યુગનાં ખડકોમાં દેખાય છે. મધમાંથીઓ અને લમરા ('હિમેનોપ્ટેરા') ઉપલાં અડાપલી પ્રસ્તરોની (અપર ઉલાઈટ) પહેલાં પ્રાપ્ત થતાં

નથી; પોપડા પતત્રી (લેપિડોપ્ટેરા) વર્ગના આઘ સહ્યો
(પતંગીઆં અને ફૂદાં) પણ લગભગ એજ યુગની સૃષ્ટિ છે.
એ રીતે, આ બંને જાતનાં જીવડાં યથાર્થ સપુષ્પ વનસ્પતિઓ
ઉત્પન્ન થઈ તે પહેલાં માત્ર થોડા જ સમય ઉપર ઉત્પન્ન
થયાં. અંગારસ્તર યુગનાં જીવડાંઓમાં વંદાઓ (કોકોચીઝ)
અને રાક્ષત્રી માખો મુખ્ય હતાં. રાક્ષત્રી માખનો વિકાસ થઈ
તે આગળ ઉપર બહુ જ મોટા કદવાળી બની. એક જાતની
રાક્ષત્રી માખનું શરીર ૧૪ ઇંચ અને પાંખો ૨ ફીટ લાંબી હતી.

એ રીતે જ્યારે ખટિકાયુગમાં આવૃતખીજ વનસ્પ-
તિઓ એકાએક ઉત્પન્ન થઈ ત્યારે પૃથ્વીના આખા પૃષ્ઠને
દેખાવ બદલાઈ ગયો અને હાલના જેવાં જ ફૂલો સર્વ સ્થળે
ઉત્પન્ન થવા લાગ્યાં. પ્રાણિસૃષ્ટિમાં જેમ મનુષ્યની ઉત્પત્તિ
એક બહુ જ મોટો ફેરફાર હતો તેમ ઉદ્દલિન્જસૃષ્ટિમાં
આવૃતખીજ વનસ્પતિઓનો જન્મ પણ અત્યુત્તમ વિકાસ
ગણાય છે. આ ઉદ્દલિન્જ વર્ગની ઉત્પત્તિ ખરેખર મુખ્યત્વે
ઉંચી કોટિનાં જીવડાંઓની સમકાલીન ઉત્પત્તિને આંભારી છે.
ઘણી સપુષ્પ વનસ્પતિઓનું ફલન જીવડાંઓથી નહીં, પણ
વનના સાધનથી થાય છે, અને તોપણ ઉપરનું અનુમાન
સત્ય છે. જેમનાં ફળને પાંખનાં જેવાં પાંદડાં હોય છે તેવી
વનસ્પતિઓ જીવડાંથી ફલન કરનારી ઉદ્દલિન્જોમાંથી
ઉત્પન્ન થઈ હોય એમ પણ સંભવે છે; પણ આ કેવળ અનુમાન
છે, અને હમણાં આપણે આ પ્રશ્ન સંબંધે વધારે વિચાર
કરીશું નહીં.

આવૃતખીજા વનસ્પતિઓનાં પુષ્પોનો આકાર અત્યંત વિવિધ હોવા છતાં પણ તેમના વિવિધ અવયવોની વ્યવસ્થા બધાં ફૂલોમાં આશ્ચર્યકારક સમાનતા પ્રગટ કરે છે. જે પુષ્પોમાં બધાં અવયવો હાજર હોય છે તેમની બાબતમાં, સૌથી બહારની બાહ્ય એ પરિપુષ્પ (પેરિએન્થ) એટલે પાંદડીઓનાં વેષ્ટન એટલે ઢાંકણો હોય છે. આ બધી પાંદડીઓ કમળ અને મેમ્બ્રેલિઆ વિગેરે પુષ્પોમાં સમાન આકાર અને કદની હોય છે. પણ, ઘણાં પુષ્પોની બાબતમાં એ પાંદડીઓ બે ભાગમાં વહેંચાયેલી હોય છે. બહારના ભાગની પાંદડીઓને વજ્ર કહે છે. તેમનો રંગ લીલો હોય છે અને તેઓ પુષ્પની કળીનું રક્ષણ કરે છે. અંદરના ભાગની પાંખડીઓને ફૂલમણિ કહે છે અને તેમનો રંગ સામાન્ય રીતે ચળકતો અને સુંદર હોય છે. આપણી નજરે આવતાં સામાન્ય ફૂલની અને સુખ્યત્વે દ્વિલગ્ન આવૃતખીજાનાં પુષ્પોની વ્યવસ્થા આવી જ હોય છે. જે ફૂલની બાબતમાં જીવડાંઓથી ફૂલન થાય છે તેમના પરિપુષ્પનો અથવા ફૂલમણીનો રંગ બહુ જ સુંદર હોય છે, અને એ ભાગો પણ ફૂલમાં આગળ પડતા હોય છે.

પરિપુષ્પની અંદરની બાહ્ય ગોળ હારમાં નરકેમર (સ્ટેમન્સ) ગોઠવાયેલાં હોય છે પ્રીમ્રોઝના પુષ્પમાં તેમને એક હાર, જિરેનિયમના પુષ્પમાં તેમની બે હાર, અને ઘંટી-આળી (બટરફ્લ) ના પુષ્પમાં તેમની અનેક હારો વમળતા આકારમાં ગોઠવાયેલી હોય છે. છેવટમાં, આખા પુષ્પના મધ્ય-ભાગમાં સ્ત્રીકેસર હોય છે. સ્ત્રીકેસર એક કે વધારે ફલદ-પત્રનું

(કાર્પેલ્સ) બનેલું હોય છે. એ ફલદપત્રોમાં નાનાં બીજ કે પુષ્પાંડ હોય છે, અને એ પત્રો છૂટાં છૂટાં, અથવા તો સંયુક્ત હોય છે.

- પુષ્પના અવયવોની આ નુમુનારૂપ વ્યવસ્થા દ્વિદળ અને એકદળ વનસ્પતિઓને સાધારણ છે. તેમનાં અવયવોની સંખ્યા અને તેમનું એકમેકથી અલગપણ કે સંયુક્ત સ્થિતિ જૂદાં જૂદાં ફૂલમાં બહુ જ વિવિધ હોય છે. દાખલા તરિકે, ઘંટી-આળીના પુષ્પના બધા અવયવો પરસ્પર છુટા અને અલગ છે, વનસ્પતિ (સ્ટ્રોબિલ) અને ગુલાબના કુટુંબની ઘણી વનસ્પતિઓનાં પુષ્પોમાં વજ્ર સિવાય બીજા બધા ભાગો એકમેકથી અલગ છે. તેમનાં વજ્ર-પત્રો થોડેક મુઠી એક બીજાની સાથે જોડાયેલાં છે. પ્રીઓળના ફૂલમણીનો પાંદડીઓ પણ પરસ્પર જોડાયેલાં નળીના જેવો આકાર બનાવે છે, અને તેનાં નરકેસરો પણ ફૂલમણીને ચોટલાં હોય છે. ઘણા ફૂલમાં નરકેસરો એકમેકથી છુટાં હોય છે, પણ મેલોના ફૂલમાં તેમનાં બધાં તંતુઓ પરસ્પર જોડાયેલાં વીંટીના જેવો આકાર ઉત્પન્ન કરે છે, અને ‘સેન્ટ બર્નની વર્ટ’ એ નામની વનસ્પતિના પુષ્પમાં બધા નરકેસરો સામટા ન જોડાતાં જૂદા જૂદા જગ્યાઓમાં સંધાય છે. સામાન્ય-રીતે, ફલદ-પત્રો છૂટાં હોતાં જ નથી; તેઓ પરસ્પર જોડાયેલાં જ હોય છે. રૂકશાંગના પુષ્પોમાં નરકેસર અને સ્ત્રિકેસર જોડાયેલ એક તંતુ બને છે. સ્ત્રિકેસર હમેશાં પુષ્પના મધ્ય ભાગમાં હોય છે, પણ ઘણાં કુટુંબોની બાબતમાં એ ભાગ, એટલે

જ્યાં પુષ્પાંડથી ભરેલું અંડાશય (ઓવરિ) હોય છે તે, વજનની સપાટીથી પણ નીચે ઉતરેલો હોય છે. આ વ્યવસ્થામાં અંડાશય ડૂબતું (ઇન્ફિરીઅર) છે, એમ કહેવાય છે. હેમલોકનું કુટુંબ, કેમ્પન્યુલાસ અને ખીજી ઘણી વનસ્પતિ-ઓના પુષ્પોમાં અંડાશય ડૂબતું હોય છે.

પુષ્પોનાં આવાં રૂપાંતરોમાં હવે વધારે ઉંડા ઉતરવાની જરૂર નથી. પાછળ આપણે પુષ્પનો જે અર્થ કર્યો તે અર્થમાં બધી આવૃતખીજ વનસ્પતિઓ સપુષ્પ છે. તેથી જે વનસ્પતિ-કુટુંબમાંથી આવૃતખીજ વનસ્પતિઓ ઉત્ક્રાંત થઈ છે તેમનામાં પુષ્પ નામના અવયવનું કાંઈક પણ આંરંભનું ચિહ્ન હાજર હોવું જોઈએ.

આપણે આ વિષયને પડતો મૂકીએ તે પહેલાં આપણે એટલી વાત ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની છે, કે ઘણી આવૃત-ખીજનાં પુષ્પ ઉપર વર્ણવેલાં નમુના રૂપ ફૂલથી બહુજ વધારે સાદાં હોય છે. કેટલાંક ફૂલમાં ફૂલમણી હોતું જ નથી [નોટ-આસ, કૌવચ (નેટલ)] અને કેટલાંક પુષ્પોમાં પરિપુષ્પ તદ્દન ગેરહાજર હોય છે (થોરડાંડલિયો, સ્પર્જ; કલચણ, વીલો). વળી વધારે નવાઈની અને અગત્યની વાત તો એ છે, કે કેટલાંક પુષ્પો એકલિંગી હોય છે, એટલે તેમની બાબતમાં માત્ર નરકે-સર કે માત્ર સ્ત્રિકેસર હાજર હોય છે. પાંદડાં રૂપી પાંખવાળાં ફળ જે વનસ્પતિઓને હોય છે તે સર્વે અને એરમના કુટુંબના ઘણા સભ્યો એકલિંગીજ હોય છે. તોપણ, જ્યાં અમુક પુષ્પો બહુજ સાદાં હોય છે ત્યાં લગભગ હમેશાં તેઓ જથાબંધ જોડા-યેલાં હોય છે. કલચણ અને એરમ આ વાતનાં સરસ દર્શાવો છે.

તેમની બાબતમાં પુષ્પોના મમૂહ અથવા આપ્તું જૂથ માત્ર એક ફૂલની ગરજ સારું છે. સાદાં પુષ્પો આદ્ય છે, કે તેઓ મંપૂર્ણ રચનાવાળાં પુષ્પોનું અવનતિ પામેલું સ્વરૂપ છે એ પ્રશ્ન સંબંધે ઘણો ઉદ્ધાપોહ થયેલો છે. ખરેખર, ઘણાં પુષ્પની બાબતમાં યથાર્થ ખુલાસો એ છે, કે તેમની સાદી રચના તેમની અવનતિનું પરિણામ છે, અને પ્રાચીન ઉદ્દલિન્નજેતાઓ કહેતા હતા તેમ આ સિદ્ધાંત બધી ઉદ્દલિન્નજેની બાબતમાં પણ સત્ય હોય. પણ, હમણાં આપણે આ તાર્કિક (થિઓરેટિકલ) પ્રશ્નનો વિચાર કરવો મુલતવી રાખીશું. આપણને થોડીવારમાં સમજાશે, કે જીવશોષ રૂપી ઉત્લેખ એ વિષય ઉપર આપણને ઘણું કહેશે.

જે વિશિષ્ટ લક્ષણ ઉપરથી આપણે આ વનસ્પતિઓનું 'આવૃત્તબીજ' એવું નામ પાડેલું છે તે મહત્વનું લક્ષણ 'બંધ-અંડાશય' છે. આ લક્ષણનું મહત્વ મુખ્યત્વે ફૂલનની રીત ઉપર થતી તેની અસર છે. અંડાશય બંધ હોવાથી પરાગ પુષ્પાંડની સાથે એકદમ પ્રત્યક્ષ રીતે સંબંધમાં આવી શકે નહિ. શંકુધારી, તૃણદ્રુમી (સાઇકેડઝ) વિગેરે વિવૃત્તબીજ એટલે ખૂલ્લા બીજવાળી વનસ્પતિઓમાં પરાગ પુષ્પાંડની સાથે તુરત પ્રત્યક્ષ રીતે સંબંધમાં આવે છે. તેથી આવૃત્ત બીજના શ્રીકેસરને પરાગ મેળવવાની ખાસ વ્યવસ્થા કરવાની જરૂર છે. તેથી શ્રીકેસર પોતાના અગ્રને (સ્ટિગ્મા) રૂંવાંટી-વાળું કે ચીકણું બનાવે છે. જીવડાંના કે પવનના સાધનથી આવેલો પરાગ એ શ્રીકેસરમુખને ચોંટી જાય છે. શ્રીકેસરમુખ પરાગને સારી રીતે પકડી શકે માટે અંડાશય તેને લાંબા શ્રીકેસરની મદદથી ઉંચું ધરી રાખે છે એટલે અંડાશય

અને શ્રીકેમરમુખની વચ્ચે તેમને સાંધનારો એક તંતુ હોય છે. તેથી પરાગકણની લાંબા વધવાની શક્તિ બહુ જ વધારે હોવી જોઈએ. દરેક પરાગકણે એક લાંબી નળી ઉત્પન્ન કરી તેને શ્રીકેસરના તંતુમાં ઠેક નીચે પસાર કરી, પછી તેણે અંડાશયમાં રહેલા પુષ્પાંડમાં તેને દાખલ કરવી જોઈએ. દાખલા તરિકે, મોટા કમળમાં પરાગકણની નળીને ૬ ઇંચ લાંબુ અંતર કાપી પુષ્પાંડને મળવાનું હોય છે. આ નાની વસ્તુને માટે આટલું અંતર પણ બહુજ લાંબું ગણાય. ખૂટલાં અંડાશયવાળી વનસ્પતિઓનું ફલન સહેલાઈથી સધાય છે, કારણ કે પરાગકણ અંડાશયમાં તરત અને સહેલથી પ્રવેશ કરી શકે છે. બંધ અંડાશયવાળી ઉદ્ભિજ્જેમાં આ વાત સહેલ નથી; તેમની બાબતમાં, ફલનની સિદ્ધિને માટે પરાગકણની નલિકાઓને અવશ્ય બહુજ લાંબા વધવું જોઈએ.

અંડાશય ખીજી રીતે પણ બહુ અગત્યનું છે. પરિપક્વ યતાં ખીજનું તે સારી રીતે રક્ષણ કરે છે (વિવૃતખીજના શંકુનાં ભીંગડાં-ટૂંકાં કંઠણ પાંદડાં-પણ એજ ગરજ સારે છે), અને ત્યારે એ ખીજ ફળ બને છે ત્યારે તે તેમને વિવિધ રીતે, વેરીનાંખી તેમનો પ્રસાર કરે છે. કેટલીકવાર તે બાલસામ વિગેરે પુષ્પોમાં એકાએક જોરથી ફાટી જઈ ખીજને ગોફણની પેઠે દૂર ફેંકી દે છે; કેટલીકવાર ગુંસજેરિ અને પદ્મક (ચેરી) વિગેરે પુષ્પોમાં તે પક્ષીઓ કે ખીજાં પ્રાણીઓને લોલાવી ફળ ખવરાવે છે, અને એ પ્રાણીઓ તેનાં ખીજને દૂર લઈ જઈ વેરીનાંખે છે, અને કેટલીકવાર ચિસલ વિગેરે પુષ્પોમાં તે ખોતાનાં

પૃથ્વીની ઉપર વાળનાં સુમખાં કે છત્રીના આકારની વસ્તુ ઉત્પન્ન કરી પવનના જોરને સારી સહાય આપે છે. આ છેલ્લી બે જાતનાં, અને બીજાં ઘણાં પુષ્પોનાં અંડાશયમાં માત્ર એકજ પુષ્પાંડ હાજર હોય છે, અને તે ફાટી ઉઘડી જતું નથી, પણ આખું ફળ નવા વૃક્ષને ઉત્પન્ન કરે છે. ડેન્ડ્રોલોજીમાં કે ઘંઊના દાણાને બીજ કહેવું તે ઉદ્દલિન્નજીવિદ્યાની દૃષ્ટિએ ખુબજ મોટી ભૂલ છે, પણ વનસ્પતિના દૃષ્ટિબિંદુએ તો તેને બીજ કહેવા કાંઈ હરકત નથી, કારણ કે એવાં ફળની બાબતમાં અંડાશય કેવળ બીજની આસપાસ વીંટળાયેલું એક ઝીણું પડ છે.

તોપણ, આ સંબંધે જે ખાસ અગત્યની વાત આપણે ધ્યાનમાં રાખવાની છે તે એ છે, કે આવૃતબીજની પૂર્વજોને પણ કોઈક જાતનું બંધ અંડાશય હોવું જ જોઈએ.

આવૃતબીજની પુનરુત્પત્તિને લગતાં બીજાં પણ અગત્યનાં લક્ષણો છે. આ લક્ષણ પુષ્પાંડની અંદર થતા મહત્વના વિકારો છે. આ વિશિષ્ટ વિકારોને લીધે આવૃત બીજ બીજી બધી વનસ્પતિઓથી એકદમ જૂદી પડે છે. પણ હાલમાં આપણે એ સંબંધે વિચાર કરીશું નહીં, કારણ કે જીવશેષરૂપી ઉલ્લેખના જે ભાગને આપણે વાંચવા ઇચ્છીએ છીએ તે ભાગનો ખુલાસો કરવામાં આ બાબતો આપણને ઉપયોગી નથી. તોપણ, એ વિકારોનો આપણે સંક્ષિપ્ત ખ્યાલ લઈશું. ફલનનું કાર્ય પૂરું થયા પછી, ગર્ભને ખોરાક પૂરો પાડવા માટે ગર્ભકોશમાં (એમ્બ્રિઓમેક) અંતર્ગતી (એન્ડોસ્પર્મ) નામની પૌષ્ટિક પેશિ ઉત્પન્ન થાય છે. એક-

દંડ અને દ્વિદંડ બન્ને જાતની ઘણી આવૃત્તબીજા વનસ્પતિ-
ઓમાં બીજ પરિપક્વ થયા પછી પણ આ પેશિ હાજર રહે
છે, અને તેનો ઉપયોગ એ બીજના અંકુરીભવનના સમયેજ
થાય છે. ઘંટીઆળી, થોરડાંડલિઓ (સ્પર્નિસ), ઘાસ અને
તાડનાં વૃક્ષો એ વાતનાં દષ્ટાંત છે. શીંગો, અખરોટ, રૂકશાંગ
અને જળ-કેળ (વોટર પ્લેન્ટેન) વિગેરે આવૃત્તબીજાનાં
અન્ય કુટુંબોમાં. ત્યારે બીજ પાકતું હોય છે ત્યારેજ અંત-
શુક્રીનો તે ઉપયોગ કરે છે, તેથી પાકેલો ગર્ભ વસ્તુતઃ
બીજમાં બધી જગા રોકી લે છે. ઘંટીઆળી વિગેરે બીજ
ઔજસી (એન્ડ્યુમિનસ) અને અખરોટ વિગેરે બીજ
અનૌજસી (એક્સ-એન્ડ્યુમિનસ) કહેવાય છે. ઈંડીની
સેદ્દી અને બીજના અંતશુક્રીની વચ્ચેના સામ્યને ઉદ્દેશી
પ્રાચીન શાસ્ત્રીઓએ બીજને આ નામ આપ્યાં છે. વિવૃત-
બીજા અને આવૃત્તબીજા બન્ને વનસ્પતિસમૂહો ઔજસી બીજ
ઉત્પન્ન કરે છે; પણ વિવૃતબીજા વનસ્પતિઓ અંતશુક્રીને
તદન જુદી રીતે ઉત્પન્ન કરે છે, કારણ કે તેમનાં બીજમાં
અંતશુક્રી ફલનની ક્રિયા શરૂ થાય તે પહેલાં ઉત્પન્ન થાય છે.
અનૌજસી બીજ તો માત્ર આવૃત્તબીજામાંજ અને સુખ્યત્વે
તેનાં અચુક કુટુંબોમાં જ આપણી નજરે આવે છે. ત્યારે
આપણે જીવશેષ અંબધે વિચાર કરીશું ત્યારે આપણને આ
વાંતનું મહત્ત્વ ખરાબર સમજાશે.

આવૃત્તબીજાનાં ઉત્પત્તિક લક્ષણો બહુજ અગત્યનાં છે.
આ વર્ગનાં પૌષ્ટિક અવયવો, એટલે, થડ પાંદડું અને મૂળના

અવયવોની ઘટના એટલી બધી વિશાળ અને વિવિધ છે, કે તેમાથી આખા વર્ગને મામાન્ય હોય એવું દૂર વર્ણન આપવું શક્ય નથી એક ખામ લક્ષણ એ છે, કે સામાન્ય રીતે વિવૃત બીજા કે અન્ય વનસ્પતિઓના કાષ્ઠના કરતા આવૃતબીજના કાષ્ઠની ઘટના વધારે કિલ્લ એટલે ગુચવાડો ભરેલી છે આવૃત બીજના અન્ય કુટુંબોમા જો કે જૂદી જાતની વાહિનીઓ હોય છે, તોપણ એ વર્ગના કાષ્ઠમા મુખ્યત્વે કોષોના છરાઓ પરસ્પર અદરથી સધાઈ જઈ લાખી મતત વાહિનીઓ કે નળીઓ બને છે વિવૃતબીજનું કાષ્ઠ જગ વધારે સાદું હોય છે, અને તે મુખ્યત્વે તર્ફકોપના (ટ્રેકીડઝ) નામથી ઓળખાતા લાખા, ઉંડા છિદ્રોવાળા પાણીનું વહન કરનારા અને તીણા છેડાવાળા કોષોનું અને ગરની પટ્ટીઓનું (મેડ્યુલરિ રેઝ) બનેલું છે, અને તેથી દ્વિદળ-આવૃતબીજના કાષ્ઠથી તે તરત ઓળખાઈ આવે છે તોપણ આ સબધે બંને દિશાઓમા ઘણા અપવાદ છે

આવૃતબીજના જો પેટાભાગો એકદળ અને દ્વિદળની વચ્ચે શો ભેદ છે તે હજી મુધી કહેવામા આવ્યું નથી, કારણ કે આપણું લક્ષ્ય એ આખા મમૂહના ખામ લક્ષણો, એટલે આ જો પેટાવિભાગના મામાન્ય લક્ષણો તપાસવાનું હતું મામાન્ય રીતે, એકદળ અને દ્વિદળ વનસ્પતિઓ સામાન્ય દેખાવમા પરસ્પર ભિન્ન હોય છે અમુક વનસ્પતિ આ જો પૈકી કયા વર્ગની સભ્ય છે તે આપણે તેને જોતા વાર-૪ કહી શકીએ છીએ તેમના શરીરના બહારના ન્વરૂપનો ભેદ કેટલેક અંગે

તેમનાં પાંદડાંઓની બહારની રચના અને કેટલેક અંશે તેમની, ઉગવાની પદ્ધતિ ઉપર આધાર રાખે છે. સામાન્ય રીતે એમ કહેવામાં આવે છે, કે દ્વિદળ વનસ્પતિની પાંદડાંની નસો બાજની પેઠે ગુંથાયેલી હોય છે અને એકદળ વનસ્પતિની નસો એક બીજને સમાંતર ગોઠવાયેલી હોય છે. આ વાત અક્ષરશઃ સત્ય નથી, કારણ કે એકદળનાં પાંદડાંઓમાં પણ સામાન્ય રીતે એક તરેહની નસોની ગુંથણી હોય છે; એટલે, ઉભા લાંબા લાંબા સમાંતર રેસાઓ થોડે થોડે અંતરે નરમ આડ રેસાઓથી જોડાયેલા હોય છે. લાંબા સમાંતર રેસાઓ દેખાવમાં વધારે આગળ ચડતા હોવાથી સામાન્ય પ્રેક્ષક તેમને સહેલથી જોઈ શકે છે. ઘણી દ્વિદળ વનસ્પતિઓનાં પાંદડાંઓમાં નસોની શાખા અને ઉપશાખાઓ થઈ તેઓ દરેક દિશામાં ફરીથી જોડાય છે, અને તેથી તેમની ગુંથણી વધારે ક્લિષ્ટ અને સ્પષ્ટ હોય એ સ્વાભાવિક છે. આ ભેદ કેવળ અવિકારી નથી, તોપણ આ બે વર્ગની વનસ્પતિઓનાં પાંદડાંઓનું સિન્ન સ્વરૂપ મુખ્યત્વે નસોની ગોઠવણીને આભારી છે.

થડની ઉગવાની પદ્ધતિ, બરફે વૃક્ષો અને બીજી મોટી વનસ્પતિઓની બાબતમાં સામાન્ય રીતે બહુજ સિન્ન છે; કારણ કે દ્વિદળ વનસ્પતિનું થડ જડાઈમાં હુમેશાં વધ્યાંજ જાય છે. પણ ઘણી એકદળ વનસ્પતિઓની બાબતમાં, જ્યાં એકવાર થડ ઉત્પન્ન થયું કે પછી તે ઘેરાવામાં જરા પણ વધારે વધી શકતું નથી. તેથી દ્વિદળનું થડ અને ડાળીઓ લાંબા સમયે તેમના મૂળ આગળ એટલે પાયાની પાસે જડામાં જડાં

હોય છે, અને તેના થડનો સામાન્ય દેખાવ કાંઈક અંશે શંકુને મળતો આવે છે; એટલે તેનો નીચલો ઘેરાવો મોટો હોય છે, અને ઉંચે જતાં તે ધીમે ધીમે નાનો થતો જાય છે. ઘણી એકદળ વનસ્પતિઓનાં થડ નળાના જેવા આકારનાં હોય છે, અને તેના પાયા આગળ દ્વિપિ રાખી આખા વૃક્ષને આપણે જોઈએ તો તે ઉંધા શંકુના આકારનું આપણને દેખાશે.

આ બહારના ભેદ તેમના શરીરની અંદરની લિન્ન ઘટનાને આભારી છે. સામાન્ય રીતે, દ્વિદળ વનસ્પતિના યુવાન થડમાં વાહિની-તંતુઓ વર્તુળાકારમાં ગોઠવાયેલા હોય છે. એ વ્યવસ્થામાં કાષ્ઠ વર્તુળની અંદરની બાજુએ અને વલ્કલ (બાસ્ટ) બહારની બાજુએ હોય છે. એ બન્નેની વચ્ચે નાજુક સપાટા બંધ ઉગતી પરિવર્ધિની પેશિ (કેમ્બીઅમ) હોજર હોય છે, અને તે આ વનસ્પતિની જીંદગી પર્યંત વર્તુળની અંદરની બાજુએ નવું કાષ્ઠ અને તેની બહારની બાજુએ નવું વલ્કલ, ઉમેર્યાં જાય છે. ઘણાં વર્ષ મુધી જીવનારાં વૃક્ષોમાં એ પેશિ શિયાળાની ઋતુમાં આરામ લે છે. એ વાત ધ્યાનમાં રાખવાની છે, કે કાષ્ઠ મુખ્યત્વે મૂળીઆંએ ચૂમેલા પાણીને પાંદડાંઓ મુધી લઈ જાય છે, અને પાંદડાંઓમાં ઉત્પન્ન થયેલા ખોરાકના પદાર્થોને વલ્કલ વનસ્પતિના જે ભાગોને તેમની જરૂર હોય છે ત્યાં પહોંચાડે છે, અથવા, લવિધ્યના ઉપયોગ માટે તે તેમનો સંચય કરી રાખે છે. એકદળ વનસ્પતિના થડમાં વાહિની-તંતુઓ વર્તુળના આકારમાં ગોઠવાતા નથી; તેઓ અનિયમિતપણે થડમાં પથરાઈ અસંખ્ય અનિયમિત એકકેન્દ્રિક વર્તુળો બનાવે છે, અને ઘણીવાર તો

તેઓ ઘડના કેવળ મધ્ય ભાગમાં જ પડેલા હોય છે. દ્વિદળ વનસ્પતિની પેઠે એ દરેક વાહિની-રેસાને કાષ્ઠ અને વલ્કલ હોય છે, પણ સામાન્ય રીતે તેમાં પરિવર્ધિની પેશિ ગેરહાજર હોય છે; તેથી એકવાર રેસો ઉત્પન્ન થયો કે પછી તેની વૃદ્ધિ થતી અટકે છે. વધારેમાં, એકદળના ઘડમાં વાહિનો-તંતુઓ છૂટા છૂટા હોય છે, અને દ્વિદળના ઘડમાં તેઓ સામાન્ય રીતે જોડાયેલા હોવાથી કાષ્ઠ અને વલ્કલના અતૂટક પ્રદેશો બને છે. આ બધી બાબતોમાં દ્વિદળ વનસ્પતિઓ વિવૃતબીજને મળતી આવે છે. અને એકદળ વનસ્પતિઓની ઘટના તદન જુદીજ નાતની અને અન્ય વનસ્પતિઓથી તદન અસમાન છે. એક સમયે એવું ધારવામાં આવતું હતું, કે એકદળ વનસ્પતિઓ આદ્ય અને વધારે પ્રાચીન ઉદ્ભવિન્ન છે; પણ એ નવાઈ ભરેલી વાત છે કે વધારે પ્રાચીન વનસ્પતિઓનાં જીવશેષ, એટલે, ખટિકાયુગથી વધારે પ્રાચીન યુગના ખડકોમાંથી પ્રાપ્ત થતાં જીવશેષ પૈકી એકકેતુ યડ એકદળના ઘડને સમાન નથી. પણ હાલની સજીવ વિવૃતબીજ વનસ્પતિઓના જેવીજ બીજી ઘણી ઉદ્ભવિન્નતાનાં જીવશેષ દ્વિદળ વનસ્પતિઓને બહુજ મળતાં આવે છે.

આ જો 'વગેનો' મૂળીઆનો તંત્ર પણ લિન્ન છે. ઘણી દ્વિદળ વનસ્પતિઓને 'મુખ્ય-મૂળ' (ટેપ-રૂટ) હોય છે; આ મૂળ ઘડના અનુસંધાનમાં પૃથ્વીમાં નીચે ને નીચે વધે છે. ત્યાં મુખી થડ જીવે છે ત્યાં મુખી 'મુખ્ય-મૂળ' જીવે છે અને શાખાઓ અને ઉપશાખાઓ ઉત્પન્ન કરી તે વૃક્ષને જરૂરનાં નવાં મૂળ પૂરાં પાડે છે. એકદળ વનસ્પતિઓને

સામાન્યતા; શરૂઆતમાં મુખ્ય-મૂળ હોય છે, પણ પછી તે તરત જ મરી જાય છે. તે વનસ્પતિનાં લવિષ્યનાં બધાં મૂળ થડના નીચલા ભાગમાંથી ફૂટે છે. તેથી એકદળનાં મૂળીઆં જડાઈમાં વધી શકતાં નથી, અને આ બાબતમાં મૂળીઆં થડને ખૂબ મળતાં આવે છે. નાના છોડનું આદ્ય મૂળ બહુ જ નાનું હોવાથી વૃદ્ધ વનસ્પતિને તે ઉપયોગી થતું નથી, અને તે ઘેરાવામાં કે લાંબાઈમાં વધી મજબૂત થઈ શકતું ન હોવાથી થડના પાયામાંથી નવાં મૂળ વખતો વખત ઉત્પન્ન થવાં ખાસ જરૂરનાં છે.

આ બે વર્ગનાં ફૂલની બાબતમાં બહુ મહત્વનો ફેર નથી. માત્ર એક સહેજ તફાવત છે, અને તેને પણ ઘણા અપવાદ છે: એકદળના ફૂલના ભાગોની સંખ્યા ૩ કે ત્રણનો ગુણુક હોય છે, અને દ્વિદળના ફૂલના ભાગોની સંખ્યા ૪ કે પાંચ અથવા તેમનો કેઈ ગુણુક હોય છે. જાપાનમાં ખટિકાયુ-ગના ખડકોમાંથી પ્રાપ્ત થયેલા અને પાછળ વણુંવેલા અશ્મીભૂત જીવશેષને ત્રણ ફલદ-પત્રો હતાં, અને તેથી શાસ્ત્રીઓ તેને એકદળ વનસ્પતિનું અવશેષ માને છે.

તોપણ, અત્યંત અવિકારી અને વાસ્તવિક ભેદ તેમના ગર્ભ-ખીજમાં રહેલી દળની સંખ્યા છે, અને એ જ લક્ષણને ઉદ્દેશી શાસ્ત્રીઓએ તેમનાં નામ પાડેલાં છે.

દળને સામાન્ય રીતે ‘ખીજ-પત્ર’ કહે છે, તોપણ તેઓ હંમેશાં સાધારણ પાંદડાંઓના ધર્મો બજાવતાં નથી. ખાંડ-ખીજ વિગેરે વનસ્પતિઓમાં તેઓ કેવળ મંડળ (સ્ટાર્ચ) અને અન્ય ખોરાકના કોઠારની ગરજ સારે છે, અને ઘંઉ અને

બીજાં ઘાસની બાબતમાં તેઓ અંતંશુકીમાંથી ખોરાક ચૂસવાનું કામ કરે છે, પણ વાલ-ફલાવર, લંકી, સાઈકિમોર, અને કમળ વિગેરે ઘણી વનસ્પતિઓમાં તેઓ છેવટે વિસ્તૃત થઈ લીલો રંગ ધારણ કરે છે, અને ત્યારે તેઓ યથાર્થ પાંદડાંને આબેહુબ મળતાં આવે છે. લગભગ બધી વનસ્પતિઓમાં તેમનું એ જ ખરેખરું સ્વરૂપ છે. એકદળ વનસ્પતિમાં હમેશાં એકજ બીજ-પત્ર હોય છે; અને દ્વિદળની બાબતમાં બે કે થોડા અપવાદ છે, તોપણ લગભગ હમેશાં તેમને બે બીજ-પત્ર હોય છે. આ લેદ અગત્યનો છે, કારણ કે તે ગર્ભની વિકાસ-પદ્ધતિ અને આખી ઘટના ઉપર ભારે અસર કરે છે. એ વાત સુપ્રસિદ્ધ છે, કે બધી વિવૃતબીજ વનસ્પતિઓને હમેશાં બે દળવાળો ગર્ભ હોય છે. એ વાત સત્ય છે, કે આસોપાલવ વિગેરે કેટલીક વિવૃતબીજ વનસ્પતિઓના ગર્ભને બે કરતાં ઘણાં વધારે દળ હોય છે; તોપણ, એમ સાબીત થયું છે, કે પ્રથમ તો એમને પણ બેજ બીજપત્ર હતાં, અને શરૂઆતમાંજ તેમનું વિભાજન થઈ આ મોટી સંખ્યા ઉત્પન્ન થઈ છે.

એ રીતે, થડનો અને ગર્ભની રચનામાં, એટલે બે અતિ મહત્વનાં લક્ષણોમાં વિવૃતબીજ વનસ્પતિઓ દ્વિદળની સાથે મળતી આવે છે, અને એકદળ વનસ્પતિઓથી આ બાબતમાં તેઓ (વિવૃતબીજ) જૂદી પડે છે. એજ કારણોને લીધે પ્રાચીન ઉદ્ભિજ્જવેદાઓ દ્વિદળ વનસ્પતિઓમાં વિવૃતબીજનો સમાવેશ કરે છે. ઉદ્ભિજ્જવિદ્યાનાં અને વર્ગીકરણનાં પુસ્તકોમાં હજી પણ એજ પ્રથા ચાલે છે. પણ, હવે આ

પદ્ધતિ યથાર્થ છે એમ કહી શકાય નહિં. આધુનિક વિવૃત-
ખીજ વનસ્પતિઓની શરીર-રચના અને તેમનાં ઉત્પાદક
અવયવોનો વિકાસ બધી આવૃતખીજ વનસ્પતિઓથી તદ્દન
ભિન્ન છે, તોપણ એ વાત ખાસ યાદ રાખવાની છે, કે તેઓ
એકદળ વનસ્પતિઓના કરતાં દ્વિદળ વનસ્પતિઓને વધારે
સમાન છે.

પૃથ્વીની ઉદ્ભિન્નજ્ઞેમાં હાલમાં અગ્રગણ્ય લેખાતો
આવૃતખીજ વનસ્પતિઓનો મહાન વર્ગ કઈ વનસ્પતિઓ-
માંથી ઉત્પન્ન થયો? ઉદ્ભિન્નજ્ઞેની ઉત્ક્રાંતિના વિષયનો વિચાર
કરતાં પ્રથમ એજ પ્રશ્ન આપણા મગજ આગળ તરી આવે
છે. આ પ્રશ્નનો ઉત્તર મેળવવા માટે આપણે પ્રાચીન
જીવવિદ્યાના લેખને તપાસવો જોઈએ; કારણકે હાલની જીવંત
વનસ્પતિઓનો માત્ર તુલનાત્મક વિચાર કરી તેનો ખુલાસો
મેળવવામાં છેવટે કેવળ અનંત ઉદ્ધાપોહ અને કાલ્પનિક વાદ
ઉત્પન્ન થશે. તેથી હવે પછીના પ્રકરણમાં, આપણે પ્રથમ એ
જોઈશું, કે આવૃતખીજ વનસ્પતિઓ પૃથ્વી ઉપર પ્રથમ
ઉત્પન્ન થઈ, એવું સાબીત કરનાર જીવજોષ જે યુગના
ખડકોમાંથી આપણને પ્રાપ્ત થયું, તેની પહેલાં જ પસાર
થયેલા યુગના ઉદ્ભિન્નજ્ઞેનું કેવું સ્વરૂપ હતું; અને
પછી આપણે તપાસીશું, કે હાલની જીવંત વનસ્પતિઓમાં
એ યુગની કોઈ એવી ઉદ્ભિન્નજ્ઞે છે, કે જેઓ તેમની પછી
ઉત્પન્ન થયેલી સપુષ્પ વનસ્પતિઓની સાથે સંબંધ બતાવનારાં
ચિહ્નો પ્રગટ કરતી હોય.

પ્રકરણ ૩ જી



સયુગ્મ વનસ્પતિઓની ઉત્ક્રાંતિ અને તેનો પુરાવો

માધ્યમિક જીવયુગને ‘વિવૃતખીજનો યુગ’ કહે છે. અને આ વર્ણન એ યુગના મોટા ભાગને સંપૂર્ણ રીતે લાગુ પડે છે. એ સમય આ યુગની શરૂઆતથી તે ખટિકાયુગ સુધીનો છે, અને એજ સમયે આવૃતખીજ વનસ્પતિઓનું પ્રથમ દર્શણ થયું. ત્રિગુણિતસ્તરક્રમ અને વિવૃતખીજ-સ્તરક્રમના ખડકો જે સમયમાં બંધાયા તે અતિ લાંબા સમયના ગાળામાં પૃથ્વીની વનસ્પતિસૃષ્ટિમાં વિવૃતખીજ અગ્રગણ્યસ્થાન ભોગવતી હતી. તે પછીના સમયથી તે આજ સુધી આવૃતખીજ વનસ્પતિઓ જે સ્થાન ભોગવે છે તે સ્થાનનો માલીક તે યુગમાં તો વિવૃતખીજ વનસ્પતિઓજ હતી. ખટિકાયુગમાં પણ વિવૃતખીજનું રાજ્ય કેટલાક સમય સુધી ચાલ્યું, કારણ કે ખટિકા યુગનાં નીચલાં વળાંમાં માત્ર થોડી જ જગાઓએ આવૃતખીજનાં જીવશેષ આપણે હાથ લાગે છે. ત્યારે કાંઈ પણ વિશેષ વિવેચન કર્યા સિવાય કોઈ માણસ મધ્યજીવયુગ કે માધ્યમિક યુગની વનસ્પતિઓ સંબંધે વાત કરે છે, ત્યારે તે માણસ નિઃસંશય, લવિધ્યની આવૃતખીજને નહીં, પણ આ આદ્ય વિવૃતખીજ ઉદ્ભવિતજીનેજ ઉદ્દેશી વાત કરે છે.

માધ્યમિક જીવયુગની ખાસ વનરૂપતિઓ ત્રિશુષ્કિત-સ્તરયુગની શરૂઆતમાં જ બરાબર જાતની; અને ત્યારથી તે ખટિકાયુગના આરંભના સમય સુધી એ ઉદ્ભિન્નજ્ઞવર્ગે અદ્ભુત રીતે પોતાની એકરૂપતા સાચવી રાખી આ લાંબા સમયમાં હંસજળ પણ પુષ્કળ ઉગતી હતી, અને થોડી મીઠા હાર અને અશ્વપુચ્છી વનરૂપતિઓ પણ છુટી છવાઈ ઉગતી હતી, પણ તે સમયની ભૂનિવાસી ઉદ્ભિન્નજ્ઞસૃષ્ટિમાં પ્રધાન સ્થાન ખરેખર વિવૃતળીજા વનરૂપતિઓનું જ હતું.

આવૃતળીજા વનરૂપતિઓના ત્રણ ઉપવર્ગો છે: શંકુધારી; દ્વિપાલી પંખડો, અથવા, કુમારિકા કેશી વૃક્ષ (ગિ'કોએસ, મેડન-હેર-ટ્રી), અને તૃણદ્રુમી (માઈકેકઝ). પહેલા બે ઉપવર્ગોનું આપણે માત્ર ટૂંક વર્ણન કરીશું, કારણ કે તેમનું મહત્વ વિશેષ હોવા છતાં પણ તેમનાં જીવશેષ પ્રસ્તુત પ્રશ્નની સાથે બહુ પ્રત્યક્ષ સંબંધ ધરાવતાં નથી.

શંકુધારી વનરૂપતિઓ માધ્યમિક જીવયુગમાં બહુ આરી જામેલી હતી, પીતદ્રુ (એરોકેરિઆસ), સરલ (પાઈન્સ), સર (સાઈપ્રેસ), સાર (યુ) વિગેરે હાલનાં બધાં સજીવ કુટુંબોનાં વાસ્તવિક જીવશેષો વિવિધ માધ્યમિક યુગના ખડકોમાંથી આપણે હાથ ચઢ્યાં છે. તેમનાં જીવશેષો વિવિધ અને પુષ્કળ છે, પણ ઘણીવાર તેમનું ચોક્કસ ઓળખાણ કરવું મુશ્કેલ પડે છે. તેપણ, કુલ સંરવાળે, માધ્યમિક યુગની શંકુધારી વનરૂપતિઓ હાલની એજ જાતની ઉદ્ભિન્નજ્ઞેથી

ઘણી લિન્ન નથી, અને ઉચી કોટિની મપુષ્પ વનસ્પતિઓની સાથે સંબંધ બતાવનાર એકે લક્ષણ એ જીવશેષોમાં હાજર નથી.

કુમારિકાકેશી (દ્વિપાલી પંખડો) નામના આશ્ચર્યકારક વૃક્ષનાં પાંદડાં કુમારિકાકેશી હંસરાજની (એડિએન્ટમ) પાંદડીઓને બહુજ મળતાં આવતાં હોવાથી તેનું એવું નામ પાડેલું છે. એ અદ્ભુત ઉપજાત હાલમાં તદ્દન વિખૂટી પડેલી છે અને હાલની જીવંત ઉદ્ભિન્નસૃષ્ટિમાં તેનો કોઈપણ સંબંધી હાજર નથી. ભૂસ્તરવિદ્યાના ઉલ્લેખ ઉપરથી એવું સાબીત થાય છે, કે તે એક પ્રાચીન કુટુંબનો છેલ્લો વંશજ છે. એ કુટુંબનાં જીવશેષો માધ્યમિક યુગના અને તેથી પણ જૂના પ્રાચીન જીવયુગના ખડકોમાંથી પુષ્કળ મળી આવે છે. જો ચીન અને જાપાનમાં આ કુમારિકાકેશી વૃક્ષને બહુ જ પવિત્ર માનવામાં ન આવ્યું હોત, એને તેને ખૌદ દેવળોના બગીચાઓમાં ઉછેરવામાં ન આવ્યું હોત, તો એ કુટુંબનો એક વંશજ આજે હયાત રહ્યો હોત નહિ. હાલમાં જીવંત બધાં કુમારિકાકેશી વૃક્ષો કૃત્રિમ ઉછેરનું પરિણામ છે, પણ પશ્ચિમ-ચીનના પર્વતોમાં ઉગતાં એ વૃક્ષો કદાપિ જંગલી હોવાનો સંભવ છે.

કુમારિકાકેશી વૃક્ષનાં આલુના જેવાં બીજ અને તેની ફલનની રીત તૃણકુમ્ભી વૃક્ષોને બહુ જ મળતાં આવે છે. આઠમિક જીવયુગની ઉદ્ભિન્નસૃષ્ટિમાં તૃણકુમ્ભી રહેલે

નંબરે હતી. આવૃતખીજની ઉત્કાંતિના પ્રશ્નનો વિચાર કરવામાં તૃણદ્રુમી વૃક્ષો બહુ જ અગત્યનું સાધન હોવાથી, અને વધારેમાં, તેઓ ઉદ્દલિન્નજ્ઞેતાઓ સિવાય ખીજ માણસોને વધારે પરિચિત ન હોવાથી તેમના વિષે આપણે સંપૂર્ણ વિવેચન કરીશું.

તૃણદ્રુમીની સંખ્યા હાલમાં ઘણી જ ઘટી ગયેલી છે, તોપણ તે કુમારિકાકેશી વૃક્ષના કુટુંબ જેટલી ક્ષીણ થયેલી નથી. હાલની ઉદ્દલિન્નજ્ઞસૃષ્ટિમાં તેના વંશજ તરિકે 'તૃણદ્રુમ' (સાઇકેડેસી) નામનું માત્ર એક જ નાનું કુટુંબ છે. એ કુટુંબમાં નવ જાતો અને આશરે ૧૦૦ ઉપજાતો છે. એ વૃક્ષો બહુ જ સુંદર હોય છે. તેમનાં પાંદડાનો દેખાવ તાડના જેવો હોવાથી અને કેટલાંક તૃણદ્રુમીમાંથી સાબુ-દાણાના જેવી એક જાતની વસ્તુ નીકળતી હોવાથી તેમને લોકો 'સાબુ-તાડ' (સેગો-પામ્સ) પણ કહે છે. તોપણ, એ વાત ખાસ યાદ રાખવાની છે, કે યથાર્થ તાડની સાથે તેમને કાંઈ જ લેવા દેવા નથી એતરોમાં તેઓ કેટલીક વાર છૂટી છવાઈ ઉગેલી હોય છે, પણ ઉદ્દલિન્નજ્ઞવિદ્યાનો અભ્યાસ કરવા માટે ખાસ ઉછેરેલા બાગોમાં તેઓ મોટા જથ્થામાં ઉગે છે. ટેમ્સ નદીને કિનારે, કચ્છ નામના શહેરના સુંદર બાગોમાં અને મુખ્યત્વે તેના 'તાડ-ગૃહમાં' આ વન-સ્પતિઓનો સુંદર સંગ્રહ કરેલો છે, તેઓ પૃથ્વીના ગરમ અને સમશીતોષ્ણ પ્રદેશોની વતની છે. તેની નવ જાતો પૈકી. એક સાઇકસ એશિયા અને ઑસ્ટ્રેલિયામાં ખૂબ ઉગે છે.

મેક્ષિકોએમિઆ અને બોવેનિઆ એ જાતો માત્ર ઑસ્ટ્રેલિઆમાં જ ઉગે છે; એન્સેફેલેટેસિ અને સ્ટેન્જેરિઆ આ બે જાતો દક્ષિણ આફ્રિકાની વતની છે; અને એમિઆ, સીરેટોએમીઆ, ડિઉન અને માઇકોસાઇકાસ એ ચાર જાતો અમેરિકામાં વસે છે. આ છેલ્લી જાતની માત્ર એકજ ઉપજાત હાલમાં હયાત છે, અને તે માત્ર કયુબાના ટાપુમાંજ આપણી નજરે આવે છે. જો કે આ કુટુંબના સભ્યો મોટા જથ્થામાં આપણને મળી આવતા નથી, તોપણ એ કુટુંબ આખી પૃથ્વી ઉપર, એ રીતે, વિસ્તરેલું છે.

હાલની સજીવ તૃણક્રુમી વનસ્પતિઓ કેટલીવાર વૃક્ષના જેટલી ઉંચી ઉગે છે. માઇકોસાઇકાસ ૩૦ ફુટ ઉંચી વધે છે; ડિઉનની ઉપજાત મેક્સીકોમાં ૪૦ ફુટ, અને ઑસ્ટ્રેલિઆમાં ઉગતી તૃણક્રુમીની એક ઉપજાત ૬૦ ફુટ ઉંચી ફાલે છે. એન્સેફેલેટેસિની કેટલીક ઉપજાતો જ્યારે ઘરડી થાય છે, ત્યારે તેઓ નાનાં ઝાડનું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે. તોપણ, એ કુટુંબની ઘણી ઉપજાતોનાં થડ દીર્ઘાયુ અને ભરાવાદાર હોવા છતાં પણ ટૂંકાંજ રહે છે.

બહુજ મોટા ઠંઢવાળાં તેમનાં લગભગ બધાંજ પાંદડાંઓ સામાન્ય રીતે પીંછાના જેવાં હોય છે, અને તેમની વચલી નસને બન્ને બાજુએ પાંદડીઓની હાર હોય છે. ઑસ્ટ્રેલિઆની બોવેનિઆ નામની જાતમાં આ પાંદડીઓનું પણ એજ રીતે વધારે વિલાજન થયેલું હોય છે, અને આનામમાં થોડાજ

સમય ઉપર નજરે આવેલી સાઇકસ નામની જાતમાં દરેક પાંદડી બે કે વધારે વાર ફંટાયેલી હોય છે. આફ્રિકામાં ઉગતી સ્ટેન્જેરિઆનાં પાંદડાંની નસોની ગોઠવણી આબેહુબ હંસરાજને મળતી આવતી હોવાથી, જ્યારે તે પ્રથમ ઇંગ્લાંડમાં આવી ત્યારે તેને લોમેરિઆ (હંસરાજની એક જાત) ધારવામાં આવતી હતી, અને જ્યારે પાછળથી તેના શંકુઓ દેખાયા ત્યારેજ તેનું સત્ય સ્વરૂપ ત્યાંના શાસ્ત્રીઓને સમજાયું. કેટલીક તૃણદ્રુમી વનસ્પતિઓમાં હંસરાજનું એક બીજું લક્ષણ હાજર હોય છે: તેમની કળીમાં રહેલાં પાંદડાંઓ હંસરાજની પેઠેજ વળી ગયેલાં હોય છે. હંસરાજના પાંદડાની કળી ખીલે તે પહેલાં તેનું બાળક જનનપર્ણ કેવું કુંડલના જેવું વળી ગયેલું હોય છે ! આ બાળતમાં ઝેમિઆ નામની જાતમાં, આખું પાંદડું હંસરાજના જનનપર્ણને મળતું આવે છે, અને સાઇકસ નામની જાતમાં પાંદડીઓ કુંડળની પેઠે વળી ગયેલી હોય છે. આપણને થોડીવારમાં જણાશે, કે આ નજીવું લાગતું સાદૃશ્ય બહુ મહત્વનું છે.

ઘણી તૃણદ્રુમીમાં દરેક પાંદડીની નસો પરસ્પર સમાંતર પથરાયેલી હોય છે; સ્ટેન્જેરિઆની બાળતમાં તદ્દન સ્પષ્ટ મધ્ય-નસ હોય છે, અને તેમાંથી દરેક બાજુએ પસાર થતી નસો હંસરાજના જનનપર્ણની પેઠે ફંટાયેલી હોય છે; સાઇકસની જાતની બાળતમાં દરેક પાંદડીને માત્ર મધ્ય-નસ હોય છે, પણ તેની કોઇપણ બાજુએ આડી નસો ફૂટેલી હોતી નથી.

એન્સેફલોટેસિ, ડિઉન, સીરેટોઝેમિઆ, મેક્રોઝેમિઆ,

અને સાધકસની કેટલીક ઉપજતો વિગેરે ઘણી તૃણુક્રુમી વનસ્પતિઓનાં થડ એક જાતના બખ્તરથી ઢંકાયેલાં હોય છે. આ બખ્તર જૂના પાંદડાઓના પાયાઓનું બનેલું હોય છે, અને તે ઘણા વર્ષો મુધી થડનું રક્ષણ કરે છે. એ કુટુંબની બાકીની જાતોમાં આ બખ્તર લાંબો સમય ટકતું નથી. ઘણી ઉપજતોમાં આ લીંગડાંઓ થોડા થોડા સમયને અંતરે ઉત્પન્ન થાય છે, અને તેથી તેમની બાબતમાં એ બખ્તર પાંદડાઓના નાના મોટા પાયાઓના અવાર નવાર પ્રદેશોનું બનેલું હોય છે. મોટો ભાગ લીલાં પાંદડાંઓને લીધે અને નાનો ભાગ લીંગડાઓને લીધે ઉત્પન્ન થયેલો હોય છે.

તેમના થડમાં પુષ્કળ ગર હોય છે, અને તેનો વ્યાસ આખા થડના વ્યાસથી લગભગ અડધો હોય છે. આ બાબતમાં તૃણુક્રુમી વનસ્પતિઓ શંકુધારી અને ઘણી દ્વિદળ વનસ્પતિઓથી જૂદી પડે છે. બાકીની બાબતમાં તેના થડની ઘટના મામાન્ય વિવૃતખીજના થડને સમાન હોય છે, અને આપણે પાછળ વાંચી ગયા કે વિવૃતખીજનું થડ આવૃતખીજને બહુજ મળતું આવે છે. તૃણુક્રુમીના થડમાં કાષ્ઠ અને વડકક ઘણીવાર બહુજ થોડો વિકાસ પામેલાં હોય છે, અને તેનું થડ બહુજ નરમ અને દળદાર લાગે છે. દાખલા તરિકે, મેક્સિકોમાં વસતી ડિઝેન એડયુલ નામની ઉપજતનું એક થડ ૧૨૦ વર્ષની ઉંમરનું હોવા છતાં પણ તેનો વાહિની તંતુઓનો પ્રદેશ ફક્ત ૦.૦૦૦૦૦૦૦૦ મિટર (૧ ઇંચ) જાડો હતો. એટલે તેનું કદ થડની ત્રિજ્યાનો ૧૦૦ હતું. જ્યાં એ થડનો વ્યાસ બહુજ વધારે મોટો થાય છે,

ત્યાં એ દૃશ્ય બહુજ વિચિત્ર રીતે બને છે: આદ્ય પરિવર્ધિની પેશિની ચંચળતા અટકી જાય છે, અને બહારની બાજુએ એવીજ નવી પેશિ ઉત્પન્ન થાય છે, અને આ ક્રિયા એ થડમાં ઘણીવાર બને છે. એ રીતે તેનું કાષ્ઠ અનેક થરની પરંપરાનું બનેલું હોય છે, અને એ દરેક થર તેની પોતાનીજ પરિવર્ધિની પેશિથી બાપન્ન થયેલો હોય છે. સાઈકાસ, મેક્રોએમિઆ, અને તૃણદુભિની બીજી કેટલીક જાતોમાં એજ પ્રમાણે બને છે. આ વનસ્પતિવિશેષના થડની અંદરની રચના સંબંધે બીજી ઘણી રમુજી હકીકત જાણવા જેવી છે, પણ હમણાં આપણે એ સર્વનું વિવેચન મુલતવી રાખીશું. હવે આપણે એકદમ તેનાં ઉત્પાદક અવયવો તરફ વળીએ.

હાલની જીવંત તૃણદુભી વનસ્પતિઓમાં પુલ્લિંગ અને સ્ત્રિલિંગ અવયવો હમેશાં ભિન્ન હોય છે અને તેઓ હમેશાં જાદી વનસ્પતિઓની ઉપર ઉગે છે. સામાન્ય રીતે, આ જનનેન્દ્રિયો (ફેક્ટીરીકેશન્સ) શંકુના આકારમાં ઉત્પન્ન થાય છે, અને તેઓ શંકુધારી વનસ્પતિઓના શંકુના જેવીજ, પણ રચનામાં વધારે સાદી હોય છે. આ કુટુંબની બધી પુલ્લિંગ જનનેન્દ્રિયોની બાજતમાં આ વાત કેવળ સત્ય છે; એ કુટુંબની નવ જાતો પૈકી આઠ જાતોમાં સ્ત્રિલિંગ જનનેન્દ્રિયો પણ શંકુના રૂપમાં હોય છે, પણ સાઈકાસ નામની જાતમાં સ્ત્રિલિંગ જનનેન્દ્રિય કાંઈક જુદીજ રચનાવાળી હોય છે. તેના શંકુઓને દીંટાં હોય છે, અને તેઓ થડની ટોચ ઉપર ઉગે છે. આ વર્ગની ઘણી ઉદ્ભિન્નજ્ઞેના અવલોકન ઉપરથી એ

વાત સ્પષ્ટ થાય છે, કે એ શંકુ અરેખર પ્રથમ આખી વનસ્પતિની ટોચમાંથી ઉગે છે અને થડની લવિષ્યની વૃદ્ધિને લીધે પછી તે બાજુ ઉપર ખસી જાય છે.

બન્ને શંકુઓ બહારના દેખાવમાં લગભગ સમાન હોય છે, અને સ્વલિંગ શંકુ સામાન્ય રીતે વધારે મજબૂત હોય છે.

પ્રથમ આપણે પુલ્લિંગ જનનેંદ્રિયો સંબંધે વાત કરીશું. તેમનું કદ બહુજ મોટું હોય છે, દીંટા સિવાયનો એ શંકુ ઘણીવાર ૧ ફુટ કે તેથી પણ વધારે ઉંચો વધે છે.

આ શંકુની ઉપર ૬૦૦ થી પણ વધારે લીંગડાં ખીચા-ખીચ ઉગેલાં હોય છે, અને એ લીંગડાંમાં પરાગકોશ આવેલાં છે. તેથી આ લીંગડાં સપુષ્પ વનસ્પતિઓના નરકેસરોને મળતાં આવે છે. પણ તેમની રચના એ નરકેસરોથી તદ્દન ભિન્ન છે. એ લીંગડાનો છેડો બહુજ લાંબો હોય છે અને તેનો આકાર ઘણીવાર ઢાલના જેવો હોય છે; ઘણીવાર તેનો આકાર સાદા પાંદડાના જેવો પણ હોય છે. એ લીંગડાના નીચલા પૃષ્ઠને પરાગકોશ વળગેલાં હોય છે, અને તેમની સંખ્યા ૧૨ થી ૧૦૦૦ સુધી ગમે તે હોય છે. ઝેમિઆ નામની જાતમાં ૧૨ અને સાઈકસમાં તેમની સંખ્યા ૧૦૦૦ ની હોય છે. એ પરાગકોશ હંસરાજનાં જનનપર્ણોની ઉપર આવેલાં અલિંગકોષાગારોના જેવાં જ હોય છે, અને તેમની પેઠે તેઓ પણ પુલ્લે (સોરી) એટલે નાના નાના સમૂહોમાં (દરેક સમૂહમાં ૨ થી

૬ પરાગકોશ હોય છે) ગોઠવાયેલાં હોય છે. શંકુના પરિપક્વ નરકેસરમાં આ વાત સહેલાઈથી જોઈ શકાતી નથી. દરેક પરાગકોશમાં પરાગકણની મોટી સંખ્યા ઉત્પન્ન થાય છે, અને એ પરાગકોશમાં એક સ્થળે ચીરો પડવાથી તેઓ તેમાંથી છટકી જાય છે; અને શંકુનાં ભીંગડાંઓ જરા ઢીલાં થાય છે, એટલે તે પરાગકણ હવામાં ખૂલેલાં થાય છે. આ બધી વ્યવસ્થા આવૃત્તબીજના નરકેસરથી તદ્દન જુદીજ નાતની છે. સામાન્ય રીતે, આ નરકેસરની ટોચ ઉપર દરેક બાજુએ બે એમ એકંદરે ચાર પરાગકોશ વળગેલાં હોય છે. એ શંકુ શંકુધારી ઉદ્દલિન્ગજ્ઞેના શંકુને વધારે મળતો આવે છે, તોપણ આ કુટુંબમાં પરાગકોશની સંખ્યા આઠલી બધી મોટી હોતી નથી.

સ્ત્રિલિંગ શંકુનું વર્ણન કરવામાં પ્રથમ આપણે સાકાઈસને બાજુ ઉપર રાખીશું. નીચે આપેલું વર્ણન બાકીની આઠ જાતોના સ્ત્રિલિંગ શંકુને લાગુ પડે છે.

સ્ત્રિલિંગ શંકુનાં ભીંગડાં પુદ્લિંગ શંકુનાં ભીંગડાંના જેવાંજ પણ તેમનાથી વધારે મોટાં અને સંખ્યામાં ઓછાં હોય છે; ડિઝેનના સ્ત્રિલિંગ શંકુનાં ભીંગડાંનું સ્વરૂપ લગલગ સામાન્ય પાંદડાંના જેવું જ હોય છે. આ ભીંગડાંઓને ફલદ-પત્ર કહીએ તો ચાલે, કારણ કે તેમની ઉપર પુષ્પાંડ ઉગેલાં હોય છે, પણ નરકેસરની પેઠે, તેમની અને સપુષ્પ વનસ્પતિઓનાં એવાંજ અવયવોની વચ્ચે બીજાં કાંઈ જ વધારે સામ્ય નથી. આ ભીંગડા રૂપી દરેક ફલદ-પત્રની ઉપર બે પુષ્પાંડ હોય છે,

અને ફલનની ક્રિયા થયા સિવાય પણ તેઓ નાના આલુના જેટલાં મોટાં વધી શકે છે. (સાઈકસનાં પુષ્પાંડ તો એથી પણ વધારે મોટાં થાય છે). પરિપક્વ થયેલા શંકુઓ ઘણીવાર બહુજ મુંદર હોય છે; દાખલા તરિકે, એન્સેફલોટેસિના શંકુનાં ભીંગડાં એ સમયે નારંગી રંગનાં બને છે, અને તેમની વચ્ચે વચ્ચે દેખાતાં બીજ ચળકતા લાલ રંગનાં હોય છે. તેમનો દેખાવ મુંદર રંગવાળા સ્પિન્ડલ-બેરિના જેવો હોય છે, પણ આ બાબતમાં બીજ અને ફલદ-પત્રના રંગો ઉલટામુલટી કોઈ પ્રસ્તુત શંકુના રંગની મુરબી જરા વધારે આગળ પડતી દેખાય છે.

અત્યાર મુધી આપણે જે તૃણદ્રુમીઓનું વર્ણન કર્યું તે બધી શંકુધારી ઉદ્ભિન્નજો છે, અને તેમની જનનેંદ્રિયો સામાન્યતઃ શંકુધારી વનસ્પતિઓને મળતી આવે છે; તોપણ, આ બે ઉદ્ભિન્નજવર્ગોની જનનેંદ્રિયો ઝીણી ઝીણી બાબતોમાં બહુજ ભિન્ન છે, અને તૃણદ્રુમીનાં એ અવયવોની રચના વધારે સાદી છે. આવૃતબીજના યથાર્થ પુષ્પોથી આ શંકુઓ તદ્દન ભિન્ન છે, તોપણ તેમની અને પુષ્પોની વચ્ચે ઘણી સમાનતા છે; કારણ કે શંકુ અને નમુનારૂપ પુષ્પો બન્ને નરકેસર કે ફલદ-પત્રના નિવાસ માટે, વનસ્પતિએ ખાસ ઉત્પન્ન કરેલી શાખાઓ છે. બધી સજીવ બીજધારી વનસ્પતિઓને પુષ્પો કે શંકુઓ હોય છે, એટલે, તેઓ હમેશાં ખાસ શાખાઓ ઉત્પન્ન કરે છે, અને તેમની ઉપર ઉત્પત્તિના કાર્યમાં ભાગ લેનારાં ખાસ પાંદડાંઓ ઉગે છે. માત્ર એ 'સંબંધે

એકજ અપવાદ છે. સાધકસ જાતની ત્રિલિંગ વનસ્પતિની રચના આ બાબતમાં લિન્ન હોય છે. તેને સ્વતંત્ર શંકુ કે પુષ્પ હોતું નથી; તેનાં ફલદ-પત્રો સામાન્ય પાંદડાંઓના જેવાંજ અવયવો છે, અને તેઓ સાધારણ પાનની જેમ એ વનસ્પતિના મુખ્ય ઘડમાથી જ ફૂટેલાં હોય છે. ત્યારે પુષ્પ ભેસવાનો મમય થાય છે ત્યારે તેના ઘડની ચારે બાજુએ ફલદ-પત્રોનું ઝુમખું ઉગે છે, અને તેનું કામ પૂરું થતાંજ તે ખરી પડે છે, અને તેની જગાએ પાછાં નવાં લીલા રંગનાં પાંદડાંઓ ઉત્પન્ન થાય છે. તેથી ત્રિલિંગ સાધકસના ઘડનું બખ્તર ત્રણ જાતનાં જૂદાં જૂદાં પાંદડાંઓના : સામાન્ય પાંદડાં, ભીંગડાં અને ફલદ-પત્રોના પાયાઓનું બનેલું હોય છે. ત્રિલિંગ સાધકસ પોતાના મુખ્ય ઘડની ઉપરજ બીજ-કણુદલ (સ્પેરોફીટસ) એટલે ઉત્પત્તિને લગતાં પાંદડાંઓ ઉત્પન્ન કરતી હોવાથી તે હંસરાજ વનસ્પતિની કોટિમાં આવે છે. શહામૃગી હંસરાજનાં (ઑસ્ટ્રીય ફર્ન) બીજકણુદલ તેનાં સામાન્ય જનનપર્ણોથી લિન્ન હોય છે, તોપણ તેઓ બન્ને તેજ ઘડ ઉપર ઉગે છે. બીજ કોષપણુ જીવંત બીજધારી વનસ્પતિ સાધકસના જેટલી સાદી નથી. તોપણ, આપણે આ પુસ્તકના ચોથા પ્રકરણમાં જોઈશું, કે પ્રાચીનજીવયુગની બીજધારી વનસ્પતિઓ સાધકસના જેટલીજ સાદી હતી.

સાધકસનાં ફલદ-પત્રો અદ્ભુત રચનાવાળાં છે, અને બીજ કોષપણુ વનસ્પતિનાં ફલદ-પત્રો કરતાં તેઓ પાંદડાંનું

અર્થ સ્વરૂપ વધારે અંગે પ્રગટ કરે છે. દાખલા તરિકે, સાધકસ રિવોલ્યુટા નામની ઉપજાત હાલમાં ઘણે સ્થળે ઉછેરવામાં આવે છે. તેનું ફલદ-પત્ર નવ ઇંચ લાંબું હોય છે, અને તેનું પાત્ર ક્વાંટીવાળું અને ઉડી ખાંચ વાળું હોય છે; તેના દીંટાના જેવા નીચલા ભાગની દરેક બાજુએ સામાન્ય રીતે ૬ પુષ્પાંડ હાજર હોય છે. સાધકસ સર્સિનિલિસનું ફલદ-પત્ર વધારે સાંકડું, અને તેના પાનના ભાગે દાંતના જેવા તીણા અને પાતળા હોય છે. આંટ્રેલિઆમાં ઉગતી સાધકસ નોર્મેન્જિઆના નામની ઉપજાતના ફલદ-પત્રને માત્ર બેજ પુષ્પાંડ હોય છે. ઘણી વિવૃતબીજ વનસ્પતિઓન કરતાં સાધકસની ઉપજાતમાં એ મહાન્ વર્ગનું મુખ્ય લક્ષણ વધારે સ્પષ્ટ છે, કારણ કે તેનાં પુષ્પાંડ તેના છવનકમમાં હમેશાં ખૂલ્યાંજ રહે છે, અને પાકાં થઈ છેવટે તેઓ જમીન ઉપર ખરી પડે છે. સાધકસના બીજનું કદ બહુજ અસાધારણ હોય છે-તેની કેટલીક ઉપજાતોમાં તે તેઓ સપ્તાલૂ (પીચ) ફળના જેટલાં મોટાં હોય છે; તેમની ઘટના પણ સપ્તાલૂ કે આલુને મળતી આવે છે, કારણ કે તેના બહારનો ભાગ નરમ અને દળદાર હોય છે, અને તેની અંદર ઠળીઓ હોય છે. તોપણ, સાધકસની બાજતમાં, એ આખી વસ્તુ વિકાસ પામેલું બીજ છે, અને સપ્તાલૂની બાજતમાં ઠળીઆના ગર્ભ સિવાયની દરેક વસ્તુ ફળને લગતી છે. એન્સેફલોટેસિના સંબંધે આપણે જે સુંદર ચળકતા રંગનો વિરોધ વર્ણવ્યો તેવોજ વિરોધ સાધકસની કેટલીક ઉપજાતોમાં હાજર છે. સાધકસ રિવોલ્યુટામાં ખીળાં ફલદ-પત્રોની ઉપર

ઉગેલાં ચળકતા લાલ રંગનાં પુષ્પાંડ કે બીજ બહુ જ મુંદર દેખાવ આપે છે.

ત્યારે એ વાત હવે સ્પષ્ટ થઈ, કે જનનેંદ્રિયોની ઘટનામાં તૃણદ્રુમીનું કુટુંબ બીજી બીજધારી વનસ્પતિઓથી નક્કી વધારે સાદું છે. એ કુટુંબમાં પણ સુખ્યત્વે સાઈકસની જાત અત્યંત સાદી છે; આ જાતની સ્ત્રિલિંગ વનસ્પતિની ઘટના કેટલી સાદી છે તે આપણે પાછળ જોઈ ગયા. હાલની સજીવ બીજધારી વનસ્પતિઓમાં માત્ર સાઈકસનેજ કુલ કે શંકુ બેસતો નથી; તેનાં ફલદ-પત્રોનું સ્વરૂપ સામાન્ય પાંદડા-ઓના જેવુંજ છે, અને વધારેમાં, તેઓ સામાન્ય પાંદડાઓની પેઠે તેના સુખ્ય થડમાંથીજ ફૂટેલાં હોય છે.

બીજધારી વનસ્પતિઓમાં તૃણદ્રુમીનું કુટુંબ આદ્ય અને પ્રાચીન છે, તથા તે અલિંગકોષધારી વનસ્પતિઓને વધારે મળતું આવે છે, એવું સ્પષ્ટ કરનાર બીજી પણ બાબતો છે. તૃણદ્રુમીના ફલનની પદ્ધતિ બહુજ આશ્ચર્યકારક છે. હિરેસ અને ઇકિનો નામના બે જાપાનના ઉદ્દલિન્ગજોએતા-ઓએ આ વાત ૧૪ વર્ષ ઉપર શોધી કહાલી, અને ત્યાર પછી થોડા સમયે અમેરિકામાં મી. વેબરને એજ વાત સ્વતંત્ર રીતે સમજાઈ. ઘણી પ્રચન્નબીજા વનસ્પતિઓની પેઠે, તૃણદ્રુમી વનસ્પતિઓ શુક્રકોષ (સ્પર્મેટોઝોઈડઝ), એટલે સ્વતંત્રપણે હલનચલન કરનારાં પુલિંગ કોષોના સાધનથી ફલનનું કાર્ય સિદ્ધ કરે છે. કુમારિકાકેશી સિવાય બીજી કોઈપણ બીજધારી વનસ્પતિ આ રીતે ફલન કરતી નથી.

કહે છે. બીજકની ટોચ જરા ચપટી થઇ ઉઠે ખાડો બનાવે છે, અને એ ખાડો પરાગ-ગૃહના (પોલન ચેમ્બર) નામથી ઓળખાય છે, પ્રાચીન જીવયુગનાં ઘણાં બીજમાં પરાગ-ગૃહ હાજર હતું, તોપણ હાલની સજીવ વનસ્પતિઓમાં તો તે માત્ર તૃણદ્રુમી અને કુમારિકાકેશીનાંજ પુષ્પાંડમાં આપણી નજરે આવે છે.

પવનના સપાટાથી ઘસડાઇ આવેલો, અથવા, દક્ષિણ આફ્રિકાની કેટલીક તૃણદ્રુમી વનસ્પતિઓની બાબતમાં બને છે તેમ, જીવડાંઓની મારફત આવી પહોંચેલો પરાગ પુષ્પાંડના દ્વારકમાં પડે છે, અને તેમાં એક જાતના ચીકણા પદાર્થનું ટીપું હાજર હોવાથી તે ત્યાં ચોંટી રહે છે. એ ટીપાનું બાબી-લવન થવાથી અથવા તે ફરીથી અંદર ચૂસાઇ જવાથી પરાગકણ ઉપર વર્ણવેલા સાંકડા રસ્તામાં નીચે અને નીચે ઉતરે છે, અને છેવટે એ રસ્તાને તળીએ આવેલા પરાગ-ગૃહમાં તે આવી પહોંચે છે. આ સ્થળે દરેક પરાગકણ અટકે છે અને પોતાના શરીરમાંથી એક નળી ઉત્પન્ન કરી તેના ફાંટાઓને તે આસપાસની પેશિમાં દાખલ કરે છે. એ રીતે પરાગનયનનું (પોલીનેશન) કાર્ય સમાપ્ત થાય છે. ચથાર્થ ફલનનું કાર્ય થોડા મહિના વીત્યા બાદ થાય છે. એટલા સમયમાં પુષ્પાંડ પૂરેપૂરું વિકસી બીજ બને છે. પરાગનયન અને ફલનનાં દશ્યોની વચ્ચેના ગાળામાં, બીજના મધ્ય ભાગમાં આવેલું ગર્ભ-કોશ (મેગાસ્પોર) ધીમે ધીમે વધી બહુ જ મોટું થાય છે. તે અંતર્થુકી અથવા અનુસમાંગની

(પ્રોથેલસ) પેશિથી ચીકાર ભરાઈ જાય છે, અને તેના ઉપલા છેડા ઉપર તેણે કેટલાંક અંડ-કોષો ઉત્પન્ન કર્યા છે. એ વાત ધ્યાનમાં રાખવાની છે, કે બધી વિવૃતખીજા ઉદ્ભવિજાતોમાં અંતશુક્રીની પેશિ ફલનનું કાર્ય શરૂ થાય તે પહેલાં ઉત્પન્ન થાય છે. તૃણદ્રુમીની ખાખતમાં દરેક વસ્તુનું સ્વરૂપ મોટું હોય છે; તેનાં અંડ-કોષ પણ ખૂંટી આંખે જોઈ શકાય એટલાં મોટાં હોય છે. આ ક્રિયાઓ થઈ તે દરમિયાન પરાગનલિકા પણ બહુજ લાંબી વધેલી હોય છે, અને ખીજા વિકાસે ઉપરાંત તેમાં એક મહત્વનો ફેરફાર એ થયેલો છે, કે તેના અંદરના ભાગમાં હવે શુક્રકોષ એટલે જ મોટાં પુલિંગ કોષ ઉત્પન્ન થયેલાં છે. આ દરેક પુલિંગ કોષને એક છેડે લાંબો અને ગોળ ગોળ વળેલો એક પટ્ટો હોય છે, અને તેની ઉપર અસંખ્ય કોષકેશ અથવા નાનુક રેસાઓ ઉત્પન્ન થાય છે. આ રેસાઓની મદદથી શુક્રકોષ હાલી ચાલી શકે છે. પાણીથી ફૂલેલી પરાગ-નલિકા હવે જરા લાંબી વધી શુક્રકોષવાળા છેડાને અંડ-કોષોની પાસે લાવે છે. પરાગ-નલિકામાંનાં શુક્રકોષ નળીમાંજ ચક્કર ચકકર ફરે છે, કારણ કે હવે તેઓ યથાર્થ અને અંચળ શુક્રકોષો બન્યાં છે. પછી પરાગ-નલિકા ફાટી જાય છે, અને શુક્રકોષો બંધનમાંથી છૂટાં થાય છે. પરાગનલિકાઓમાંથી ધસી આવેલા પાણીમાં તેઓ અંચળ કોષકેશના સાધનથી તરે છે, અને થોડુંક જરૂરનું અંતર કાપી અંડ-કોષોની પાસે જઈ તેમની સાથે જોડાઈ જાય છે. એ રીતે, ફલનનું કાર્ય સિદ્ધ થાય છે. દરેક શુક્રકોષ માત્ર એકજ અંડ-કોષનું ફલન કરે છે.

ઉંચી કોટિની વનસ્પતિઓમાં માત્ર તૃણદ્રુમી અને કુમારિકાકેશી વૃક્ષોએજ, પોતાના જીવનક્રમમાં, પ્રચન્નખીજ વનસ્પતિઓની, ચંચળ અને ચલનશીલ કોષોના સાધનથી સિદ્ધ થતી, ફલનની ક્રિયાને હજી સુધી કાયમ રાખી છે. આપણે જાણીએ છીએ, કે ખદી હંસરાજ, લીલ અને તેમની મિત્રો, તેમજ ઘણી દરિઆઈ અને અન્ય શેવલાદિ વનસ્પતિઓ પોતાનું ફલન ચંચળ શુક્રકોષોના સાધનથીજ સાધે છે. પ્રાણીઓમાં પણ પુલ્લિંગકોષો હાલી ચાલી શકે છે. ઉંચી કોટિની વનસ્પતિઓ પ્રાણીઓનાં લક્ષણોનો જેમ જેમ વધારે ત્યાગ કરે છે, તેમ તેમ તેઓ ઉત્ક્રાંતિની માલામાં વધારે ઉંચું સ્થાન લે છે. નીચી કોટિની કેટલીક શેવાલો (એડ્જ) જન્મ્યા પછી ખડું લાંબા સમય સુધી હાલી ચાલી શકે છે; તેથી વધારે ઉંચી કોટિની ઉદ્ભિન્નજ્ઞેની ખાખતમાં, આ શક્તિ અલિંગકોષની દશા પૂરી થતાંજ નાશ પામે છે; તેથી પણ વધારે ઉંચી કોટિની વનસ્પતિઓમાં એટલે લીલ અને હંસરાજ વિગેરે ઉદ્ભિન્નજ્ઞેમાં, અલિંગકોષો પણ હાલવા ચાલવા અશક્ત હોય છે, તોપણ, અંડ-કોષો સૂધી પહોંચવા માટે તેમનાં પુલ્લિંગ કોષોએ એ શક્તિને ટકાવી રાખી છે. છેવટે, આ હલનચલનની શક્તિનો તદ્દન લોપ થયો છે. સામાન્ય રીતે, વનસ્પતિ જેમ જેમ વધારે ઉત્ક્રાંત થાય છે, તેમ તેમ તેનું પ્રાણીની સાથેનું સામ્ય વધારે ને વધારે ઘટતું જાય છે.

તૃણદ્રુમીની ફલન-પદ્ધતિ વધારે રમુજી અને અગત્યની છે, કારણ કે તે શુદ્ધ પ્રચન્નખીજની ઉંચી કોટિની

બીજાધારી વનસ્પતિઓની ફલન-પદ્ધતિઓની વચ્ચેવચ્ચ અને સમાન અંતરે રહેલી છે. પ્રચન્નબીજની ફલન ક્રિયામાં દરેક વસ્તુ શુક્રકોષોની અંચળ ગતિના ઉપર આધાર રાખે છે, અને ઉંચીકોટિની બીજધારી વનસ્પતિઓના ફલનમાં અતિ અગત્યની વસ્તુ પરાગ નલિકાની વૃદ્ધિ છે, કારણ કે આ બાબતમાં ચલનશક્તિહીન શુક્રકોષો નલિકામાજ અંડકોષની તરફ ધકેલાય છે. તૃણદ્રુમીની બાબતમાં પરાગ-નલિકા ઉત્પન્ન થાય છે, અને તે એવી રીતે લંબાઈમાં વધે છે, કે શુક્રકોષો તેમના યોગ્ય સ્થળે ધકેલાય, પણ તેમની સુસાદ્રીના છેવટના ભાગમાં તો તેમને હાલી ચાલી જતમહેનતથી જ અંડકોષમાં ઘૂસવું પડે છે,

બરાબર ૪૦ વર્ષ પહેલાં હૉર્મિસ્ટર નામના જર્મન ઉદ્ભવિજ્ઞવેત્તાએ એવું અનુમાન બાંધ્યું હતું, કે ‘ શંકુધારી વનસ્પતિઓમાં ફલન પરાગ-નલિકાના સાધનથી થાય છે એ વાત સત્ય છે, પણ તે નળીના અંદરના ભાગમાં ઘણે ભાગે ચલનશીલ શુક્રકોષો ઉત્પન્ન થયેલાં હોય છે. ’ ઘણાં વર્ષ ઘણી હિરેમ અને ઇકેનોએ આ અનુમાન સત્ય છે એમ સાબીત કર્યું. સામાન્ય રીતે, શંકુધારી વનસ્પતિઓમાં આવું દ્રશ્ય બનતું નથી, તોપણ, કુમારિકાકેશીની બાબતમાં (હૉર્મિસ્ટરના સમયમાં આ વૃક્ષ શંકુધારી વર્ગનું લેખાતું હતું), તેમજ તેને ઘણે અંશે મળતા આવતા તૃણદ્રુમીના કુટુંબની બાબતમાં એ વાત સત્ય કરી છે.

ધણી તૃણદ્રુમી વનસ્પતિઓમાં, દરેક પરાગ નલિકામાં માત્ર બેજ શુક્રકોષ ઉત્પન્ન થાય છે. માઇક્રોસાઇકસ આ વાતનો આશ્ચર્યકારક અપવાદ છે. કેદડવેલ નામના એક અમેરિકન ઉદ્ભિજ્જવેત્તાને એ વનસ્પતિ ત્રણ વર્ષ ઉપરજ કયુબાના પર્વતો ઉપર ઉગેલી દેખાઇ. એ સમયે એવી માન્યતા હતી, કે માઇક્રોસાઇકસ બહુ નાની વનસ્પતિ છે, પણ કયુબામાં ઉગેલી આ વનસ્પતિ ૩૦ ફુટ ઉંચુ વૃક્ષ હતી અને તેના સિલિંગ શંકુઓ ૧ યાર્ડ લાંબા હતા. તેની પુનરુત્પત્તિને લગતી એક આશ્ચર્યકારક વાત એ છે, કે દરેક પરાગ-નલિકામાં ઓછામાં ઓછાં ૧૬ શુક્રકોષ ઉત્પન્ન થાય છે. આ બાબતમાં આ વનસ્પતિ પ્રાચીન જીવયુગની કેટલીક બીજધારી વનસ્પતિઓને બહુજ મારી રીતે મળતી આવે છે. માઇક્રોસાઇકસમાં અંડ-કોષોની સંખ્યા અસાધારણ મોટી હોય છે. દરેક પુષ્પાંડમાં લગભગ ૨૦૦ અંડકોષો હાજર હોય છે, પણ બીજ તૃણદ્રુમી વનસ્પતિઓમાં તેમની સામાન્ય સંખ્યા ૩ થી ૫ હોય છે.

ફલન પૂરું થયા પછી એકથી વધારે ગર્ભો થોડો સમય વિકસ્યાં કરે છે. માઇક્રોસાઇકસમાં તેમની સંખ્યા ૧૨ કે તેથી વિશેષ હોય છે. પાછળથી તેમનામાં સ્પર્ધા ઉત્પન્ન થાય છે, અને જ્યારે બીજ પાકે છે ત્યારે તેમાં માત્ર એકજ ગર્ભ હાજર હોય છે. પછી ગર્ભ અંતશુક્રીમાં સંતાઇ રહે છે. બીજનો આખો ઠળીઓ અંતશુક્રીથી ભરાઇ જાય છે અને લવિધ્યમાં તે અંકુરીભવનની દશામાં વપરાઈ જાય છે. તૃણદ્રુમી સંજ્ઞાએ એક નવાઇ ભરેલી વાત એ છે, કે જ્યાં મુધી બીજને વાવવામાં ન

આવે. ત્યાંમુઘી ગર્ભનો લાગ્યેજ વિકાસ થાય છે, એટલે, પાકેલા બીજમાં ગર્ભ સ્પષ્ટ દેખાય આવતો નથી. આ વાત લગલગ બધી તૃણદ્રુમી વનસ્પતિઓને લાગુ પડે છે; કારણ કે ગર્ભનો વિકાસ થતાંજ નવી વનસ્પતિ ઉત્પન્ન થતી હોવાથી તેમની બાબતમાં બીજને જરા પણ આરામ મળતો નથી; તોપણ આ વાતને ઘણા અપવાદ છે.

સામાન્ય રીતે, ગર્ભને બે દળ હોય છે અને તેઓ ઘણીવાર પરસ્પર સંધાયેલાં હોય છે. સીરેટોઝેમિઆમાં, સામાન્યતઃ, બે દળ પૈકી એક વ્યર્થ નિવડે છે. અંકુરીલવનની દશામાં તેઓ બીજની અંદરજ રહી અંતર્ગુકીમાંથી ખોરાક ચૂસે છે. લગલગ બધી શંકુધારી વનસ્પતિઓનાં દળ વિકાસ પામી લીલાં પાંદડાંઓ બની જાય છે.

હાલની તૃણદ્રુમી વનસ્પતિઓનું વિવેચન વિસ્તારથી કરવાની ખાસ જરૂર હતી; કારણ કે, ઉદ્ભિન્નચુષ્ટિમાં સપુષ્પ વનસ્પતિઓનો જન્મ થયો તે પહેલાંની, એટલે, મધ્ય-જીવયુગની વનસ્પતિઓને હવે આપણે સારી રીતે સમજી શકીશું; અને વધારેમાં, પ્રાચીનજીવયુગની બીજધારી ઉદ્ભિન્નજોની સાથે હવે આપણે તેમને સારી રીતે સરખાવી શકીશું (પ્રકરણ ૪ થું જુઓ). મધ્યજીવયુગની તૃણદ્રુમી વનસ્પતિઓ કોના જેવી હતી તે હવે આપણને જણાશે, અને સપુષ્પ વનસ્પતિઓની ઉત્ક્રાંતિના અગત્યના પ્રશ્નનો ખુલાસો કરવામાં તે વર્ગ આપણને કેટલો ઉપયોગી થશે તે પણ હવે આપણે જોઈ શકીશું.

હાલની જીવંત વનસ્પતિ સૃષ્ટિમાં, ૧૦૦૦ વાહિનીમય ઉદ્ભિન્નજ્નેમાં તૃણદ્રુમીની સંખ્યા ભાગ્યે એકાદ હશે; માધ્યમિક યુગની વનસ્પતિસૃષ્ટિમાં, દરેક ત્રણ ઉદ્ભિન્નજ્નેમાં એક તૃણદ્રુમી હાજર હતી. હાલનું જીવંત તૃણદ્રુમીનું નાનું કુટુંબ તે સમયમાં અગ્રગણ્ય લેખાતા વનસ્પતિસમૂહનું વંશજ છે. એ વાત પહેલેથીજ ધ્યાનમાં રાખવાની છે, કે મધ્યજીવયુગની તૃણદ્રુમીઓનું કુટુંબ બહુજ વિશાળ હતું. તે સમયે આ કુટુંબમાં ઘણાં ઉપકુટુંબો હયાત હતાં અને તેઓ પૈકી હાલમાં તૃણદ્રુમ (સાઈકેડેસી) નામનું માત્ર એકજ ઉપકુટુંબ હયાત છે. એ પ્રાચીન વિશાળ કુટુંબને તૃણદ્રુમીવના (સાઈકેડેકાઈટા) કહીએ તો ચાલે.

મધ્યજીવયુગની તૃણદ્રુમીવના આખી પૃથ્વી ઉપર પ્રસરેલી હતી. ગરમ અને સમશીતોષ્ણ પ્રદેશોમાં તેઓ યથેચ્છ ઉગતી હતી, અને ગ્રીનલેન્ડ અને સાઈબિરીઆના ઉત્તરધ્રુવ આગળના પ્રદેશોમાં તથા લુઈ શીલીપાઈન લેન્ડમાં, એટલે, દક્ષિણધ્રુવ આગળના ખુલ્લકમાં પણ તેઓ વસતી હતી.

ઈંગ્લાંડમાં તેઓ પુષ્કળ ઉગતી હતી, અને પોર્ટલેન્ડની ખાણોમાંથી તેમનાં ઘણાં થડ પ્રાપ્ત થાય છે. એ થડને ત્યાંના મજૂરો ' કાગડાઓના માળા ' કહે છે. એ સમયમાં પૃથ્વી ઉપરની ઉદ્ભિન્નજ્નેસૃષ્ટિ સર્વ સ્થળે એકરૂપ હતી. ચૅકશાયર, મેક્સીકો, હિંદુસ્તાન અને ઉત્તરધ્રુવના જેવા અતિશય ઠંડા પ્રદેશોમાંથી પણ તૃણદ્રુમીવનાનાં એકજ જાતનાં સ્વરૂપો આપણે હાથ આવ્યાં છે.

આપણે પાછળ વાંચી ગયા, કે હાલની 'મજીવ તૃણદ્રુ-
મીઓ સપુષ્પ વનસ્પતિઓનું એક સાદું કુટુંબ છે. તેમની
ફલનની રીત, પરાગકોશની ગોઠવણી અને સાઈકસનાં ફલદ-
પત્રો વિગેરે ઘણી બાબતમાં તેઓ પ્રચ્છન્નબીજ વનસ્પતિ-
ઓનાં લક્ષણો પ્રગટ કરે છે. મધ્યજીવયુગની તૃણદ્રુમીવનાઓમાં
આવું માદું સ્વરૂપ લાગ્યેજ આપણે હાથ ચઢે છે. એ યુગની
થોડી વનસ્પતિઓને હાલની તૃણદ્રુમ વનસ્પતિઓના જેવીજ
જનનેન્દ્રિયો હોવાનું જણાયું છે, મુખ્યત્વે સાઈકસ નામની
જાત તેનાં વિશિષ્ટ ફલદ-પત્રોના સાધનથી ચૂર્ણોપલ યુગના
ખડકો મુઢી પણ ઓળખી શકાય છે. સાઈકસ, ઝેમિઆ, અને
ડિડેન વિગેરે હાલની જાતોના જેવાંજ પાંદડાંઓનાં જીવશેષો
વારંવાર આપણને મળી આવે છે, પણ એવા પુરાવા ઉપર
આધાર રાખી શકાય નહિ; કારણકે એવા કેટલાંક પાંદડાંઓ
નિઃસંદેહ તૃણદ્રુમીવનાના વર્ગના હોવા છતાં પણ, તેઓ
હાલની તૃણદ્રુમ વનસ્પતિઓનાં તો અંગો નથીજ એવું
ચોક્કસ સાબીત થયું છે. હાલમાં તો આપણે માત્ર એટલુંજ
જાણીએ છીએ, કે તૃણદ્રુમનું કુટુંબ મધ્યજીવયુગમાં ઉગતું
હતું, પણ તે સમયે તેનો વધારે વિકાસ કે પ્રસાર થયો ન હતો.

અત્યારમુઢીમાં મધ્યજીવયુગની જેટલી તૃણદ્રુમીવના-
ઓનાં જીવશેષો આપણને મળી આવ્યાં છે, તેમના અવલોકન
ઉપરથી એવું સાબીત થાય છે, કે સામાન્ય દેખાવ અને પૌષ્ટિક
અવયવોની ઘટના એ બે બાબતોમાં તેઓ હાલની 'તૃણદ્રુમી-'
ઓના જેવાજ કોઈ અન્ય કુટુંબની 'સભ્યો છે,' પણ તેમની

જનનેંદ્રિયો એટલી બધી ઉંચી વ્યવસ્થાવાળી છે, કે તેમને હાલની તૃણદુર્મીઓના એ અવયવોની સાથે સરખાવી શકાય તેમ નથી. એ નવું કુટુંબ બેનેદ્રિટિ ઉદ્દલિન્ગજોનું છે અને તેમનાં ઘણાં જીવશેષો બ્રિટન, ફ્રાન્સ, ઇટલી અને યુરોપના બીજા ભાગોમાંથી મળી આવ્યાં છે. અમેરિકાનાં સંયુક્ત રાજ્યોમાં મેરિલેન્ડ, ડેલોરો અને વોશિંગ્ટનના ખડકોમાં તે તેમની સંખ્યા બહુજ મોટી છે.

બ્રેટબ્રિટનમાં, વાઈટના ટાપુનાં વીહ્ડ અને નીચલાં લીલી રેતીનાં વળાંમાં, સસેક્ઝ શાયરનાં વીહ્ડનાં સ્તરોમાં, પૂર્વ-હૉરસેટ શાયરનાં પર્જેકનાં પ્રસ્તરોમાં (વિવૃતબીજસ્તરક્રમના ઉપલા ખડકોમાં), ઉત્તર-સ્કોટલેન્ડમાં ગ્રોરાના અંડોપલી મોટા ખડકોમાં, અને યૉર્કશાયરના કિનારા ઉપરનાં નીચલાં અંડોપલી વળાંમાં આ કુટુંબની તૃણદુર્મીઓ આપણને મળી આવી છે. સૌથી વધારે કીંમતી નમૂનાઓ અશ્મીભૂત જીવશેષોના છે, કારણ કે એ નમૂનાઓમાં અંદરની ઘટના સ્પષ્ટ રહેલી હોય છે. એ જાતનું એક અતિપ્રખ્યાત જીવશેષ બેનેદ્રિટોસ ગિઝોનીએનસ છે, અને તે વાઈટના ટાપુમાં, લ્યુકોમ્બી ચાઈનમાંથી પ્રાપ્ત થયું છે. આ ઉપજાતના કુળની રચના પ્રથમ કેરેથર્સ અને સોમ્સ લોબેશને સમજાઈ. યુરોપ-ખંડના ખડકોમાંથી પ્રાપ્ત થયેલાં બીજાં જીવશેષોના અભ્યાસથી આપણને સારું જ્ઞાન થયું છે, પણ પાછલાં દસ વર્ષમાં ચેલના વતની વિદ્વાન વીલેડે-અમેરિકામાંથી જે જીવશેષો શોધી કઢાડ્યાં છે તે આપણને બહુજ વધારે ઉપયોગી બન્યાં છે,

‘પુષ્પોની’ ઘટના કેવી હોય છે તે આપણને પ્રથમ સમજાવનાર તે જ વિદ્વાન હતો; અને એ અર્થમાં આપણે પ્રસ્તુત વનસ્પતિઓની જનનેંદ્રિયોને પુષ્પ કહી શકીશું. અમેરિકામાં વિવૃતખીજસ્તરકમના ઉપલા, અને અટિકાયુગના નીચલા ખડકોમાંથી એ કુટુંબની આશરે ૬૦ ઉપજતો પ્રાપ્ત થઈ છે. દરેક ઉપજતનાં ઘણાં જીવશેષો એ સ્થળે હાજર છે. માત્ર ઢેકોટોની ‘કાળી ટેકરીઓમાંથી જ’ ૨૯ ઉપજતોનાં ૧૦૦૦ થડ આપણને પ્રાપ્ત થયાં છે. એ ઘડની પેશિઓમાં રેતીના ક્ષારો ભરાઈ જવાથી તેમની ઘટનાં હજી મુઘી અકબંધ કાંચમ રહેલી છે.

સામાન્ય દેખાવમાં બેનેટિટિ હાલની ટૂંકા થડ વાળી તૃણદ્રુમીનાં જેવાં લાગે છે. એ વૃક્ષો ઉંચાઈમાં બહુ વધારે વધતાં ન હતાં, અને તેમનાં પાંદડાં લગભગ એમિઆ વિગેરે હાલની તૃણદ્રુમીઓના જેવાં જ હતાં. તેમનું થડ પાંદડાઓનાં ‘પાયાઓ રૂપી ખખ્તરથી ઢંકાયેલું’ હતું, પણ એક બાળતમાં એ અશ્મીભૂત થડ હાલની કોઈ પણ સજીવ તૃણદ્રુમીના થડથી ‘બૂદ્’ પડતું હતું. બેનેટિટિના થડમાં, તેના પાંદડાંઓના પાયાઓની વચમાં વચમાં મોટી કળીઓની જેવી પાંદડાંવાળી કાળીઓના કિણ (સ્કાર) એટલે ડાઘાઓ આપણી નજરે આવે છે. એ ડાઘાઓ તેની જનનેંદ્રિયોનાં ‘અવશેષ ચિહ્નો’ છે. હાલની સજીવ તૃણદ્રુમીઓમાં જનનેંદ્રિયો ઘડની ટોચમાંથી એકીજ વખતે ઉગે છે, અને તેમની સંખ્યા નાની હોય છે, પણ આ પ્રાચીન વનસ્પતિઓની બાળતમાં તે

તેઓ સંખ્યાબંધ થડની આબુખાબુ ઉગતી હતી
(ચિત્ર ૮ સુ).

તેના થડની અંદરની રચના સંબંધે આપણે વધારે વિવેચન કરીશું નહીં. તેનું સ્વરૂપ હાલની વધારે સારી તૃણદ્રુમીઓના જેવુંજ હતું, એટલે થડના મધ્ય ભાગમાં પુષ્કળ ગર, અને તેની ચારે બાજુએ વર્તુળના આકારમાં કાષ્ઠ અને વડકકનું ચક્ર ગોઠવાયેલું હતું, તેનાં પાંદડાઓમાં પથરાયેલા વાહિનીનસોના રેસાઓની વ્યવસ્થા હાલના કુટુંબના કરતા વધારે સીધી હતી, અને તેમનાં પાંદડાંઓનીજ ઘટના ઝેમિના નામની તૃણદ્રુમીનાં પાંદડાંઓને લગલગ મમાન હતી. ત્યારે તેમના પૌષ્ટિક અવયવોનો ઘટના ધ્યાનમાં લેતાં, તેઓ તૃણદ્રુમી ઉદ્દલિજ્જને હશે એમ લાગે છે, તોપણ તેમની જનનેંદ્રિયોની રચના એમ સ્પષ્ટ સૂચવે છે, કે એ જે જાતની ઉદ્દલિજ્જનેની વચ્ચે હવે કાંઈજ સામ્ય નથી.

અમેરિકામાંથી પ્રાપ્ત થયેલી બેનેદ્રિટિની સાત ઉપજાતો અને તેમને ઘણે અંગે મળતી આવતી સાઈકેડેલા વનસ્પતિનાં પુષ્પોની રચનાનો મારો અભ્યાસ થયો છે. મુખ્ય મુખ્ય બાળતોમાં, એ બધાં પુષ્પોની રચના સમાન છે, અને એ વાત યુરોપની ઉપજાતોની બાળતમાં પણ લાગુ પડે છે. આપણે પાછળ જોઈ ગયા કે તેમની જનનેંદ્રિયો થડની ટોચ ઉપર ન ઉગતાં તેના પાયા ઉપર ઉગે છે, અને તેઓ પાંદડાંઓના પાયાઓની વચ્ચે વચ્ચે પોતાનું સ્થાન લે છે. બેનેદ્રિટિસ ડેકોટેન્સિસ નામની વનસ્પતિના થડની જી

ઉગેલી હતી, અને તેઓ બધી એક સરખો વિકાસ પામેલી હતી. આ અને એવાં બીજાં અવલોકન ઉપરથી ડૉ. વીલેન્ડ એવું અનુમાન કરે છે, કે એ વનસ્પતિઓને તેમની આખી જીંદગીમાં એકજવાર ફૂલ ખેસતાં હતાં, અને પછી તેઓ હાલનાં તાડ અને વાંસની પેઠે તુરત મરી જતી હતી.

આપણે આ બેનેટ્સ ડેકોરેન્સિસની જનનેદ્રિયોને તપાસીએ. તેનું આખું ફૂલ ૧૨ સેન્ટિમિટર એટલે ૫ ઈંચ લાંબું હોય છે, અને તેની આસપાસ ઉગેલાં પાંદડાંઓના-પાયાઓમાંથી તે સહેજ બહાર લંબાયેલું હોય છે. એ પુષ્પનો નીચલો ભાગ અસંખ્ય ભીંગડાંઓથી ભરેલા દીંટાનો બનેલો હોય છે, અને તે ભીંગડાંઓ વમળની પેઠે ગોળ ગોળ ચઢતા ઉતરતી ગોઠવાયેલાં હોય છે. આ ભીંગડાંઓની અંદર વચ્ચે વચ્ચે જનનેદ્રિયો આવેલી છે. સૌથી ઉપલાં ભીંગડાંઓમાં નરકેસરો હોય છે, અને તેઓ વમળાકારમાં (સ્પિરલ) ન ગોઠવાતાં ઘણી આવૃતબીજનાં નરકેસરોની પેઠે વીંટીના આકારમાં ઉગેલાં હોય છે. આ ઉપજાતમાં નરકેસરોની સંખ્યા ૧૮ થી ૨૦ હોય છે, અને તેઓ ઘણાં મોટાં અને કિલ્લટ ઘટનાવાળાં હોય છે. આ નરકેસરોની રચના કોઈપણ આવૃત-બીજ કે વિવૃતબીજનાં અવયવોથી તદ્દન ભિન્ન હોય છે. જો દરેક નરકેસરને જેથી સ્ત્રીધું કરવામાં આવે તો તે ૧૦ સેન્ટિમિટર એટલે ૪ ઈંચ લાંબું હોય છે. તોપણ, વાસ્તવિક રીતે તેઓ હમેશાં અંદર વળેલાં રહે છે, અને તેથી એ પુષ્પ હમેશાં કળીનો દેખાવ આપે છે. દરેક નરકેસર

પીંછાના જેવું લાગે છે, અને તેની ઉપર પાંદડીઓનાં .૨૦ જોડકાં ઉગેલાં હોય છે. દરેક પાંદડીની ઉપર પરાગકોશોની બે હાર હોય છે. વધારે લાંબી પાંદડીઓમાં દરેકની ઉપર ૨૦ પરાગકોશો ઉગેલાં હોય છે.

નરકેસરોના તંતુઓ એટલે દીંટાંઓ સંધાઈ ગયેલાં હોવાથી પુષ્પના સ્થિલિંગ લાગની આસપાસ એક નળી ઉત્પન્ન થાય છે. મેલોના પુષ્પમાં પણ એવીજ રચના હોય છે. દીંટાના ઉપલા ભાગમાં નરકેસરો એકમેકથી છુટાં હોય છે, અને આ છુટા ભાગો અંદરની બાજુ તરફ નમી જઈ તેમનાં અગ્રો તેમનાં જ દીંટાં મુધી લટકે છે.

એ નરકેસરોની ઉપર જે અસંખ્ય પરાગકોશો હોય છે, તેઓ જાતેજ સંયુક્ત રચનાઓ છે, કારણકે દરેક પરાગકોશમાં અમંજ્ય ખાનાંઓ હોય છે. એ ખાનાંઓમાં જ પરાગ ઉત્પન્ન થયેા હોય. મેરેટ્રિએસી નામનું ગરમ દેશોમાં ઉગતું હંસરાજનું એક નાનું કુટુંબ છે, અને તેનાં સંયુક્ત અલિંગકોષાગારોના જેવીજ એ પરાગકોશોની રચના છે. ખરેખર, બેનેટ્ટિટિનાં નરકેસરો, કોઈ પણ અન્ય વનસ્પતિનાં નરકેસરોના કરતાં હંસરાજનાં પરિપક્વ જનનપણુનિ બહુજ વધારે મજાતાં આવે છે. તેનું દરેક પરાગકોશ દૂંકા દીંટાના માધનથી પાંદડીને વળગેલું હતું.

આવૃત્તબીજની ચેઠે આ પુષ્પમાં પણ મધ્યભાગ અંતઃપુરે (જાંબનેશીયમ) એટલે સ્થિલિંગ યંત્રે રહેલો છે.

કેટલાંક કારણોને લીધે સ્ત્રિકેસર (પીસ્ટીલ) શબ્દનો ઉપયોગ અત્રે ઉચિત નથી. શંકુના આકારની આ જનનેન્દ્રિયની બાજુએ દીંટાંવાળાં અસંખ્ય પુષ્પાંડથી અને તેમની વચ્ચે વચ્ચે ઉગેલાં નિર્ધારક લીંગાંડાંઓથી ઢંકાયેલી હોય છે. જ્યારે પુષ્પ પાકી ફળ બને છે ત્યારે અંતઃપુરની રચના આપણને ખરાબર સ્પષ્ટ થાય છે. અત્રે એ વાત ખાસ લક્ષમાં રાખવાની છે, કે મધ્યજીવયુગની બેનેટ્ટિટિની જનનેન્દ્રિયમાં તેના જૂદા જૂદા ભાગોની ગોઠવણી આવૃત્તબીજના નમુનારૂપ પુષ્પને ખરાબર સમાન છે. બન્નેની બાબતમાં સૌથી બહારની બાજુએ લીંગાંડાંઓ—જેમને આપણે પરિપુષ્પ કહીએ તો આવે—પછી નરકેસરોનું ચક્ર અને છેવટે વચ્ચોવચ સ્ત્રિલિંગ જનનેન્દ્રિય આવેલ હોય છે. બેનેટ્ટિટિના કુટુંબના બધા સભ્યોમાં, અને તે મળતી આવતી કેટલીક જાતોમાં, સામાન્ય રીતે, એજ વ્યવસ્થા હોય છે. વળી, બેનેટ્ટિટિને ઘણે અંશે મળતી આવતી કેટલીક બીજી જાતો સિન્ન સિન્ન લિંગવાળાં ફૂલ ઉત્પન્ન કરે છે.

!

વધારે પરિપક્વ થયેલી જનનેન્દ્રિયોમાંથી નરકેસરે અલોપ થઈ જાય છે, અને શંકુના પૃષ્ઠની ઉપર તેઓ અમુ' સ્થળે ઉગ્યાં હતાં એવું બતાવનારી એક ગોળ કિનારી અવશેષ ચિહ્ન તરિકે રહી જાય છે. દ્યુકોમ્બી આધનમાંથી પ્રાપ્ત થયેલું બેનેટ્ટિટિસ ગીઝોનીએનસ નામનું જીવશેષ એ વનસ્પતિની પકવ દશાનું સરસ દર્શાવ છે. પરિપક્વ દશામ પ્રાપ્ત થયેલી આ પહેલીજ વનસ્પતિ હતી, અને વસ્તુતઃ બેનેટ્ટિટિ સંજ્ઞાએ આપણું જ્ઞાન આ મંશેધનથીજ શરૂ થયું.

કહેવાય; કારણ કે તેની સાથે સંબંધ ધરાવતી વનસ્પતિઓ
જે કે બહુ વહેલી પ્રાપ્ત થઈ હતી, તોપણ આ જીવશેષ પ્રાપ્ત
થયું તે પહેલાં તેમની ઘટના આપણને સમજાઈ ન હતી.

આ જીવશેષની અને અમેરિકામાંથી જડેલી ઉપજાતની
જનનેંદ્રિયોની ગોઠવણી અને ઘટના બરાબર સમાન છે. ફેર
માત્ર એટલોજ છે, કે પ્રસ્તુત જીવશેષ જરા મોટું, એટલે
પુષ્પ પાકી ફળ બન્યું ત્યાર પછી, જમીનમાં દટાઈ ગયું હતું.

હજી પણ ફળની આસપાસ પુષ્કળ ભીંગડાં છે, પણ
નરકેસરોનો તેમાંથી લોપ થયેલો છે, અને તેનું અંતઃપુર
ખૂળ મોટું થયું છે. તેથી ભીંગડાંની અંદરનો બધો ભાગ
અંતઃપુરે જ રોકેલો છે. ફૂલના દીંટાની ટોચ
(અમેરિકાના જીવશેષોથી આ ઉપજાતમાં તે વધારે ગોળ
બનેલી છે) ઉપર બીજની મોટી સંખ્યા હાજર રહે છે, અને
તે દરેક બીજ લાંબા અને પાતળા દીંટાની ટોચ ઉપર ઉગેલું
છે; આ બીજનાં દીંટાઓની વચલી જગામાં નિરૂપયોગી
ભીંગડાઓ ખીચોખીચ ઉગેલાં છે, અને તેમના છેડાઓ લાંબા
થઈ પરસ્પર સજ્જડ અડકેલા હોવાથી તેઓ પરિક્ષ્ણ
(પેરિકાર્પ), એટલે, અંડાશયની આસપાસ એક દિવાલ
બનાવે છે. તોપણ, એ દિવાલ સંપૂર્ણ નથી, વચ્ચે વચ્ચે જ્યાં
બીજ ઉગેલું હોય છે ત્યાં દિવાલમાં નાનું છિદ્ર રહી જાય છે.
બીજનું દારક એટલે ખુલ્લો છેડો એ છિદ્રમાં ધૂસી જાય છે
અને એ રીતે તે બહારના પૃથ્વી સાથે સંબંધમાં આવે છે.
સજીવ તૃણદ્રુમીઓનાં બીજની સાથે સરખાવતાં તેમની ઘટના

વધારે સાદી લાગે છે, કારણ કે આ જીવશેયોની બાબતમાં કુળે તેમનું સારું જતન કર્યું હતું.

બહુજ નવાઈભરેલી વાત એ છે, કે આ બીજની અંદર ગર્ભ બહુજ સુરક્ષિત રહેલો હોય છે, માત્ર આ જ વનસ્પતિ-સમૂહની બાબતમાં ગર્ભનું જીવશેષ પ્રાપ્ત થાય છે. આવી નાજુક વસ્તુઓ અત્યાર મુખી સુરક્ષિત રહી શકી એ ખરેખર આપણું મુલાગ્ય છે.

આ ગર્ભને જે દળ હોય છે; હાલનાં સાધારણ બીજની પેઠે એ જે દળદાર દળ બીજના પાયાની તરફ અને તેનું બાળક-મૂળ દારકની તરફ વળેલાં હોય છે. વસ્તુતઃ ગર્ભબીજની અંદરનો બધો ભાગ રોકી દે છે, જ્યારે બીજપકવ થયું ત્યારે તેમાં જરા પણ અંતર્ગતી ન હતી. તેથી આ બીજ અનૌજસી હતાં એ વાત સ્પષ્ટ થઈ. હાલની એકે સજીવ વિવૃતબીજનું બીજ અનૌજસી હોતું નથી, અને આવૃતબીજના વર્ગમાં પણ આ સ્થિતિ માત્ર થોડીજ ઉદ્ભવિજ્જને અનુભવે છે. તેથી, પ્રસ્તુત જીવશેષને આપણે બહુજ ઉત્તમ વિકાસ પામેલું ગણવું જોઈએ. તૃણકુમીની બાબતમાં આપણે આવું લક્ષણ જોઈશું એવી આશા ક્યાંથી રાખી શકાય !

ત્યારે, મધ્યજીવયુગની આ તૃણકુમીવના વનસ્પતિઓ તથા મહત્વનાં લક્ષણોમાં આવૃતબીજ ઉદ્ભવિજ્જનેની સાથે બહુજ નિકટનો સંબંધ પ્રગટ કરે છે:—

૧. આવૃતબીજનાં આદર્શરૂપ પુષ્પોના જેવીજ તેમનાં પુષ્પોની રચના અને વ્યવસ્થા હોય છે.

૨. ઈન્ને ક્ષણને ઉત્પન્ન કરે છે, અને તેમનાં બીજ ક્ષણની અંદર રહેલાં હોય છે.

૩. ઇન્નેનાં બીજ અનૌજસી હોય છે.

આ વિવિધ લક્ષણોની સમાનતા અને બદલે એકરૂપતા અર્થહીન હોય એમ સંભવતું નથી, અને આ હકીકત ઉપરથી આપણે એવા વ્યાજબી નિર્ણય ઉપર આવી શકીએ, કે બધી જાણીતી ઉદ્ભિન્નભેદમાં, જેનેદિટિનું કુટુંબ આવૃતખીનઓની સાથે બહુજ પાસેનો સંબંધ પ્રગટ કરે છે. ગર્ભ અને થડ, ઇન્નેની ઘટના ઉપરથી એ વાત તદ્દન સ્પષ્ટ થાય છે, કે તેઓ એકદળ આવૃતખીનની સાથે નહિ, પણ દ્વિદળ આવૃત ખીનની સાથેજ ખાસ સંબંધ ધરાવે છે.

તોપણ, ખીન ઘણાં લક્ષણોમાં એ જીવગ્રેષ્મત કુટુંબ આવૃત ખીનઓથી તદ્દન ભિન્ન છે. એવાં મુખ્ય લક્ષણો આર છે.

૧. સામાન્ય દેખાવ.

૨. તેનાં નરકેસરોની કિલ્લટ રચના.

૩. તેના અંતઃપુરની રચના.

૪. તેના ફલનની ખાસ રીત.

આપણે પાછળ જોઈ ગયા, કે જેનેદિટિસ અને તેના મિત્રોનો સામાન્ય દેખાવ કેવળ તૃણકૃમી વનસ્પતિઓને મળતો આવે છે. બહારનાં લક્ષણોમાં તેઓ વધારે ઉચી કોટિની સપુષ્પવનસ્પતિઓના એકે કુટુંબને અનુસરતી નથી. પણ

ત્યારે આપણે એ સમૂહનું વિશાળ દષ્ટિએ અવલોકન કરી વિચાર કરીએ છીએ, ત્યારે આપણને જણાય છે, કે એ સમૂહમાં તૃણકુમ્ભીનું સ્વરૂપ સર્વસ્થળે એકરૂપે રહેલું જણાતું નથી. સ્વીડનમાં ત્રિશુષ્ણિતસ્તરકમના ઉપલા ખડકોમાંથી મી. નેથોર્સ્ટને જડેલું વિલોન્ડએલા નામની ખતનું જીવશેષ સામાન્ય દેખાવમાં તૃણકુમ્ભીઓથી તદ્દન જુદું પડે છે. તેનું લાંબું અને પાતળું થડ વારંવાર ફંટાયેલું છે, અને તેની કશો, એટલે સાંધાઓના ખૂણાઓમાં, માત્ર ત્રણ ઈંચ લાંબા પોંછાના જેવાં સાંકડાં પાંદડાંઓના જુમખાંઓ ઉગેલાં છે. બે શાખાઓની વચ્ચે થડના સાંધાઓમાં એક એક ફૂલ ઉગેલું જણાય છે. વિદ્વાન્ નેથોર્સ્ટે હમણાં સાબીત કર્યું છે, કે આ ફૂલની રચના બેનેટિટિસનાં ફૂલના જેવીજ છે. ત્યારે એ કુટુંબનો આ સ્થૂળ સામાન્ય દેખાવમાં અત્યંત ભિન્ન છે. એના જેવાંજ બીજાં ઘણાં જીવશેષો ધીમે ધીમે પ્રાપ્ત થાય છે, અને એ મર્વે ખતાવી આપે છે, કે શંકુધારી અને વધારે ઉંચી કોટિની સપુષ્પ વનસ્પતિઓની વચ્ચેનો સંબંધ નક્કી કરવામાં બહારનાં લક્ષણો બહુજ મહત્વનું સાધન નથી.

પ્રસ્તુત જીવશેષનાં કિલ્બ રચનાવાળાં નરકેસરોનો દેખાવ જનનપણોના જેવો હોય છે, અને તેઓ પરાગકેશોની બહુજ મોટી સંખ્યા ઉત્પન્ન કરે છે. આ બન્ને બાબતોમાં એ જીવશેષ હંસરાજને વધારે, અને આવૃતબીજને ઓછું મળતું આપે છે. મેલો અને દીવેલી વિગેરે દ્વિદળ ઉદ્ભિજ્જોનાં નરકેસરે

ખરેખર કંટાળેલાં હોય છે, તોપણ એ વનસ્પતિવર્ગનું આ મુખ્ય નહિ, પણ ગૌણલક્ષણ છે. લગભગ બધી સપુષ્પ વનસ્પતિઓમાં નરકેસરોની રચના સમાન હોય છે. એ નરકેસરોની ટોચ ઉપર તેમની દરેક બાજુએ બે લાંબા પરાગકોશ, એટલે, દરેક નરકેસરને કુલ ચાર પરાગકોશ હોય છે. એમ મંલવે છે, કે પરાગકોશોનું આ દરેક યુગલ બેનેટ્રિટિસનાં બન્ને બાનાંઓની હારવાળાં મંયુક્ત અલિંગકોષાગારોના સમૂહોનું પ્રતિનિધિ હોય લાગતું (મિમોઆ) વિગરે થોડી આવૃતખીન્નઓનાં પરાગકોશમાં એવાંજ બાનાંઓ હાજર છે. પણ બેનેટ્રિટિસના કિલ્બ રચનાવાળા નરકેસરનું રૂપાંતર થઈ આવૃતખીન્નનું માફ નરકેસર ઉત્પન્ન થયું એમ ખાત્રીથી કહેવા આપણી પાસે કાંઈ પુરાવો છે ? મેકિસકોમાં, મીકસટોકા એલ્ટાના ત્રિગુણિત-સ્તરકંમના ઉપલા ખડકોમાંથી વિદ્વાન્ વિલેડે હમણાંજ શોધી કાઢેલું જીવશેષ આ તૂટક મંબંધને સંપૂર્ણ બનાવે છે. આ ખડકો મધ્યજીવયુગની ખીજધારી વનસ્પતિઓનાં જીવશેષોથી ભરેલા છે, અને એ જીવશેષોની મોટી સંખ્યા વીલીઅમ્સોનીઆની જાતને લગતી છે. એમિઆ જાઈગેસ (હવે તે વીલીઅમ્સોનીઆ જાઈગેસના નામથી ઓળખાય છે) પ્રથમ ચાર્કશાયરની ટ્રેકરીઓમાંથી પ્રાપ્ત થઈ, અને સ્થાયી, એટલે ગયા સૈકાના આરંભથી જ વીલીઅમ્સોનીઆની જાત પ્રસિદ્ધિમાં આવેલી છે. આ જાતનાં પુષ્પોનું (કમનસીબે તેમનાં ખીખાંનાં જ જીવશેષો આપણે હાથ

આવ્યાં છે) વારંવાર અવલોકન થયું છે, અને તે ઉપરથી હવે સાબીત થયું છે, કે તેની પુલ્લિંગ અને સ્ત્રિલિંગ બન્ને જનનેંદ્રિયો મુખ્યત્વે બેનેદ્વિદિસના જેવીજ છે. તોપણ, ઘણે ભાગે એમ સમજાય છે, કે વીલીઅમ્સોનીઆમાં પુલ્લિંગ અને સ્ત્રિલિંગ પુખ્તો જૂદાં જૂદાં ઉગતાં હતાં.

મેકિસકોના ખડકોમાંથી વિદ્યાન વિલેંડને વીલીઅમ્સોનીઆનું જે જીવશેષ પ્રાપ્ત થયું છે તેને હવે આપણે તપાસીએ. જે ખાણમાંથી તે મળી આવ્યું તેના નામ ઉપરથી એ વિદ્યાન તે જીવશેષને ‘ એલ્ડકોન્સુએલો વીલીઅમ્સોનીઆ ’ એવું નામ આપે છે. એ જીવશેષનાં નરકેસરો વીંટીના આકારમાં ગોઠવાયેલાં છે, અને તેમના નીચલા ભાગો પરસ્પર સંઘાઈ જઈ ઘંટડીના આકારની નળી ઉત્પન્ન કરે છે, એટલે, માત્ર તેમના ઉપલા ભાગો એકમેકથી તદ્દન અલગ છે. અગત્યની વાત એ છે, કે તેમનાં નરકેસરો પિચ્છદલ એટલે પીંછાના જેવાં નથી. તેમની રચના સાદી છે, અને તેમના મુખ્ય દીંટાની ઉપરજ નરાગકેશો બખ્ખેની હારમાં ઉગેલાં છે. આવૃત-ખીન્નનું વધારે સાદું નરકેસર ઉત્પન્ન થવાની ઉત્ક્રાંતિમાં આ એક આગળ ભરેલું પગલું છે. વધારે રમુજ વાત તો એ છે, કે મેકિસકોમાંથી આ જીવશેષ મળી આવ્યું તે પહેલાં બે વર્ષ ઉપર આર્ખર અને પાર્કીન નામના બે શાસ્ત્રીઓએ પુષ્પ વિચાર કરી આવી દશાનું ઉદ્ભવિજ્જ-સૃષ્ટિમાં અસ્તિત્વ હોવુંજ જોઈએ એમ જાહેર કર્યું હતું. એ વાત પણ ધ્યાનમાં રાખવાની છે, કે બહારનાં લેક્ષણોનું

વર્ણન કરવામાં આપણે વીલેન્ડિએક્સા નામની જે વનસ્પતિનો આધાર લીધો હતો, તેનાં નરકેસરોની રચના, વિદ્વાન્ નેથોર્સ્ટના મત પ્રમાણે, પ્રમાણમાં વધારે આદી હતી.

એ વાત નવાઈ જેવી છે, કે વધારે પ્રાચીન તૃણુદ્રુમી-વનાઓ (વીલેન્ડિએક્સા અને મેકમીકોની વીલીઅમ્સોનીઆ) આવૃતખીજાઓને મધ્યશુવયુગની ભવિષ્યની એજ વર્ગની વનસ્પતિઓથી કેટલીક બાબતોમાં વધારે મળતી આવે છે. આ વાત ઉપરથી કદાચ એવું અનુમાન થઈ શકે, કે નમુનારૂપ બેનેટ્ટિનું કુટુંબ ઉત્કાંતિ-વૃક્ષની એક બાજુ ઉપરની શાખા હતું, અને મધુખ વનસ્પતિઓનો ઉત્કાંતિનાં મુખ્ય થડથી એ કુટુંબની શાખા જરા વધારે દૂર હશે.

બધી બેનેટ્ટિઓના અંતઃપુરની રચના કાંઈક જુદીજ ભાતની છે, અને એ બાબતમાં તેઓ હાલની આવૃતખીજ વનસ્પતિઓથી જૂદી પડે છે, અને હજુ મુઘી તેમની આ ઇન્દ્રિયોની વચ્ચે રૂપાંતરનો ક્રમ બતાવનારું એકકે જીવશેષ આપણે હાથ ચઢ્યું નથી. આપણે પાછળ જોઈ ગયા, કે બેનેટ્ટિનનાં પુષ્પાંડને લાંબાં દીટાં હોય છે, અને તેમની વચ્ચે વચ્ચે નિરૂપયોગી ભીંગડાં ઉગેલાં હોય છે, અને એ ભીંગડાં-ઓના છેડાઓ પરસ્પર ખીચાળીચ અડકી પરિફલ નામની (અંડાશયની આસપાસ) એક દિવાલ બનાવે છે. જે દીટાના છેડાની ઉપર પુષ્પાંડ હોય છે તેને સાદા ફલદ-પત્રની સાથે સરખાવી શકાય; અને નિર્રથક ભીંગડાંઓને હાલની તૃણુદ્રુમોનાં અન્ય ભીંગડાંરૂપી પાંદડાંઓ ગણી શકાય, અથવા તેમને

આપણે નિરૂપયોગી બનેલાં ફલદ-પત્રો કહીએ તોપણ ચાલે. ગમે તે દષ્ટિએ વિચાર કરતા એ વનસ્પતિઓ આવૃતખીજાથી ભિન્ન હોવાનું સ્પષ્ટ થાય છે. આપણે જાણીએ છીએ, કે આવૃતખીજામાં પુષ્પાંડ ફલદ-પત્રોની અંદર રહેલાં હોય છે, જેનેદ્વિટિ ઉદ્ભવિજાતોમાં તેઓ નિરૂપયોગી ભાગડાંઓમાં એટલે તદ્દન જૂદી જ જાતનાં અવયવોમાં આવેલાં છે આ વ્યવસ્થાનું રૂપાંતર ઘડી બીજી વ્યવસ્થા કેવી રીતે ઉત્પન્ન થઈ તે વિચારવું જરા મુશ્કેલ છે. ઉપરની બધી હકીકત ઉપરથી એવું સ્પષ્ટ સમજાય છે, કે હજી આપણે આવૃતખીજાની ખરી પૂર્વજો શોધી શક્યા નથી. એકજ મહાન થડની પરસ્પર મેખાંધ ધરાવતી માત્ર જૂદી જૂદી શાખાઓ આપણા હાથમાં આવી છે.

લેક્સૂચક ૪ થી અગત્યની વાત ફલનની પદ્ધતિ છે. એ મંબ ઘે હાલમાં આપણને કાંઈ પણ ચોક્કસ પ્રત્યક્ષ માહિતી નથી; કારણ કે તેની પુષ્પની દશામાં અંતઃપુરની રચના કેવી હોય છે તેનું અવિસ્તર વર્ણન હજી પ્રસિદ્ધ થયું નથી. તોપણ, આપણે એટલું જાણીએ છીએ, કે જ્યારે ભવિષ્યમાં બીજાં પાક્યાં ત્યારે તેઓ ફળનાં પૃષ્ઠ મુધી આવી પહોંચ્યા હતા. પરિફલનાં આંકડાં છિદ્રોમાર્થી તેમનાં દ્વારક કેવી રીતે જરા બહાર ધસી આવ્યાં હતાં તે આપણે પાછળ વાંચી ગયા. ઘણે ભાગે પુષ્પની દશામાં પણ તેમની રચના એવી જ હશે, અને જો એમજ હોય તો પરાગ દ્વારકમાં જ પડવાથી એ પુષ્પાડાનું ખરેખર પ્રત્યક્ષ ફલન થતું હોતું એજ વાત બીજી રીતે

કહીએ, તો ફલનની બાબતમાં બેનેદ્વિટિ વનસ્પતિઓએ હંબુ પણ વિવૃતખીજાઓનું લક્ષણ કાયમ રાખ્યું છે. જો આ વાત ખરી હોય તો તેમાં કાંઈ નવાઈ નથી, કારણ કે તેથી એમ સૂચન નથી થતું કે બેનેદ્વિટિનું કુટુંબ આવૃતખીજા વનસ્પતિઓ હતી, પણ તેથી તો માત્ર એટલું જ સૂચન થાય છે, કે તેઓ આવૃતખીજાની અનુમિત અવતરણરેખાની બહુ જ પાસેની રેખા ઉપર હતી.

આપણે પાછળ વાંચી ગયા, કે બેનેદ્વિટિનું કુટુંબ દ્વિદળ વનસ્પતિઓની સાથે વધારે નજદીકનો સંબંધ ધરાવે છે. તેમની સાથે બહુ જ પાસેનો સંબંધ ધરાવનાર મેગ્નોલી-એસીનું કુટુંબ છે, અને પારસપીપજો વિગેરે સુંદર વૃક્ષો અને કેટલાંક વામન-વૃક્ષો (શ્રુષ્પ) એજ કુટુંબના સભ્યો છે. આ વર્ગની ઉદ્ભિજ્જનેનાં પુષ્પોમાં, વજા અને ફૂલમણિ એવા પરિપુષ્પના વિભાગ પડેલા નથી; પરિપુષ્પની પાંદડીઓ અનેક અને છૂટી છૂટી એટલે પરસ્પર અલગ હોય છે. ઘણીવાર તેમની ગોઠવણી વમળના જેવી હોય છે; નરકેસરો અંડાશયથી સહેજ નીચે, એટલે અંતઃપુરની નીચે, પુષ્પાશયમાંથીજ (રિસેપ્ટેકલ) ઉગેલાં હોય છે; આખા ફૂલનો અક્ષ ઘણીવાર લંબાયેલો હોય છે, અને ઘણીવાર તેનું શંકુના જેવા આકારનું પુષ્પાશય પણ વધારે લાંબુ થયેલું હોય છે, અને તેની ઉપર ફલદ-પત્રોની ઓટી મંજ્યા ઉત્પન્ન થયેલી હોય છે. આ બધી બાબતોમાં આ વર્ગ બેનેદ્વિટિનાં પ્રસ્તુત જીવશેષોને બહુ જ મળતો આવે છે. મોરવેક્ષાદિ (રેનન્કયુલેસી) અને નિઝિક્સી (જળ-કમળ)

વિગેરે કુટુંબો પણ તેમની સાથે થોડી ઘણી સમાનતા પ્રગટ કરે છે. એ વાત જાણવી અગત્યની છે, કે મેન્નોલીએસીના કુટુંબમાં હિમિસ (ચિન્ટર્ન બાર્ક), અને તેના જેવાંજ કુટુંબોમાં ખીજી બે કે ત્રણ એમ કુલ આશરે માત્ર ચારજ દ્વિદળ વનસ્પતિઓ છે કે જેમનું કાષ્ઠ વિવૃતખીજાઓના જેટલુંજ અને જેવું સારી રચનાવાળું છે. ઘણા ઉદ્ભિન્નવે-
તાઓ આ કુટુંબોના સમૂહને આદ્ય અને પ્રાચીન ગણે છે, અને ખટિકાયુગના ખડકોમાંથી મેન્નોલિએસીનાં જીવશેષો પણ આપણને પ્રાપ્ત થયાં છે. તોપણ, આપણે એટલી વાત કબૂલ કરવી પડશે, કે બેનેટ્ટિટિનાં પુષ્પોનું ખાત્ર લક્ષણ-નરકેસરના મંથોગથી ઉત્પન્ન થતી નજી-મેન્નોલીએસી અથવા તેના જેવાંજ અન્ય કુટુંબોનાં પુષ્પોની એક પણ ચીજને જરા પણ મમાન નથી. આ ઉપરથી વિદ્વાન વીલેંડને એવું સૂઝી આવ્યું છે, કે મધ્ય જીવયુગની તૃણદ્રુમીવનાઓ હરિણુપદી (કાન્વો-લ્વુલસ) વિગેરે વધારે ઉંચી કેટિનાં દ્વિદળ કુટુંબોની સાથે પણ સંબંધ ધરાવતી હશે. એ દૃષ્ટિએ વિચાર કરતાં એમ સમજાય છે, કે બેનેટ્ટિટિના નિકટના પૂર્વજોમાંથી ઉત્ક્રાંતિની ઘણી શાખાઓ વિવિધ દિશાઓમાં ફેંટાયેલી હશે. હાલમાં તો આ બધી કલ્પનાઓ છે. જલ્દે એટલી વાત તો સ્પષ્ટ છે, કે મધ્યજીવયુગની તૃણદ્રુમીવનાઓનાં પુષ્પોની રચના બહુજ ઉંચી કેટિની હતી. જો હાલની વધારે ઉંચી કેટિની અપુષ્પ વનસ્પતિઓ આ પૂર્વજોમાંથી જ ઉતરી આવેલી હોય, તો પુષ્પનો ઉત્ક્રાંતિ ઉલટી દિશામાં થઈ ભૂતકાલીન પુષ્પની કિલ્બટ રચના વધારે સારી બની એ વાત નિર્વિવાદ છે. એ રીતે વિચારતાં

તો આપણે એમજ મમજવાનું છે, કે આવૃત્તીબદ્ધતા બહુજ માઠી રચનાવાળાં પુષ્પો આદ્ય પુષ્પોથી બહુજ દૂર ગયેલાં છે.

તે દ્વિદળ વનસ્પતિઓ મધ્યજીવયુગની તૃણદ્રુમી-વનાઓના મહાન વર્ગમાંથી ઉત્પન્ન થઈ-અને હાલમાં શાસ્ત્રીઓની એવીજ માન્યતા છે-તો એકદળ વનસ્પતિઓની પૂર્વજો કઈ ઉદ્ભિજ્જને હશે ? તૃણદ્રુમીવનાઓ કે અન્ય વિવૃત્તીબદ્ધઓની માથે તેમનો પ્રત્યક્ષ સંબંધ બતાવનાર એકકે વસ્તુ હાજર નથી. એ સંબંધે આપણે માત્ર એટલું જ અનુમાન કરી શકીએ, કે ઉત્કાંતિ-વૃક્ષની આમાન્ય શાખામાંથી દ્વિદળ વનસ્પતિઓએ એક પોતાની સ્વતંત્ર શાખા પસંદ કરી કે તરત જ એકદળ વનસ્પતિનો વર્ગ જીતી શાખામાં ફેંટાઈ ગયો. આ પ્રશ્ન સંબંધે શાસ્ત્રીઓએ ઘણો વિચાર કર્યો છે, અને હવે તેમની એવી માન્યતા થઈ છે, કે એકદળનાં વિશિષ્ટ લક્ષણો (દાખલા તરીકે, તેમના થડમાંથી પરિવર્ધિની પેશિનો નાશ) ઘણે ભાગે તેમની જમીનની અંદર જીવવાની પદ્ધતિને (કંદ અને મુરણ વિગેરેના ગડુ), અથવા, તેમની ઉત્કાંતિની શરૂઆતમાંજ તેમણે સ્વીકારેલા જળનિવાસને આભારી છે. તોપણ, આ મર્વ કેવળ કલ્પના છે; વસ્તુતઃ, એકદળ વનસ્પતિઓની ઉત્કાંતિ વિષે હાલમાં આપણે કાંઈ જ જાણતા નથી: ખટિ-કાયુગના ખડકોમાંથી, એકદળ વનસ્પતિઓમાં નમુનારૂપ ગણાતાં તાડ વૃક્ષોનાં સંખ્યાબંધ જીવશેષો પ્રાપ્ત થયાં છે, અને આ વાતનો સંતોષકારક ખુલાસો હજી મુખી થયો નથી.

આ એને એવી ખીજ ઘણી વાતો એમ સ્પષ્ટ સૂચવે છે, કે ઉત્કાંતિ-વૃક્ષમાં આવૃતખીજઓની શાખાનું વાસ્તવિક મૂળ, આપણને લાગે છે તેથી પણ, બહુજ વધારે દૂર છે, તથા જે તૃણુદ્રુમીવનાઓને આપણે તેમની પૂર્વજો ધારીએ છીએ તેઓ મધ્યજીવયુગના આરંભમાજ ઉગતી હશે.

આપણે પાછળ જોઈ ગયા, કે આવૃતખીજઓ તેમના સમકાલીન જીવડાંઓને અનુકૂલ બની હતી. તેમની ઉત્પત્તિ અથવા પ્રગતિનું મુખ્ય કારણ ઘણે લાગે એજ છે. મધ્ય-જીવયુગની તૃણુદ્રુમીઓમાં પુષ્પો અને જીવડાઓની વચ્ચે સંબંધ ક્યારનોયે બંધાઈ ચૂક્યો હતો કે નહિં એ પ્રશ્ન ખરેખર અગત્યનો છે. એનેટ્રિટિસનાં ફૂલ હાલનાં મોટામા મોટાં ફૂલના જેટલાં મોટાં અને મુંદર હતાં. તેનાં એવાં ખીલેલાં પુષ્પો ખરેખર જીવડાંને લોભાવે એવાં હશે. તેમનાં રંગ વિષે આપણને કંઈ માહિતી નથી, પણ હાલની મજીવ તૃણુદ્રુમીઓની જનનેન્દ્રિયોમા જે મુંદર રંગો આપણે ઘણીવાર જોઈએ છીએ, તે ઉપરથી આપણે એવું અનુમાન કરી શકીએ, કે તેમની પૂર્વજોનાં ફૂલમાં એવાજ રંગ હાજર હશે, અને તેથી જીવડાંઓ લોભાઈ તેમનો મુલાકાત લેતાં હશે.

જીવડાંઓ હાલના શંકુધારી કુટુંબના કેટલાક મહ્યોના શંકુઓની વારંવાર મુલાકાત લે છે તેઓ ઘણે લાગે પરાગ-કણની લાવજ કરનારાં છે. તેથી એ વાત તદ્દન નંભવિત છે, કે વધારે શ્રમસાધ્ય રચનાવાળાં ફૂલથી યુક્ત મધ્યજીવયુગની

તૃણદ્રુમીવનાઓ જીવડાંઓના સાધનથી ફલન કરવા માટે ક્યારનીયે યોગ્ય બનેલી હશે.

એ વાત ગમે તેમ હો, પણ વિદ્વાન વિલેંડનાં અભયળી ભરેલાં સંશોધનોએ સાબીત કર્યું છે, કે માધ્યમિક યુગની તૃણદ્રુમીવનાઓને યથાર્થ ફૂલ હતાં; એ અને બીજી બાબતોમાં, છેવટે તેમનું સ્થાન લેનારી આવૃતબીજાઓને તેઓ અત્યંત સમાન હતી. શાસ્ત્રીઓએ તેમને ‘ પ્ર-આવૃતબીજા ’ એવું નામ આપ્યું છે તે ખરેખર યથાર્થ છે. વીલીઅમ્સોનીઆ અને બેનેટ્ટિસની ઘટના સંપૂર્ણ રીતે સમજાઈ ન હતી, તે સમયે વિદ્વાન્ સેપોર્ટાએ, અભણે, બેશીની પેઠે તેમને જાન્નેને આ નામ આપ્યું. હજી પણ આપણે આવૃતબીજાની ઉત્કાંતિના પ્રશ્નનો પૂરો ખુલાસો કર્યો નથી, તોપણ એટલી વાત નક્કી છે, કે આપણા હાથમાં તેની ફૂંચી આવી ગઈ છે. તેને આધારે આપણે એટલું જાણી શક્યા છીએ, કે વધારે ઉંચી જાતની રચનાવાળી મધ્યજીવયુગની તૃણદ્રુમીઓ રૂપી મોટી શાખામાંથી હાલની સપુષ્પ વનસ્પતિઓની એક નવી ડાંખળી ઉત્પન્ન થઈ, અને એ વિકસેલી ડાંખળી થોડા સમયમાં જરૂર તેની જનક-શાખાને દબાવી દેશે.

પ્રકરણ ૪ થું.

બીજધારી વનસ્પતિઓની ઉત્કાંતિ.

પાછલા પ્રકરણમાં આપણે જોઈ ગયા, કે મધ્યજીવયુગની તૃણદ્રુમીવનાઓ બહુજ ઉંચી જાતની રચનાવાળી વનસ્પતિઓ હતી, અને બેનેટ્રિટિ નામનું તેમનું અંગ્રગણ્ય કુટુંબ હાલની તૃણદ્રુમી વનસ્પતિઓથી ચઢીઆતું હોઈ આવૃતબીજાઓની સાથે સ્પર્ધા કરતું હતું. જે આપણે ઉત્કાંતિનો એવો અર્થ કરીએ કે ‘નિયમિત પ્રગતિ થઈ સાદી સજીવ વસ્તુનું કિલ્લટ બનવું,’ તો આ પ્રાચીન વનસ્પતિનું કુટુંબ તેની સહોહર હાલની વનસ્પતિઓથી કેવી રીતે શ્રેષ્ઠ હોઈ શકે ? પણ, વસ્તુતઃ ઉત્કાંતિનો એવો અર્થ નથી. ઉત્કાંતિને શાંત નદીમાં ઉત્પન્ન થતી અને નિયમિતપણે વધ્યાં જતી ભરતીની સાથે મરખાવી શકાય તેમ નથી; તે તો દરિયાની આગળ ધપતી ભરતીનાં મોજનાં જેવી છે. મધ્યજીવયુગમાં તૃણદ્રુમીવનાઓ બહુજ ઉંચે ઉછળેલું મોજું હતું; થોડાજ સમયમાં એ મોજું પાછું હડયું, અને બીજું મોજું ઉછળી તેનાથી પણ વધારે ઉંચે પહોંચ્યું.

તે સમયે તૃણદ્રુમીવનાઓનું કુટુંબ, ખરેખર, અંગ્રગણ્ય હતું, અને તેમનાથી વધારે શ્રેષ્ઠ બીજું એકે કુટુંબ ન હતું. તે યુગમાં તેઓ અતિ ઉત્તમ સપુષ્પ વનસ્પતિઓ હતી. એ

વિનયવંત વનસ્પતિ કુટુંબ તે સમયે આખી પૃથ્વી ઉપર બધે સ્થળે ઉછરતું હતું, અને તેથી આપણે નક્કી કહીશું, કે એ વનસ્પતિઓ તે યુગની પરિસ્થિતિને અત્યંત યોગ્ય બનેલી હતી ભવિષ્યમા પૃથ્વીની પરિસ્થિતિ વધારે ગુંચવાડા ભરેલી થઈ, અને તેનું કારણ મુખ્યત્વે અસંખ્ય જીવડાંઓની ઉત્પત્તિ હતું. એ સમયે, ઘણે ભાગે તૃણકૃમીવનાઓમાંથીજ ઉત્પન્ન થયેલી આવૃતખીનઓની ડાખળીને પૃથ્વીની આ બદલાયેલી પરિસ્થિતિ અનુકૂલ લાગી. તેનો તેણે તરતજ લાભ લીધો, અને પૃથ્વી ઉપર નવાં ખાસી પડતા અસંખ્ય સ્થાનોનો તેણે કબજો લઈ લીધો. પ્રાચીન કુટુંબના વધારે ઉંચી કોટિના સભ્યો તેમના વધારે સાહસિક યુવાન મહોદરોની સાથે હરિશ્ચંદ્ર કરવામાં ક્ષમી શક્યા નહિ; જૂનું કુટુંબ ધીમે ધીમે ક્ષીણ થવા લાગ્યું, અને થોડા સમયમાં તેનો નાશ નાશ થયો. ઓછો વિકાસ પામેલી તૃણકૃમીઓ ઉત્પન્ન થતી આવૃતખીનઓની સાથે પ્રત્યક્ષ હરીશ્ચંદ્રમાં ઉતરી નહીં, અને તેથી તેમના થોડા વંશજો હાલ પૃથ્વી ઉપર હયાત છે.

નીલસોનીઆ નામની તૃણકૃમીઓનો એક જાત છે, પણ તે કયા કુટુંબની મધ્ય છે, તે આપણે બરાબર જાણતા નથી. મધ્યજીવ યુગમાં ઉગતી એ જાત તૃતીયયુગમાં (એટલે માયોસીન યુગમાં) પણ હયાત હતી, અને સેગેડીઅનના ટ્રેટમાંથી તેનું જીવશેષ આપણે હાથ આવ્યું છે. અધ્યાપક નેથાસ્ટની એવી માન્યતા છે, કે નિલસોનીઆ હજુ પણ ચિન દેશમાં ઘણે ભાગે ઉગે છે.

હવે આપણે એક પગલું વધારે પાછળ ભરીશું અને તૃણકુર્મીવનાઓજ કઇ વનસ્પતિઓમાથી ઉત્પન્ન થઇ તે શોધી કાઢવા પ્રયત્ન કરીશું.

તૃણકુર્મી કુટુંબની મોટી શાખાઓ હજુ પણ હંસરાજની સાથે સ્પષ્ટ સમાનતા પ્રગટ કરે છે, અને એ વાત ઘણો સમય થયાં શાસ્ત્રીઓએ સ્વીકારેલી છે. હાલની તૃણકુર્મી વનસ્પતિઓમાં આપણી નજરે આવતી ફલનની રીત (ખંદુકોપકેશી શુક્રકોપોના સાધનથી), ભીંગડાંરૂપી નરકેસરની ઉપર ઉગતાં પરાગ-કોશોની રચના, કેટલાક સભ્યોની બાબતમાં નાનાં પાંદડાંઓની વમળના જેવી ગોઠવણી અને બીજા સભ્યોમાં તેમની નસોની, વ્યવસ્થા, અને સિલિંગ સાધકિસના થડ ઉપર જ ઉગેલાં બીજકણદલ, એ સર્વ લક્ષણો હંમરાજ વનસ્પતિઓમાં પણ હાજર છે. બેનેટ્ટિટિનું કુટુંબ ઘણી રીતે આગળ વધેલું હતું, અને તોપણ કેટલાંક લક્ષણોની બાબતમાં હંસરાજની સાથેનું તેમનું સામ્ય હાલની તૃણકુર્મીઓથી વધારે હતું. બેનેટ્ટિટિના અસાધારણ સંયુક્ત નરકેસરો મેરેટ્ટિઆ નામની હંમરાજનાં પરિપક્વ જનનપણેનિ અત્યંત મળતાં આવે છે વધારેમાં, હાલની હંસરાજોનાં નાનાં જનનપણેા જેમ રૂવાંટીથી ઢંકાયેલાં હોય છે, તેમ એ નરકેસરોની ઉપર પણ ચપટા ભીંગડાના જેવા વાળ બીજોબીચ ઉગેલા હોય છે. આ સંબંધે જેમ જેમ આપણું જ્ઞાન વધશે તેમ તેમ આ બે વનસ્પતિસમૂહોની વચ્ચે આપણને વધારે ને વધારે સામ્ય જણાશે; કારણકે મધ્યજીવયુગના

ખડકોમાંથી અત્યંત સંદિગ્ધ જનનપણે આપણે હાથ આવ્યાં છે, અને તેઓ તૃણદ્રુમી કે હંસરાજ પૈકી કયા વર્ગનાં છે તે હજી મુધી નક્કી થયું નથી.

આપણે હેતુ હવે તૃણદ્રુમીવનાઓને ભૂતકાળમાં અનુસરવાનો. અને પ્રાચીન જીવયુગના ખડકોમાં તેમની ઉત્ક્રાંતિને સ્પષ્ટ કરે એવું કાંઈક છે કે કેમ તે જોવાનો છે. જે આપણી આ શોધ સફળ થાય તો આપણે બીજધારી વનસ્પતિઓનું ઉત્પત્તિસ્થાન શોધી કહાડવામાં એક અગત્યનું પગલું આગળ વધ્યા એમ નક્કી મનજવું; કારણ કે તૃણદ્રુમીવનાઓ ભૂસ્તર-વિદ્યાના ઇતિહાસના મધ્યયુગમાં બહુજ અગત્યની છે એટલું જ નહિ, પણ હાલમાં શ્રેષ્ઠ સ્થાન ભોગવતી સપુષ્પ વનસ્પતિઓનું પણ તે ઉત્પત્તિસ્થાન છે. તેથી હવે આપણે જે વિષય સંબંધે વિચાર કરવાનો છે તે આવૃતબીજાઓની ઉત્પત્તિના કરતાં પણ વધારે વિશાળ છે, કારણ કે આ પ્રશ્ન સમસ્ત બીજધારી વનસ્પતિઓની ઉત્ક્રાંતિને લગતો છે.

હવે આપણે પ્રાચીન જીવયુગની વનસ્પતિઓ તરફ વળીએ. આપણે માત્ર વૃદ્ધોરગસ્તરયુગ, અંગારસ્તરયુગ, અને મત્સ્યસ્તરયુગના ખડકોને તપાસીશું, કારણ કે એથી વધારે જૂના ખડકોના સંબંધે હજી મુધી કાંઈ વધારે જણાયું નથી.

આપણે પાછળ જોઈ ગયા, કે શાંખીઓ મધ્યજીવ યુગને ‘વિવૃતબીજાનો યુગ’ એ નામથી ઓળખે છે. પ્રાચીન જીવયુગને તેઓ ‘પ્રસ્થન્નબીજાનો યુગ’ કહે છે. ખરેખર

એ વાત સત્ય છે, કે ભવિષ્યના બીજા કોઈ પણ યુગના કરતા આ યુગની ઉદ્ભિજ્જસૃષ્ટિમાં અલિંગકોષધારી (સ્પોર-પ્લોન્ટસ) વનસ્પતિઓની સંખ્યા બહુ જ વધારે હતી. કોલસો બનાવનારાં મોટાં ભીનાં જંગલો ઘણે ભાગે એજ વર્ગની ઉદ્ભિજ્જોથી ભરેલાં હતાં. તોપણ, હાલની દુનિયાના ઉપયોગને લીધે પ્રચન્નબીજની પ્રાચીન ઉદ્ભિજ્જસૃષ્ટિ ઘણી લૂંટાઈ ગઈ છે.

પ્રાચીન ઉદ્ભિજ્જસૃષ્ટિમાં અતિપ્રચિદ્ધ થયેલી અંગાર-સ્તર યુગની વનસ્પતિઓમાં સુખ્યત્વે પાચ જાતની વધારે ઉંચી કેાદિની ઉદ્ભિજ્જો હાજર હતી:

હૃદાકારી (કોડિંગિ), વિવૃતબીજ વર્ગનાં વૃક્ષો;

અશ્વપુચ્છી કુટુંબ, એ સમયે તેઓ વૃક્ષોના જેટલાં ઉંચાં વધતાં હતાં.

સ્ફીનોફિટ્સ, આ કુટુંબનો આજે તદ્દન લોપ થયો છે, આગલા કુટુંબની સાથે તે બહુજ દુરનો સંબંધ ધરાવે છે (પ્રકરણ ૭ મું જુઓ).

સીતાહાર, એ સમયમાં આ વનસ્પતિઓ બહુજ ઉંચી વધી હાલનાં વૃક્ષોના જેટલી ઉંચાઈએ પહોંચતી હતી, અને

હંસરાજના જેવી વનસ્પતિઓ.

ઉપજતોની સંખ્યામાં, છેલ્લો સમૂહ બહુજ અગત્યનો હતો. કારણ કે તેમની સંખ્યા ઉપજતોની કુલ સંખ્યાથી લગભગ અડધો અડધ હતી. અત્યારમુધી એવી માન્યતા હતી, કે હંસરાજનાં જનનપણોવાળો આ મોટો વનસ્પતિ-સમૂહ ખરેખર યથાર્થ પ્રચ્છન્નખીજ વર્ગની હંસરાજ-ઉદ્ધિલિન્ગેનો બનેલો છે. પણ થોડાં વર્ષો થયાં એક બે નિપુણ સંશોધકોને એવી શંકા ઉત્પન્ન થઈ, કે એ ઉદ્ધિલિન્ગે પૈકી મોટી સંખ્યા માત્ર દેખાવમાં જ હંસરાજ લાગે છે, અને વસ્તુતઃ તેઓ વધારે ઉચી કોટિની વનસ્પતિઓ છે. ખીજ શાસ્ત્રીઓનાં સંશોધનોથી આ શંકા વધારે સખળ થઈ છે. હંસરાજના જેવી લાગતી આ વનસ્પતિઓમાં માત્ર થોડીજ યથાર્થ હંસરાજ હોવાનો સંતોષકારક પુરાવો આપે છે. તેમની વંશવૃદ્ધિ અલિંગકોષોના જ સાધનથી થાય છે. એ વનસ્પતિ સમૂહના મોટા ભાગમાં, જનનેન્દ્રિયોનું સ્વરૂપ કેવું હતું તે ૭ કે ૮ વર્ષ થયાં કાંઈક જણાયું છે. એ સંબંધમાં આપણને જે પુરાવો મળ્યો છે તેથી એમ સ્પષ્ટ સાબીત થાય છે, કે હંસરાજ લાગતી પ્રાચીન જીવચુગની લગભગ ખંધી વનસ્પતિઓ પોતાની પુનરુત્પત્તિ ખીજનાં સાધનથી કરતી હતી. કેટલાંક જીવશેષોમાં ખીજ જનનપણોને સજ્જક વળગેલાં હોય છે, અને ખીજ જીવશેષોની બાબતમાં ઘટનાની સાર્યતાને લીધે આપણે તેમને ઓળખી શકીએ છીએ. તે સમયની અસંખ્ય ઉદ્ધિલિન્ગેમાં, અને મુખ્યત્વે હંસરાજ જણાતી વનસ્પતિઓની મુખ્ય મુખ્ય ઘણી જાતોમાં, અમુક જનનપણોની ઉપર હમેશાં અમુક ખીજ ઉગેલાં હોય છે. એ રીતે,

અંધા પુરાવો (જો કે પ્રત્યક્ષ પુરાવો તો માત્ર થોડીજ વનસ્પતિઓની બાબતમાં મળ્યો છે) સાબીત કરે છે, કે હંસરાજના વર્ગની લેખાતી પ્રાચીન જીવયુગની ઘણી વનસ્પતિઓ વસ્તુતઃ ખીજધારી વનસ્પતિઓ હતી, અને તેઓ ખરેખર પ્રચ્છન્ન ખીજ વર્ગની સભ્યો ન હતી. જેમ મધ્યજીવયુગની ઘણી તૃણદ્રુમીઓ હાલની તૃણદ્રુમીઓથી બહુજ વધારે વિકસિત હતી, અને હાલની યથાર્થ મધુષ્પ વનસ્પતિઓને બહુ મમાન હતી, તેમ પ્રાચીન જીવયુગની આ હંસરાજ લાગતી ઉદ્ભિજ્જોને વિકાસ હાલની યથાર્થ હંસરાજથી વધારે શ્રેષ્ઠ હતો, અને તેઓ ખીજધારી વનસ્પતિઓની સાથે 'ખરો મંગ' ધરાવતી હતી.

ત્યારે પ્રાચીન જીવયુગમાં અત્યંત વિકાસ પામેલી આ ખીજધારી-હંસરાજનાં કેવાં લક્ષણો હશે ? કયાં લક્ષણોમાં તેઓ મધ્યજીવયુગની ખીજધારી ઉદ્ભિજ્જોને અને કયાં લક્ષણોમાં તેઓ હંસરાજોને મળતી આવતી હતી ? પ્રાચીન જીવયુગના ખડકોમાંથી-ખીજધારી વનસ્પતિઓનો કોઈ નવો અને વિશાળ સમુહ જડી આવે તો આ વધારે ઉચી કોટિના સમૂહોની ઉત્કાંતિ સમજાવી વધારે સ્પષ્ટિ પડે.

પ્રથમ આપણે એક ખીજધારી-હંસરાજને તપાસીએ. લિજિનોડેન્ડ્રોન, એલડહેમિઅમ નામનું ખીજધારી-હંસરાજનું જીવશેષ સૌથી પ્રથમ આપણને પ્રાપ્ત થયું. બાકી જીવશેષભૂત વનસ્પતિઓમાં તેનો આજે લગભગ સંપૂર્ણ અભ્યાસ થયેલો છે. લિજિનોડેન્ડ્રોનનાં વિવિધ અવયવોનાં

જીવશેષો જૂદે જૂદે વખતે પ્રાપ્ત થયેલાં છે, તેથી એ આખી વનસ્પતિનો સંપૂર્ણ ખ્યાલ લેવા માટે આપણે તેમની હકીકતને એકઠી કરી ખરાબર ગોઠવવી જોઈએ તેના પાંદડાનું વર્ણન ઇ. સ. ૧૮૨૯ માં કરેલું છે, અને તેનું છેલ્લું અવયવ, એટલે, પુલ્લિંગ જનને ક્રિયની શોધ ઇ. સ. ૧૯૦૫ માં થઈ છે. આપણે તેના ઐતિહાસિક ક્રમને ખરાબર અનુસરીશું નહિં; માત્ર એ સંશોધનોના પરિણામનો આપણે મહેજ ખ્યાલ મેળવીશું.

અંગારયુગના નીચલા અને મધ્ય ખડકોમાંથી મળી આવેલી લીજિનોડેન્ડ્રોન ઓલ્ડહેમિઅમનો દેખાવ નાના હંસરાજ-વૃક્ષના જેવો છે, તેનું થડ લાંબું અને પાતળું છે અને તેના ઘેરાવાનો વ્યાસ બે ઇંચથી પણ ઓછો હોય છે. એમ લાગે છે, કે તે ઉદ્દલિન્ન જમીનમાંથી સીધી ઉંચી ઉગતી ન હતી, અને તે પોતાના વધારે મજબૂત પડોશી વૃક્ષોની મદદથી ઉભી રહેતી હતી. વેસ્ટ ઇન્ડિઝના ટાપુઓમાં ઉગતી કંટકી હંસરાજનાં (પ્રેમ્બલ ફર્ન, ડેવેલિઆ એક્યુલિએટા) ખીજાં વૃક્ષોને આધારે ઉંચે ચઢતાં જનનપણોની પેઠે લિજિનોડેન્ડ્રોનના થડ અને પાંદડાંઓની ઉપર પણ તીણા કાંટાઓ ઉગેલા હોય છે; અને આ સામ્યને ઉદેશી ઉપર લખેલું અનુમાન બંધાય છે. વળી, શીજી ટાપુમાં ઉગતાં ટોડિઆ હંસરાજનાં નાનાં પણ સીધાં વૃક્ષોની સાથે પણ તેને સરખાવી શકાય એમ છે. લિજિનોડેન્ડ્રોનનાં ઘણાં જીવશેષોમાં થડ માંથી ઘણી શાખાઓ ફૂટેલી જોવામાં આવે છે, પણ એ આખી ઉપજાતમાં આવું જ બનતું હશે એમ કોઈ નક્કી કહી શકાય

નહીં. ખરેખર એમ મંલવે છે, કે સિજિનોડેન્ડ્રોન ઓલ્ડ-હેમિઅમના સમૂહ વાચક નામની અંદર ઘણી ભિન્ન ઉપ જાતોનો સમાવેશ કરેલો હોય.

‘તેનું’ પાન બહુ મોટાં અને સુંદર પણ બહુ જ ઉંડી ખાંચવાળાં જનનપર્ણોનું બનેલું છે, અને તે એરુસેનિઅમ અથવા ડેવેલિઆ હંમરાજના પાંદડાના જેવું જ દેખાય છે; બન્નેમાં ફેર માત્ર એટલોજ છે, કે સિજિનોડેન્ડ્રોનના પાંદડાના મુખ્ય દીંટામાંથી ફાંટાઓ ફૂટેલા હોય છે. આ તેનું ખાસ લક્ષણ છે. આ મોટાં જનનપર્ણો થડની ઉપર વમળની પેઠે ગોઠવાયેલાં હતાં. જે થડની ઉપર તેઓ ઉગતાં હતાં તે આપણને જડથું, તે પહેલા ઘણાં વર્ષ થયાં તેમના બહારનાં લક્ષણો આપણી જાણમાં આવ્યાં છે. તેની નાની પાંદડીઓ જરા જાડી અને કોર આગળથી વળી ગયેલી હતી. તેની અંદરની રચના અને આ બે લક્ષણો ઉપરથી એમ સમજાય છે, કે એ વનસ્પતિ ઘણે ભાગે સૂકી જમીનમાં, અથવા ભીનાશવાળી ખારી જમીનમાં ઉગતી હશે; અને આ બીજું અનુમાન વધારે મંલવિત છે. તેના થડમાંથી ઘણાં મૂળ ઉત્પન્ન થતાં હતાં. તેમનો ઉપલો ભાગ હવાવાસી (એરિઅલ) હોય એમ ભાગે છે. તેઓ ધીમે ધીમે નીચાં વધી જમીન સુધી પહોંચતાં અને પછી ત્યાં તેઓ પુષ્કળ ફાંટાતાં.

આ અવયવોની અંદરની ઘટના પણ પ્રસિદ્ધ છે, કારણ કે લેલેશાયર અને ચોર્ડશાયરમાં કેટલાંક કોલમાના વળાંમાં ‘ઝેલસાના ક્કાઓ’ અથવા સૂતાવાળા કોલસાની જે-શાંકો કે

તેમાં તેમનાં બધાંના પુષ્કળ દૃઢતાઓ બહુજ સારી રીતે સચવાઈ રહ્યા છે. અત્રે આપણે તેમના શરીરની અંતર્ઘટના સંબંધે વધારે વિવેચન કરીશું નહીં. તેના યુવાન થડની ઘટના ઓમ્મમન્ડા અથવા નૃપી હંમ્મરાજના (રાયલફર્ન) જેવી હતી. તોપણ, લવિષ્યમાં તેની ઉમ્મર જેમ જેમ વધતી ગઈ તેમ તેમ પરિવર્ધિની પેશિમાં નવા કાષ્ટ અને વટકકતું પહોળું ચક્ર ઉમેરાયું, અને તેનાં કેપ નરમ અને નામ્બુક હોવા છતાં પણ ઘણી વાર બહુજ સારી રીતે સચવાયાં છે. એ રીતે, વૃદ્ધ થડની ઘટના તૃણદ્રુમીના થડને વધારે મજાતી આવતી હતી. બન્નેમાં વાહિની-તંતુઓ ઠેક પાંદડા મુધી પહોંચેલા છે, અને તેમની રચના પણ આજેહુબ પરસ્પર સમાન છે. તોપણ એ જીવશ્રેણીનાં પાંદડાંઓનાં દીંટાઓમાં માત્ર એક કે બેજ વાહિની-તંતુઓ હતા, અને તેમાંથી ફાંટાઓ અને ઉપફાંટાઓ ઉત્પન્ન થઈ જનનપર્ણના ગુચવાડા ભરેલા ઉપ-વિભાગોમાં પ્રસરેલા હતા. એ જનનપર્ણની અંદરની રચના, મામાન્ય રીતે, ઘણી હંમ્મરાજેને સમાન હતી. થડ અને જનનપર્ણ બન્ને ત્રીણા નાના ફાંટાઓથી, ઢંકાયેલાં હતાં, અને એ ઉપરાંત તેમની બન્નેની ઉપર, દીંટાવાળી ગોળ રમથંધિઓ ઉગેલી હતી. તેમાંથી મધ કે એવો બીજો કોઈ પદાર્થ ઝમતો, હતો કે નહિ તે આપણે જાણતા નથી; તોપણ, એ જીવશ્રેણીને ઓળખવામાં આવતુંઓ આપણને બહુજ ઉપયોગી નિવડી છે.

ઇ. સ. ૧૯૦૩ મુધી લિજિનોડેન્ડ્રાનની પુનરૂત્પત્તિ વિષે આપણને કાંઈજ ચોક્કસ માહિતી ન હતી, અને કેટલાક

ઉદ્દિલિજ્જવેત્તાઓ એમ માનતા હતા, કે તેમની આવી વિચિત્ર રચના હોવા છતાં પણ, આ બાળતમાં તેઓ ઘણે ભાગે યથાર્થ હંસરાજ હતી. એ વર્ષમાં અધ્યાપક એફ. ડબલ્યુ. ઓલીવરે સાબીત કરી બતાવ્યું, કે કોઈક અચૂક નામથી ઓળખાતું નધણીઆતું બીજ વસ્તુતઃ સિજિનોડેન્ડ્રોનનું જ અવયવ હતું. આ શોધને પરિણામે આ વનસ્પતિના ઇતિહાસમાં નવું પરિવર્તન ઉદ્ભવ્યું. એ નાતું બીજ પીપના આકારનું અને આશરે ૬ ઇંચ લાંબું હતું, અને હેઝલ-નટની જેઠે તેની આસપાસ પણ એક છોડું વિંટાયેલું હતું. સિજિનોડેન્ડ્રોનના થડ અને જનનપર્ણની જેઠે આ બીજના છોડાની ઉપર પણ રસઝંધિઓ હાજર હતી. એ રસઝંધિઓના સાધનથી જ એ બીજ પ્રથમ ઓળખાયું. પાછળથી એમ પણ જણાયું છે, કે બીજના દીંટાની રચના પણ સિજિનોડેન્ડ્રોનના જનનપર્ણની પાંદડીઓના દીંટાના જેવી જ હતી.

બીજનું બહુજ ઉત્તમ જતન થયેલું છે, ભેથી તેની રચનાની ઘણી ઝીણી ઝીણી બાબતો આપણે જોઈ શક્યા છીએ. છોડાને લીધે સચવાયેલું બીજ સુખ્યત્વે તેના મધ્યભાગમાં આવેલી બીજક (ન્યુસેલસ) અને તેની આસપાસ વિંટળાયેલું બીજનું ઢાંકણ એમ બે વસ્તુઓનું બનેલું છે. આ બે ભાગો દોઢ સિવાય સર્વત્ર પરસ્પર અડકેલા છે. હાલની વૃણદુર્મીઓ અને કુમારિકાકેશી વૃક્ષોનાં બીજમાં, બીજકની દોઢ ઉપર પરાગ-ગૃહ નામનો એક પોલો ભાગ હોય છે, અને તેમાં પરાગકણ આવીને પડે છે. આ વાત આપણે પાછળે જાણી ગયાં

છીએ. લિજિનોડેન્ડ્રોનના બીજમાં પણ એવીજ રચના હતી, અને તેના પરાગ-ગૃહમાં પડેલો પરાગ પણ આજે એ વનસ્પતિનાં બીજનાં જીવશોષમાં આપણી નજરે આવે છે. તોપણ, આ પરાગ-ગૃહની રચના મજાવ તૃણકૃમીઓથી વધારે કિલ્લિ હોય એમ લાગે છે; કારણ કે, લિજિનોડેન્ડ્રોનના પરાગ-ગૃહના મધ્યભાગમાંથી એક જાતની પેશિનો સ્થંભ ઉત્પન્ન થાય છે, અને પરાગનો સ્પર્શ કરવા માટે, તેની આસપાસ માત્ર સાંકડી જગા બાકી રહે છે. એક રમુજ વાત એ છે, કે પરાગ-ગૃહનું મોં ઠારકમાંથી જરા બહાર પડતું છે; તેથી પરાગકણ ઠારકમાંથી પસાર થયા સિવાય બારેબાર પરાગ-ગૃહમાં ઘાબલ થાય છે. બીજના ઢાંકણમાં ઘણા વાહિની-તંતુઓ હતા, અને તેના ઉપલા ભાગમાં પાણી ભરાઈ રહેવાને માટે ઉંચી જાતની યંત્ર-રચના હતી. જો આ વનસ્પતિઓમાં તૃણકૃમીઓની પેઠે તરતાં શુક્રકોષો ઉત્પન્ન થતાં હોય-અને એ વાત સંભવિત છે-તો ફલનની ક્રિયાને માટે જરૂરનું પાણી ઉપર વર્ષાવેલી ટાંકીઓ પૂરું પાડતી હશે.

લિજિનોડેન્ડ્રોન ઓલ્ડહેમિઅમમાં બીજ તેના કયા ભાગની ઉપર ઉગતાં હતાં તે આપણે બરાબર જાણતા નથી. એ સંગ્રંધે આપણી માહિતી માત્ર એટલીજ છે, કે બીજનું દીંદુ નક્કી પાંદડાનો એક ભાગ હતો, અને આ વાત તેની રચના ઉપરથી તફન સ્પષ્ટ થાય છે. તોપણ, બીજ ઉપજતોમાં એવાંજ બીજ જનનપર્ણના જેવા અવયવની ખૂલ્લી ડાળીઓની ઉપર ઉગેલાં આપણી નજરે આવે છે; તેથી એમ જણાય છે,

કે એ બીજા જનનપણુંના એવા ભાગો ઉપર ઉત્પન્ન થતા હતા કે જેમને પાંદડીઓ હોય જ નહીં. એ રીતે, નૃપી હંમરાજ, અને હાલની બીજી ઘણી હંસરાજોની પેઠે વનસ્પતિમાં પણ જે જાતનાં પાંદડાંઓ હતાં: સ્તરીભૂત (સ્ટરાઈલ) અને ફલીભૂત.

આ ઉંચી રચનાવાળાં બીજના સંશોધનથી શાસ્ત્રીઓને એકદમ સમજાયું, કે લિજિનોડેન્ડ્રોન યથાર્થ પ્રચલનબીજ હંસરાજોથી બહુજ લિપ્ત છે, અને તે વસ્તુતઃ બીજધારી વનસ્પતિ છે. બીજધારી વનસ્પતિઓમાં પણ તે તૃણદ્રુમીવનાઓને વધારે સમાન છે.

તોપણ, એ વનસ્પતિ સંબંધે આપણું જ્ઞાન હજી અપૂર્ણ હતું, કારણ કે તેની પુલ્લિંગ જનનેંદ્રિયો વિષે કંઈ પણ ચોક્કસ માહિતી મળી ન હતી. બીજના પરાગ-ગૃહમાં આપણે પરાગ-કણને જોયાં એ વાત ખરી, પણ એ પરાગ-કણ ત્યાં કયાંથી આવ્યાં? ઇ. સ. ૧૯૦૫માં મી. કિ સ્ટને આ પ્રશ્નનો ખુલાસો કર્યો. લિજિનોડેન્ડ્રોનનાં પાંદડાઓની ઉપર તેણે પરાગધારી ઇન્દ્રિયો જોઈ. જનનપણુંના પરાગકણવાળા ભાગની ઉપર, સામાન્ય પાંદડીઓને બદલે, ૨ થી ૩ મીલી-મીટર લાંબી નાની અંડાકૃતિ કર્ણિકાઓ ઉગેલી હોય છે. દરેક કર્ણિકાની નીચલી બાજુએ તરાકના આકારનાં, અને જે બાનાંવાળાં છે કે સાત પરાગકોશ ઉગેલાં હોય છે. જનનેંદ્રિય આવી જાતની પણ હોય છે એવું તો આપણે ઘણાં વર્ષો થયાં જાણીએ છીએ. એ જનનેંદ્રિય લિજિનોડેન્ડ્રોનનીજ છે એ વાત તો પાછળથી સાબીત થઈ. હંમરાજના

જેવી લાગતી એ યુગની અનેક ઉદ્ભવિજ્ઞાનેમાં એ જનનેન્દ્રિય હાજર હતી, અને તેથી એવું અનુમાન થાય છે, કે લિજિનો-ડેન્ડ્રોનનું કુટુંબ તે વખતે પૃથ્વી ઉપર બહોળો વિસ્તાર પામેલું હશે. પરાગધારી ઇદ્રિયોની જાતની રચનામાં એવું કાંઈજ નથી કે જેથી તે વનસ્પતિઓ ખીજધારી હોવાનું સૂચન થાય. વસ્તુતઃ, જ્યાં સુધી તેઓ લિજિનોડેન્ડ્રોનનીજ ઇદ્રિયો છે એમ સાબીત થયું ન હતું ત્યાં સુધી શાસ્ત્રીઓ તેમને મેરેટ્રિએશીઅમ્સ નામની હંસરાજનાંજ અંગો માનતા હતા.

ત્યારે હવે આપણને જણાય છે, કે લિજિનોડેન્ડ્રોનનું કુટુંબ (જે ‘ ખીજધારી-હંસરાજનું ’ નક્કી એક આદર્શરૂપ મોટું કુટુંબ છે) બહુ જ આશ્ચર્યકારક લિન્ન બિન્ન લક્ષણો પ્રગટ કરે છે. તેના યુવાન થડ અને જનનપણુંની શરીર-રચના હંસરાજના જેવી હતી, અને તેના વૃદ્ધ થડની રચના અને ખીજ સૂક્ષ્મ બાબતોમાં તે તૃણદુર્મીઓને અનુસરતી હતી. તેનાં અત્યંત વિકાસ પામેલાં ખીજ ખરેખર તૃણદુર્મીઓનાં ખીજને લહુજ મળતાં આવે છે, પણ તેની પરાગધારી ઇદ્રિયો યથાર્થે હંસરાજનાં ફલીભૂત જનનપણેનિ સમાન હોય છે. એ વનસ્પતિનું ખીજ પ્રસ્તુત પ્રશ્નનો એકદમ ખુલાસો કરે છે, લિજિનોડેન્ડ્રોન ખીજધારી કે અલિંગ કોષધારી એ બે પૈકી જરૂર એક વર્ગની સભ્ય છે; પણ તે લવિષ્યની કોઈ પણ ખીજધારી વનસ્પતિથી વધારે આદ્ય હતી, કારણ કે ખીજ અને પરાગકોશ બન્ને સામાન્ય પૌષ્ટિક જનનપણેના રૂપાંતર પામેલા

ભાંગોની ઉપર ઉત્પન્ન થતા હતાં. એ રીતે, સિજિનોડેન્ડ્રોનનું કુટુંબ પ્રાચીનતામાં સિલિંગ સાઈકેસથી પણ વધારે આગળ જાય છે, કારણ કે એ કુટુંબમાં બીજકણદલ એટલે ઉત્પત્તિને લગતાં ખાસ પાંદડાં હાજર નથી; તેનાં બધાં પાંદડાંઓ લગલગ સમાન હતાં. હંસરાજ અને બીજધારી એ બે મહાન્ વર્ગોની વચ્ચે હીંચકા ખાતી સિજિનોડેન્ડ્રોન વિગરે આપેલ વનસ્પતિઓને ‘ સબીજ-હંસરાજ ’ એવું નામ આપવામાં આવ્યું છે.

મબીજ-હંસરાજનાં એક કે બે વધારે દૃષ્ટાંતો આપવાની જરૂર છે. હંસરાજના જનનપર્ણને બરાબર વળગેલું બીજ પ્રથમ ન્યુરોપ્ટેરિસ હેટરોકાઇલા નામના જીવશેષમાં આપણી નજરે આવ્યું. ઇ. મ. ૧૯૦૪ માં મી. કિડસ્ટને એ જીવશેષમાં દીંટાને વળગેલા મોટાં બીજ જોયાં. હેઝલ-નટના જેટલાં એ મોટાં બીજ જે દીંટાને વળગેલાં હતાં તેની ઉપર આ વનસ્પતિની ખાસ પાંદડીઓ પણ ઉગેલી હતી. આ હંસરાજનાં જનનપર્ણનું કદ બહુ જ મોટું હતું તેઓ મોટામાં મોટાં હંસરાજ-વૃક્ષોનાં જનનપર્ણોના જેટલાંજ વિશાળ હતા અને તેમનો આકાર રાક્ષસી નૃપી હંસરાજને કાંઈક અંશે સમાન હતો.

ન્યુરોપ્ટેરિસના કુટુંબ વિષે પણ ઘણી હકીકત પ્રસિદ્ધ થઈ છે, અને ઘણાં જીવશેષભૂત બીજ આ વનસ્પતિઓનાં અંગે હોવાનું સાબીત થયું છે, પણ મી. કિડસ્ટનની ઉપજાતના જેટલો પ્રત્યક્ષ પુરાવો બીજ કોઈ પણ ઉપજાતને અંગે પ્રાપ્ત થયો નથી. એ ઉપજાતના મળ્યો બહુજ મોટા હતા અને તેમણે જેમણે હંસરાજનાં વૃક્ષોના જેવો હતો. કેટલીકવાર

તેમનાં થડ આશરે બે કુટ જડાં હતાં. તેમના થડની રચના જરા વિચિત્ર હતી; કારણ કે, બધાં સામાન્ય વૃક્ષોમાં કાષ્ઠનો માત્ર એકજ નળો હોય છે, પણ પ્રસ્તુત થડમાં કાષ્ઠના એવા ઘણા નળાઓ હાજર હોય છે, અને દરેક નળાની આસપાસ વલ્કલનો ખાસ નળો હોય છે; તેમજ દરેક નળો તેની ખાસ પરિવર્ધિની પેશિની મદદથી જડાઈમાં વધે છે. હંસરાજના થડમાં પણ કાષ્ઠના ઘણા નળાઓ હાજર છે. મુખાલખ હંસરાજના (એકન ફર્ન) પ્રસર્પી (ક્રીપીંગ) થડને કાપી જોવાથી એ વાત ખરાબર સ્પષ્ટ થાય છે. પણ આ જીવશેષભૂત ન્યુરોપ્ટેરિસના થડમાં કાષ્ઠનો દરેક નળો અનહદ જાડો થઈ શકે છે, તેમ હંસરાજમાં બનતું નથી. પ્રસ્તુત જીવશેષનાં પાંદડાંઓનાં મોટાં ફાંટાંઓમાં અનેક વાહિની-રેસાઓ હોય છે, અને તેમની યાંત્રિક રચના પણ મજબૂત છે. આ બે લક્ષણોમાં તે જીવશેષ હાલની તૃણુક્રુમીને મળતું આવે છે. એ રીતે, આ વનસ્પતિઓનાં પૌષ્ટિક અવયવોની રચના બહુજ કિલ્લટ હતી.

ઉપર વર્ણવેલાં બીજ નિઃસંદેહ ન્યુરોપ્ટેરિસ કુટુંબને જ લગતાં છે, અને એવાં ઘણાં બીજની રચના હવે પ્રસિદ્ધ થયેલી હોવાથી એ કુટુંબની જનનેદ્રિયોની રચના પણ વધારે સ્પષ્ટ થયેલી છે. કદ અને રચનામાં, ન્યુરોપ્ટેરિડીનાં બીજ, સામાન્ય રીતે, હાલની તૃણુક્રુમીઓના જેવાંજ હતાં. તેમની અંદર ઠંળીઓ, અને તેમની ઉપર આસપાસ દળદાર ઢાંકણ હતું. એ ઠંળીઓની અંદર બીજક નામની પેશિ હતી અને તેની અંદર ગર્ભ-કોશ હતું. તૃણુક્રુમીની પેઠે બીજકની ટોચ ઉપર

બહુજ સ્પષ્ટ પરાગ-ગૃહ આવેલું હતું. તે બીજમાં વાહિની રેસાઓ પણ હતા. કેટલીક વાહિનીઓ તેના બહારના દળદાર ઢાંકણમાં અને કેટલીક બીજકમાં પથરાયેલી હતી. જો કે તૃણ-દ્રુમી અને આ વનસ્પતિઓનાં બીજ કેટલીક ઝીણી ઝીણી બાબ-તોમાં ભિન્ન છે, તોપણ એકંદરે તેમની વચ્ચે ઘણું સામ્ય છે.

આ કુટુંબનાં બીજને લગતી એક નવાઈ ભરેલી વાત એ છે, કે તેમના પરાગ-ગૃહમાં પરાગકણનું સંપૂર્ણ જતન થયેલું છે. દરેક પરાગ-કણમાં ઘણાં કોષો હાજર હતાં, અને તેમની વચ્ચે વચ્ચે નાનુક દિવાલો હતી. એ દિવાલો તુટી જાય ત્યારે તેઓ બહાર વેરાઈ જતાં હતાં, અને તેમના-માંથી બહાર નીકળી આવતી વસ્તુઓ નકકી ચંચળ શુક્રકોષો હતાં. સ્ત્રુવ તૃણદ્રુમીઓ અથવા દિપાલી પંખડામાં શુક્રકોષો-નું અસ્તિત્વ માત્રમ પડ્યું તે પહેલાં ઘણાં વર્ષો થયાં રેનાલ્ટ નામના શાસ્ત્રીએ પરાગકણનાં આ જીવશેષોની રચના તપાસી તેમાં શુક્રકોષો હોવાનું ભવિષ્ય ભાખ્યું હતું. પરાગકણની આ બહુકોષી રચના પ્રાચીન-જીવયુગનાં બીજનાં ઘણાં કુટુંબોમાં આપણી નજરે આવી છે. તેઓ પૈકી એકે બીજમાં પરાગ-નલિકા ઉત્પન્ન થતી ન હતી, અને એમ સંભવે છે, કે તે સમયે બીજમાં હજી પરાગનલિકા ઉત્ક્રાંત થઈ જ ન હતી. પ્રાચીનજીવયુગની ઉદ્ભિજ્જામાં શુક્રકોષો જાતે જ હલનચલન કરી બીજમાં દાખલ થતાં હતાં, પણ ભવિષ્યમાં તૃણદ્રુમીવના-ઓની બાબતમાં તેમને કેટલેક અંશે પરાગ-નલિકાની મદદ લેવી પડી.

લિન્ગિનોડેન્ડ્રી અને ન્યુરેપ્ટેરિડી ઉપરાત પ્રાચીનજીવયુગમા હસરાજ લાગતી, પણ વન્તુત બીજથી પુનરુત્પત્તિ કરનારી બીજી ઘણી વનસ્પતિઓ હતી. ચેકોપ્ટેરિસ અને એનીમાઇટિસ નામની જે જાતોમા જનનપર્વોની ઉપર ઉગેલા અને એજ સ્થિતિમા દટાયેલા બીજના જીવશેષો આપણે હાથ આગ્યા છે એ બીજનું સ્વરૂપ ગોળ નથી, પણ ચપટું છે. આ લક્ષણ બહુ મહત્વનું છે, કારણકે શકુધારી વનસ્પતિઓને ઘણે અંશે મળતા આવતા પ્રાચીન જીવયુગના હાલકારી કુટુંબને (ગર્ડેઇટી) આ જાખતમા એ જીવશેષો બહુ સમાન છે.

સખીજ હસરાજ સખ ધે આપણું જ્ઞાન હજી બહુ અપૂર્ણ છે, તોપણ આ કુટુંબની શોધને લીધે પ્રાચીનયુગની ઉદ્ભિન્નજ સૃષ્ટિને લગતા આપણા જૂના વિચારોમા અત્યંત ફેરફાર થયો છે. હસરાજના નામથી ઓળખાતી ઘણી ઉદ્ભિન્નજો ખરી હસરાજ ન હતી, પણ તેઓ બીજધારી વનસ્પતિઓ હતી, અને તેથી પ્રાચીન જીવયુગને ‘ પ્રચ્છન્નબીજનો યુગ ’ એવું નામ આપવું યોગ્ય નથી, કારણકે એ યુગમા પ્રચ્છન્નબીજ વનસ્પતિઓ અગ્રગણ્ય ન હતી તે વખતે બીજધારી વનસ્પતિઓ ક્યારનીએ ઉત્પન્ન થઈ હતી અને ઘણે ભાગે તેમની ઉપજાતોની સખ્યા અલિંગોપધારી વનસ્પતિઓના જેટલી જ હતી.

પ્રાચીનજીવયુગમા, મખીજ-હસરાજના (હસરાજ લાગતું પણ વન્તુત બીજધારી) વિશાળ કુટુંબની “ હાજરી

ઉપરથી આપણે શું અનુમાન કરી શકીએ ? અત્યાર મુધી તેઓ હંસરાજ કહેવાતી હતી તે પણ સકારણ હતું. હંસરાજની સાથેનું તેમનું સામ્ય માત્ર બહારના જ દેખાવને લગતું ન હતું. એ બે વનરૂપિ સમૂહોના શરીરની અંતર્ધટના પણ ઘણી બાબતોમાં સમાન હતી; અને પરાગધારી ઇંદ્રિયોના સંબંધે પણ એ વાત નક્કી છે, કે સખીજ હંસરાજનાં પરાગ-કેશને યથાર્થ હંસરાજનાં આલિંગકોપોથી ઓળખી કાઢવાં હજી પણ બહુજ કડણ છે. સખીજ-હંસામાં (સખીજ-હંસરાજને માટે પસંદ કરેલું ટુંકું નામ) બીજ અને પુલ્લિંગ ઇંદ્રિયો બન્ને લગભગ એજ રૂપે રહેલાં સામાન્ય પાંદડાંઓની ઉપર ઉગે છે, અને આ વ્યવસ્થા કેવળ હંસરાજને મળતી આવે છે.

બીજ બાજુએ, તૃણકુમ્ભીવનાઓનો સંબંધ બતાવનારાં લક્ષણો પણ સખીજ-હંસામાં ઓછાં સ્પષ્ટ નથી. બન્ને સમૂહોની શરીરની અંતર્ધટના ઘણે અંગે સમાન છે. એ સામ્ય એટલું બધું આગળ પડતું છે, કે તેમની જનનેંદ્રિયો સંબંધે કાંઈ પણ હકીકત જણાઈ, તે પહેલાં પણ, આપણે તેમની વચ્ચે સંબંધ છે એમ ચોક્કસ કહી શકત. તેથી પણ વધારે અગત્યની વાત એ છે, કે સખીજહંસાનાં બીજ તદ્દન તૃણકુમ્ભીનીજ જાતનાં છે એમ સાબીત થયું છે. પ્રસ્તુતબીજનાં જીવશેષો નામધારી હંસરાજનાંજ છે એમ પ્રસિદ્ધ થયું, ત્યાર પહેલાં, જીવશેષના પ્રાચીન ઉદ્ભવિજ્ઞવેત્તાઓએ કાળજીપૂર્વક સૂક્ષ્મ અવલોકન કરી ઉપરની વાત બહોર કરી હતી, અને એ

શોધ થઈ ત્યારપછી અધ્યાપક એફ. ડબલ્યુ. ચોલીવર અને તેના મિત્રોએ પણ એ વાતને અનુમોદન આપ્યું હતું.

એ રીતે પ્રાચીન જીવયુગના આ વિશાળ વનસ્પતિ-સમૂહમાં હંસરાજ અને તૃણદ્રુમીઓ બન્નેનાં લક્ષણોનો આશ્ચર્યકારક મેળાપ થયેલો છે. આપણે જાણીએ છીએ, કે તે પછીના યુગમાં તૃણદ્રુમીઓનું વિવિધ અને વધારે વિકસિત કુટુંબ આખી પૃથ્વી ઉપર ફેલાઈ ગયું હતું. એ વાત સ્પષ્ટ છે, કે તેઓ સળીજ-હંસામાંથી ઉત્ક્રાંત થઈ, અથવા, સળીજ હંસા તેમની પૂર્વજોની સાથે બહુ જ નિકટનો સંબંધ ધરાવતી હતી. પ્રાચીન જીવયુગના આ અપૂર્ણ ઉલ્લેખોને આધારે ઉત્ક્રાંતિને લગતી જે જે વાતો સ્પષ્ટ થઈ છે. તે ઉપરથી આપણી આવી માન્યતા થાય છે; એ યુગમાં તૃણદ્રુમીવનાઓની ઇત્ક્રાંતિની દશા કેવી હતી, તે સળીજ હંસા વનસ્પતિઓ આપણને જાહેર કરે છે; વળી તેઓ એમ પણ જતાવે છે, કે હંસરાજ અને ણીજધારી વનસ્પતિઓ બન્ને ભૂતકાળમાં એકજ પૂર્વજમાંથી ઉત્પન્ન થઈ છે.

ઉત્ક્રાંતિની ખાળતમાં તૃણદ્રુમી વનસ્પતિઓ આટલી બધી મહત્વની હશે એ વાત આપણે કેવળ હાલની જીવંત ઉદ્ભિજ્જ સૃષ્ટિનાજ અભ્યાસથી સમજી શક્યા ન હોત. એ વિષયના અભ્યાસમાં જીવશેષોનું જ્ઞાન ખાસ જરૂરનું છે. તૃણદ્રુમીવનાઓનું હાલમાં માત્ર એકજ નાનું અને એકલવાયું કુટુંબ હયાત છે, પણ -પૃથ્વીના દરેક ભાગમાંથી પ્રાપ્ત થતાં અસંખ્ય જીવશેષો સાબીત કરે છે, કે

એ વનરૂપિ-સમૂહ મધ્યજીવયુગમાં અગ્રગણ્ય હતો. તેના મળ્યો પૃથ્વીના લગલગ બધા પ્રદેશોમાં પુષ્કળ ઉગતા હતા, અને તે યુગની બધી વનરૂપિઓમાં તેનો વિકાસ સર્વોત્તમ હતો.

પ્રાચીન જીવયુગની ઉદ્ભવિજ્ઞ સૃષ્ટિમાં, તૃણકુમ્ભીના પ્રતિનિધિઓની સંખ્યા, ઘણે ભાગે, મધ્યજીવયુગની તૃણકુમ્ભીવનાઓના જેટલીજ મોટી હતી, અને તેમનો વિકાસ પણ ઉંચી કોટિનો હતો. પણ તેઓ ઉત્ક્રાંતિમાં વધારે આદ્ય હતી, કારણ કે, તૃણકુમ્ભીવનાઓના કરતાં હંસરાજને તેઓ વધારે સમાન હતી. અત્યાર મુઘી પ્રાંત થયેલા પુરાવાને આધારે બધી ભુનિવાસી ઉદ્ભવિજ્ઞોમાં સખીજહંસા અત્યંત પ્રાચીન હોવાનું મિદ્ધ થાય છે.

આપણે પાછળ વિચારી ગયા તે પ્રમાણે એ તૃણકુમ્ભીવનાઓની કોઈક ઉપજાતમાંથીજ ચથાર્થ સપુષ્પ વનરૂપિઓ ઉત્પન્ન થઈ હોય, તો એ વાત સ્પષ્ટ છે, કે ભૂસ્તરવિદ્યાના આખા ઇતિહાસમાં એ વનરૂપિની કોઈ સુખ્ય ભાગ ભજવેલો છે; એટલે મત્સ્યસ્તર યુગથી આગળ સખીજહંસા તરિકે પછીથી તૃણકુમ્ભીવનાઓના સ્વરૂપમાં, અને છેવટે હાલમાં આવૃતખીજના રૂપમાં એ ઉદ્ભવિજ્ઞસમૂહ ચિરંજીવી રહેલો છે.

ઘણે ભાગે કેટલીક સખીજહંસા મધ્યજીવયુગમાં પણ છુટી છવાઈ ઉગતી હતી, પણ તેમના મોટા ભાગની જગા

તૃણદ્રુમીવનાઓએ લીધી હતી; એજ પ્રમાણે તૃતીયયુગની કેટલીક તૃણદ્રુમીઓ આજે પણ છુટીછવાઈ પૃથ્વી ઉપર ઉગે છે, પણ હાલની ઉદ્ભિજ્જનસૃષ્ટિમાં અગ્રગણ્યસ્થાન તો તેમનાથી વધારે ઉચી કોટિની સપુષ્પ વનસ્પતિઓ જ લોગવે છે. દરેક યુગમાં સર્વ સ્થળે પ્રસાર પામેલા વનસ્પતિસમૂહો વાસકરતી એક નાની પણ વધારે વિકાસશીલ શાખાને જન્મ આપ્યો છે, અને આ નાનો ઉદ્ભિજ્જનવર્ગ ભવિષ્યમાં ત્વરિત વિકાસ પામી, તેની જનક ઉદ્ભિજ્જનેને દળાવી દઈ આખી પૃથ્વી ઉપર પ્રસરી ગયેલો છે.

ઉત્કાંતિના ઇતિહાસક્રમને સંપૂર્ણ રીતે આલેખવા આપણે ખરેખર અશક્ત છીએ. દરેક ક્રમની આપણે માત્ર સ્થુળ રૂપરેખા જ આપીએ છીએ.

, બીજધારી વનસ્પતિઓની ઉત્કાંતિના ઇતિહાસમાં જે પ્રકરણો હજી આપણે હાથ ચઢ્યાં નથી: (૧) સખીજ હંસાનું કેવું રૂપાંતર થઈ તૃણદ્રુમીવના વનસ્પતિઓ ઉત્પન્ન થઈ તે જાણવાનું આપણી પાસે કાંઈજ સાધન નથી. સખીજહંસા અને સ્ત્રિલિંગ સાઈકસના જેવી તૃણદ્રુમીની વચ્ચે, ખરેખર, બહુ પહોળો ખાડો પૂરવાનો નથી, અને આપણે જાણીએ છીએ, કે સાઈકસનું કુટુંબ બહુજ પ્રાચીન છે. એ કુટુંબ તો મધ્યજીવયુગના આરંભમાં પણ પૃથ્વી ઉપર અસ્તિત્વ લોગવતું હતું. સખીજ-હંસાના બીજધારી જનનપર્ણને સાઈકસના પાંદડાના જેવા ફલદ-પત્રની સાથે સરખાવવું સહેલ છે, અને બન્નેનાં બીજની રચના લગલગ સમાન છે;

તોપણ, પુલિંગ સાઈકલ અને સળીજહંસાની વચ્ચે બહુજ બેઠ છે. સળીજ હંસાના થડનીજ ઉપર ઉગેલાં, ઇંદ્રિય વિભાગહીન બીજકણુદ્વને કોઈપણ રીતે તૃણકૃમીના શંકુની સાથે સરખાવી શકાય તેમ નથી. પુષ્પહીન સળીજહંસામાં બેનેટ્રિટિનું કિલ્લટ રચનાવાળું ફૂલ કેવી રીતે ઉત્પન્ન થયું તે બાણવા માટે આપણી પાસે કાંઈજ સાધન નથી. દેખાવમાં જનનપણુંના જેવાં લાગતાં બેનેટ્રિટિનાં નરકેસરો અને તેમનાં અસંખ્ય મંયુક્ત પરાગ-કોશો ખરેખર હંસરાજથી ભિન્ન અને સળીજહંસાને વધારે સમાન છે. પણ બેનેટ્રિટિનાં પુષ્પનાં આ અવયવો બહુજ પામે પાસે ઉગેલાં છે, તેમજ તેનાં ફલદપત્રો નાનાં છે અને અંતઃપુરની રચના બહુજ કિલ્લટ છે. આ બન્ને નવાં લક્ષણો છે, અને તેઓ ક્યાંથી અને કેવી રીતે ઉત્પન્ન થયાં તે હજી મુઘી આપણે બાણી શકયા નથી.

વૃદ્ધોરગયુગના ઉપલા ખડકોમાંથી અને ત્રિગુણિતઃ સ્તરક્રમના નીચલા ખડકોમાંથી આપણને માત્ર થોડાંજ વનસ્પતિનાં જીવશેષો મળી આવ્યાં છે, અને ભૂસ્તરવિદ્યાના અભ્યાસમાં તૂટક પ્રકરણો રહેવાનું ખરું કારણ પણ એજ છે. પ્રાચીનજીવયુગ પૂરો થયો તે પહેલાં તૃણકૃમીવનાઓની ઉત્ક્રાંતિની શરૂઆત થયેલી હતી; તોપણ, તેમની જનનેંદ્રિયો મંજાઈ આપણને કાંઈજ માહિતી નથી, અને, બેનેટ્રિટિને લગભગ સર્વાંશે મળતું આવતું તો એકેકે જીવશેષ આ ખડકોમાંથી આપણને હજી મુઘી પ્રાપ્ત થયું નથી. તોપણ, આ સ્થળે હોલિસે ફાઈલમ નામની એક અસાધારણ વનસ્પતિ જાતનું

વણુને કરવું ખાસ જરૂરનું છે. આ પ્રાર્થીન ઉદ્ભિન્નજ્ઞ તૃણદુર્ભીવતાની ઉત્કાંતિનું આદ્ય સ્વરૂપ હોય એમ લાગે છે, અને તે રશિયા અને ક્રાન્સના વૃદ્ધોરગ અને અંગારયુગના ઉપલા ખડકોમાંથી આપણે હાથ થઢી છે. તેનાં પાંદડાં માદાં અને તેમનો આકાર ગોળ હતો. કેટલીકવાર તેઓ આડ ધ્રિય પહોળાં હતાં. તેમની મોટી કળીઓનાં પણ જીવશેષ પ્રાપ્ત થયાં છે, અને તેમની અંદર વગર ખીલેલાં નાનાં પાંદડાંઓ પણ હજી સચવાઈ રહ્યાં છે. એ પાંદડાંઓના વાહિની-રેસાઓની રચના તૃણદુર્ભીઓનાં પાંદડાંઓને જરાબર અનુસરે છે. પ્રત્યુત જીવશેષનાં સામાન્ય પાંદડાંઓની ઉપર નાની કર્ણિકાઓ પણ હાજર છે, અને તેઓ નરકેસરો હોવાનું માનીત થયું છે. આ કર્ણિકાઓ બહુ જાડી છે, દરેક કર્ણિકામાં ઘણી નળાકાર ગખોલો અનુલંબ (વર્ટિકલ) દિશામાં હાજર હોય છે, અને તેઓ મોટા અને કિલ્બટ રચનાવાળા પરાગ-કણથી ભરેલી હોય છે. દરેક કણ અનેક કોષોનો બનેલો છે, અને તેની ઉપર આવેલું ઢાંકણું જ્યારે ખૂલે છે, ત્યારે તે ઉઘાડો થાય છે. આપણે પાછળ વાંચી ગયા કે ન્યુરો-પ્ટેરિડિ નામે સળીજહંસાનું એક કુટુંબ હતું. તેને અત્યંત મજાતી આવતી એક વનસ્પતિ-જાતના બીજના પરાગ-ગૃહમાં ડોલેરોફાઇલમના જેવાં જ પરાગકણ હાજર હતાં. તોપણ આ બીજ ડોલેરોફાઇલમનાં જ હતાં એમ ચોક્કસ કહી શકાતું નથી. તેનાં સાદાં પાંદડાંઓ અને વિચિત્ર રચનાવાળાં નરકેસરો, તેમજ આ નરકેસરોની જ પેશિમાં સંપૂર્ણ દટાયેલાં પરાગકોશો આ વનસ્પતિસમૂહને બધી જાણીતી તૃણદુર્ભી

વનાઓથી કે સળીજહંસાથી લિન્ન પાડે છે. તોપણ એ પાંદડાં અને પરાગકણુ જનનેની વચના એ વનસ્પતિ-સમૂહ તૃણદ્રુમીવના કે સળીજહંસાનો સંબંધી હશે એમ સૂચવે છે. હોલિવેફાઇલમ ઉત્કાંતિની પ્રસિદ્ધ આંકળની અમુક કડી છે એમ કહેવું વ્યાજળી નથી; તોપણ, તે એટલું તો સ્પષ્ટ સૂચવે છે, કે પ્રાચીન જીવયુગના અંતમાં તૃણદ્રુમીવનાઓની ઉત્કાંતિ અનેક દિશાઓમાં આગળ વધતી હતી. વધારેમાં, એ વાત કહેવી ખાસ જરૂરની છે, કે એજ પ્રદોશગ અને અંગારયુગના ખડકોમાંથી કેટલાંક આશ્ચર્યભૂત થડ આપણને મળી આવ્યાં છે, અને તેઓ કેટલીક જાળતોમા લિજિનો- ડેન્ડ્રોન અને તૃણદ્રુમીઓનાં થડની વચલી દશા પ્રગટ કરે છે; તોપણ, આ થડવાળી વનસ્પતિઓમાંથી કોઈ પણ જાણીતી ઉદ્ભિજ્જ ઉત્પન્ન થયેલી જણાતી નથી.

સળીજહંસા અને તૃણદ્રુમીઓ વચ્ચેની જખોલ ભવિષ્યના સંશોધનથી ઘણે ભાગ પૂરાશે. એવાં ઘણાં જીવશેષો શાસ્ત્રીઓની જાણમાં ઘણે ભાગે આવ્યાં પણ હશે, કારણ કે આ વર્ગેની સાંધનારી રૂપાંતરશીલ ઉદ્ભિજ્જોનાં જનનપર્ણોનાં વિવિધ જીવશેષો આપણને પ્રાચીન જીવયુગના ઉપલા અને મધ્યજીવયુગના નીચલા ખડકોમાંથી પ્રાપ્ત થયેલાં છે. આ જનને વર્ગો પરસ્પર નિકટનો સંબંધ ધરાવે છે એ વાત તદ્દન સત્ય છે, તોપણ એ સંબંધની સૂક્ષ્મ જાળતોને સ્પષ્ટ કરવા આપણી ખાસે પૂરતો પુરાવો નથી.

(૨) ણીજધારી વનસ્પતિઓના ઉત્કાંતિને. લગતા

ધૃતિહાસની બીજી બખોલ વધારે ગંભીર છે, અને ભવિષ્યમાં તે પૂરાશે એમ લાગતું નથી. આ બખોલ સખીજ-હંસાના નીચલા ભાગને લગતી છે. સખીજ-હંસા કેવી રીતે અને કઈ હંસરાજમાંથી ઉત્પન્ન થઈ ? આ પ્રશ્નનો ભવિષ્યમાં ખુલાસો થાય એમ લાગતું નથી, કારણકે પૃથ્વીના સૌથી નીચલા ખડકોમાં પણ સખીજહંસાનાં જીવ-શેષો હાજર છે, અને જે ખડકોમાંથી અત્યંત પ્રાચીન ભૂનિ-વામી ઉદ્ભિન્નજો આપણને પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યાંપણ આ વનસ્પતિમૂહૂનાં અવશેષો આપણી નજરે આવે છે. તેમની બાબતમાં પણ સંબંધ બહુજ સ્પષ્ટ છે. દેખાવ, શરીરની અંતર્ઘટના અને પરાગધારી ઇદ્રિયોની રચના હંસરાજ વનસ્પ-તિઓને અત્યંત સમાન છે. સખીજ-હંસાનાં કેટલાંક એવાં પણ જીવશેષો આપણે હાથ આવ્યાં છે, કે જેમના શરીરની અંતર્ઘટના કેવળ હંસરાજને મળતી આવે છે, અને તેમનાં પરાગકોશ ઘણીવાર હંસરાજનાં અલિંગકોષોથી ઓળખી શકાતાં નથી. પણ તેમનાં બીજ ખરી મુશ્કેલી ઉભી કરે છે. સખીજહંસાના બીજની રચના બહુજ ઉંચી જાતની છે, અને પ્રચન્નબીજના અલિંગકોષાગારની સાથે તેઓ બહુજ ઓછો સંબંધ બતાવે છે. આ સ્થળે, બીજ અને અલિંગકોષોની પુનરૂત્પત્તિઓ કઈ કઈ મુખ્ય બાબતોમાં ભિન્ન છે, તે જાણવાની આપણને ખાસ જરૂર છે.

આપણે એક સામાન્ય હંસરાજની પુનરૂત્પત્તિ કેવી રીતે થાય છે તે જોઈએ. જનનપર્ણની ઉપર આવેલાં

અલિંગકોષાગારોમાં (સ્પોરેન્ઝિઆ) ઉત્પન્ન થતાં બધાં અલિંગકોષો એકજ બાતનાં હોય છે. દરેક અલિંગકોષ એક નાનું કોષ છે. તેનું અંકુરીલવન થઈ તેમાંથી, અનુસમાંગ (પ્રોથેલસ) નામની એક સ્વતંત્ર નાની વનસ્પતિ ઉત્પન્ન થાય છે, અને એ નવી વસ્તુની ઉપર કિલ્લટ રચનાવાળાં લિંગકોષો ઉત્પન્ન થાય છે. પરાગકોષક (એન્થિરિડિઅમ) એટલે પુલ્લિંગ ઇન્દ્રિય ગોળ બહુકોષી કોષ છે, અને તેના મધ્ય ભાગમાં આવેલી પેશિમાં ઘણાં શુક્રકોષ ઉત્પન્ન થાય છે; સ્ત્રીકૃષી (આર્કેગોનિઅમ) એટલે સ્ત્રિલિંગ ઇન્દ્રિય પણ બહુકોષી કોષ છે, અને તેનો આકાર નાના ચંબુના જેવો હોય છે. તેને તળીએ અંડ-કોષ હોય છે અને ચંબુના મોં આગળથી એક નળી ઠેઠ અંડ-કોષ મુઘી બાય છે. ફલનના દશ્ય માટે પાણીની ખાસ જરૂર હોય છે, કારણ કે ચંચળ ગતિવાળાં પુલ્લિંગકોષો તેમાં તરી સ્ત્રીકૃષી મુઘી પહોંચે છે. જો આ દશ્યની વખતે પાણી હાજર હોય તો ફલનના કાર્યની જરૂર સિદ્ધિ થાય છે, કારણ કે સ્ત્રીકૃષીમાંથી પણ માલિક એન્ડિડ નામનો એક પદાર્થ પાણીમાં ઝરપે છે અને તેને લીધે શુક્રકોષો સ્ત્રીકૃષી તરફ આકર્ષાય છે, અને સ્ત્રીકૃષીની નળીમાં દાખલ થઈ અંડ-કોષમાં દાખલ થાય છે. ફલીભૂત અંડ-કોષનો વિકાસ થઈ ગર્ભ બને છે અને તેની વૃદ્ધિ થઈ અલિંગકોષધારી હંસરાજ વનસ્પતિ ઉત્પન્ન થાય છે.

વધારે ઉંચી કોટિની અલિંગ કોષધારી વનસ્પતિઓમાં લિંગકોષોનો વિકાસ જરા વહેલો થાય છે, કારણ કે તેમનાં

અલિંગકોષો જ બે જાતનાં હોય છે. પુલિંગકોષોની સંખ્યા મોટી અને તેમનું કદ નાનું હોય છે, અને સ્ત્રિલિંગકોષોની સંખ્યા નાની અને તેમનું કદ બહુ જ મોટું હોય છે. બાગના કૃત્રિમ લીલોતરીના મંડપોમાં ઉગતી હાથાયુડી (સિલેનિ-નેલા), જલવાસી આઈસોઇટિસ અને પિલવર્ટ (પિડ્યુ લેરિઆ) વિગેરે પાણીમાં ઉગતી હંસરાજો એવી ઉદ્ભિન્નજ્ને છે. જલવાસી હંસરાજોમાં, દરેક અલિંગકોષાગારમાં માત્ર એક જ મોટું અલિંગકોષ ઉત્પન્ન થાય છે. એઝોલા નામની જલવાસી હંસરાજમાં અલિંગકોષાગારની આસપાસ એક ખાસ ઢાંકણ હોય છે, અને એ રીતે તે યથાર્થ બીજ કે પુષ્પાંડને ખૂબ મળતું આવે છે.

નાનાં અલિંગકોષોમાંથી ભાગ્યેજ અનુસમાંગ ઉત્પન્ન થાય છે, એ અલિંગકોષમાં માત્ર પરાગકોષક ઉત્પન્ન થાય છે, અને યોગ્યકાળે શુક્રકોષોના રૂપમાં તેઓ તેમાંથી બહાર છટકી આવે છે. સ્ત્રિલિંગ અલિંગકોષમાં ગર્ભની પુષ્ટિને માટે વ્યવસ્થા કરવાની જરૂર છે. એ કોષ હજુ પણ સહેજ મોટા અનુસમાંગને જન્મ આપે છે, પણ તે હવે સ્વતંત્ર વ્યક્તિ નથી, અને તેની ઉપર માત્ર શ્રીક્ષ્મીઓ જ ઉગે છે, વધારેમાં અનુસમાંગ ખોરાકના પદાર્થોનો કોઠાર છે. જે મોટા કોષમાં અનુસમાંગ ઉત્પન્ન થાય છે તેનાથી તે કદાપિ છૂટું પડતું નથી. ધર્મવિભાગ ઉત્પન્ન થઈ બે જાતનાં અલિંગકોષો ઉત્પન્ન થયાં તેથી વનસ્પતિને કેટલાક સ્પષ્ટ લાભ થાય છે. પુલિંગકોષો નાનાં રહેવાથી સહેલાઈથી તેઓ વિખેરાઈ જાય છે અને એક

કોષાગારમાં એવાં ઘણાં કોષોનો સમાવેશ થઈ શકે છે. આ નાનાં અલિંગકોષોમાં અનુસમાંગ તો ઉત્પન્ન થાય છે, પણ તે વસ્તુતઃ ખાદ્ય ઘોડા વિકાસ પામે છે કારણ કે તેની તેમને જરૂર નથી. આ કુદરતની કસકસ છે. મોટા અલિંગકોષમાં તેની જરૂર હોવાથી તેનો અંપૂર્ણ વિકાસ થાય છે; કારણ કે અનુસમાંગની ઉપર ઉગેલા અંડ-કોષમાં ફલનને પરિણામે ઉત્પન્ન થયેલા ગર્ભને તે સારી રીતે પોષે છે.

વિદ્વાન હોર્મિસ્ટરે ઉત્ક્રાંતિક ઉદ્ભિજ્જનવિધાનો આરંભ કર્યો, એ અમયથીજ એવી માન્યતા છે, કે વિજ્ઞાતીય અલિંગ-કોષોની પહેલાં સજ્ઞાતીય અલિંગકોષો ઉત્પન્ન થયાં. જીવશોષોના પુરાવાને આધારે તો એ વાત સ્પષ્ટ છે, કે પ્રાચીન જીવયુગની ઉદ્ભિજ્જન સ્થિતિમાં જન્મે જાતની વનસ્પતિઓ હયાત હતી; તોપણ, ઉપરના સિદ્ધાંતને ઉલટાવવો મુશ્કેલ છે. ભૂસ્તર-વિદ્યાના ઇતિહાસનાં આઘ પ્રકરણોનો, એટલે અત્યંત પ્રાચીન ઉદ્ભિજ્જનોનાં જઘાં અવશોષોનો તદ્દન નાશ થયેલો હોવાથી આ સિદ્ધાંત ખરાબર સાબીત થઈ શકતો નથી.

પુલ્લિંગ અને અલિંગ અલિંગકોષોનો ધર્મવિભાગ ખીજના સાધનથી થતી પુનરુત્પત્તિની ઉત્ક્રાંતિનું પ્રથમ પગલું હતું. પ્રાચીન જીવયુગમાં, જધી સીતાહાર ઉદ્ભિજ્જને (લાઈકોપોડઝ અથવા કલ્પમોસીસ) વિજ્ઞાતીય અલિંગકોષો ઉત્પન્ન કરતી હતી; એજ યુગમાં કેટલીક ખેત વનસ્પતિઓ (કેલેમાઈટિસ, પ્રાચીન જીવયુગનાં અશ્વપુચ્છી વૃક્ષો) પણ

એવાજ ધર્મવિભાગવાળી હતી; પણ એ વાત નવાઈભરેલી છે, કે પ્રાચીન જીવયુગના ખડકોમાંથી વિજ્ઞાતીય અલિંગકોષ-વાળી એકકે હંસરાજ વનસ્પતિ હજી મુઘી આપણને પ્રાપ્ત થઈ નથી.

પ્રચ્છન્નખીજા વનસ્પતિઓની ખાખતમાં, વિજ્ઞાતીય અલિંગકોષોની હાજરી કેટલીક મુશ્કેલીઓ ઉભી કરે છે, અને તેથી પ્રસ્તુત ધર્મવિભાગને લીધે થયેલો લાલ લગલગ ભૂંસાઈ જાય છે, ફલનની સિદ્ધિને માટે, ખન્ને જાતનાં અલિંગકોષોનું અંકુરીભવન પાસે પાસે, અને પૂરતા પાણીની હાજરીમાં થવું જોઈએ. મોટાં અને નાનાં અલિંગકોષોના વજનનું પ્રમાણ ૧૦૦૦ : ૧ છે, તેથી તેઓ પાસે પાસે આવી શકે એવો સંભવ નથી; કારણ કે આવી ભિન્ન વજનવાળી વસ્તુઓ કેવળ પવનના સાધનથી ઉડી આવી એક ખીજાની પાસે ઠરે એ સંભવતું નથી. આ અસંભવિત વાત અવશ્ય અને માટે પુલ્લિંગ નાનાં અલિંગકોષો મોટી સંખ્યામાં ઉત્પન્ન થાય છે, એટલે તેઓ ચૈદ્રી કોઈ પણ એક સ્ત્રિલિંગ કોષની નજદીક આવી જ પહોંચે; તોપણ કુદરતને આ વ્યવસ્થા બહુજ મોંઘી પડે.

પુલ્લિંગ અને સ્ત્રિલિંગ અલિંગકોષોને અચૂક એક ખીજાની પાસે લાવવાની સરસ રીત એ છે, કે સ્ત્રિલિંગ કોષને કોષાગારમાં જ રહેવા દેવાં. એ રીતે, જનક વનસ્પતિના અમુક ભાગમાંજ, પહેલેથી તેમના મેળાપનું સ્થાન નક્કી થઈ

શકે. નાનાં અલિંગકોષોને પકડી, તેમનામાંથી શુક્રકોષો છૂટાં થાય ત્યાં મુધી તેમને અમુક સારી જગાએ રાખી મૂકવા માટે વનસ્પતિઓએ વિવિધ યોજનાઓ ઉત્પન્ન કરી. પુનરૂત્પત્તિની આ કલાને આજે પણ આપણે હાથાયુડીની કેટલીક સજીવ ઉપજતોમાં જોઈ શકીએ છીએ તેમની બાબતમાં, નાનાં અને મોટાં અલિંગકોષો મોટા કોષાગારમાં જ પામેપામે આવે છે, અને નાનાં કોષોમાંથી શુક્રકોષો બહાર આવી મોટાં કોષોમાં મળી જાય છે. એ રીતે મોટાં કોષાગારોમાં જ ફલનનું કાર્ય બને છે. મોટું લિંગકોષ ખરી પડે તે પહેલાં ગર્ભનો વિકાસ પણ થયેલો હોય છે.

મોટું લિંગકોષ કોષાગારમાં જ રહે અને ફલન સંપૂર્ણ થયા પછી તે આખું અવયવ ખરી પડે, એ વાત સામાન્ય રીતે, ખીજના સાધનથી થતી પુનરૂત્પત્તિનું એક ખાસ લક્ષણ છે. કેટલાક મોટું લિંગકોષ અનુસમાંગ ઉત્પન્ન કરે છે, અને જનક વનસ્પતિની ઉપરજ પરાગ-નયન થાય છે, ફલન અને ગર્ભનો વિકાસ પણ વનસ્પતિની ઉપર જ કોષાગારમાં થાય છે, પણ તૃણદ્રુમીઓની બાબતમાં તે આખું અવયવ ખરી પડે ત્યાર પછી જ ગર્ભનો વિકાસ થાય છે. પ્રાચીનજીવયુગના ખીજમાં કદાપિ આપણી નજરે ગર્ભ આવતો નથી, તેથી એમ સંભવે છે, કે ગર્ભનો આખો વિકાસ અને ઘણે ભાગે ફલન પણ (પરાગનયન ફલનની પહેલાં બને છે) ભવિષ્યમાં બનતું હોય, એટલે અંકુરીભવનની ક્રિયાની પહેલાંજ એ દૃશ્યો બનતાં હોય.

મોટાં લિંગકોષને કોષાગારમાંજ રાખવાની રીત ઉપરાંત બીજની એક વિશિષ્ટ ત્રીજી રીત છે; મોટા લિંગકોષના કોષાગારની આસપાસ એક કે વધારે ઢાંકણો હોય છે; એઓલા નામની જલ-હંસરાજની બાળતમા હજુ પણ એવીજ રચના છે. બીજનાં ઢાંકણોનું સ્વરૂપ શંકાશીલ હોવાથી આપણે એ પ્રશ્ન સંબંધે ઉદ્ધાપોહ કરીશું નહિં. એ ઢાંકણને હંસરાજના અલિંગકોષાગારના આવરણની સાથે સારી રીતે સરખાવી શકાય; એ આવરણ બહુ જ પાતળું હોય છે, અને ઘણીવાર તેમાં માત્ર એકજ અલિંગકોષાગાર હોય છે. ગમે તેમ હો, પણ ઢાંકણ પુષ્પાંડ કે બીજનો ખાસ ભાગ છે. એ રીતે, બીજ કેવળ મોટું લિંગકોષાગાર છે એમ નહિં, પણ તે મોટું લિંગકોષાગાર હોવા ઉપરાંત કાંઈક વધારે છે. વિવૃતબીજ વનસ્પતિઓના બાલક બીજ, એટલે પુષ્પાંડમાં, તેના આવરણોએ ખૂલ્લું રાખેલું દ્વાર પરાગકણને મેળવે છે, અને આવૃતબીજ-ઓનાં બીજમાં તેજ દ્વાર પરાગનલિકાને બીજ મુઘી પહોંચવાને રસ્તો આપે છે.

હવે આપણે સખીજહંસાનાં બીજ વિષે વિચાર કરીએ. તેઓ યદ્યર્થ બીજ છે, કારણ કે તેઓ મોટા લિંગકોષને હમેશાં બીજકમાં રાખી મૂકે છે, બીજક મોટા લિંગકોષનું આગાર (ઘર) છે, અને બીજકની આસપાસ એક કે વધારે ઢાંકણ હોય છે; તેના બધા ભાગોની રચના બહુજ ઉંચી જાતની હોય છે, અને તે તૃણદ્રુમીના બીજને લગભગ સંપૂર્ણ રીતે મળતી આવે છે; અને આ બન્ને વર્ગનાં પ્રાચીન બીજ પ્રચલ્લ બીજના

અલિંગકોષાગારોને કોઈ પણ રીતે સમાન નથી. એ વાત સત્ય છે, કે સિલિંગનોડેન્ડોનના બીજમાં પરાગ-ગૃહનો ઉપલોભાગ બીજના ઢાંકણોથી જરા બહાર નીકળી આવેલો હતો, અને પરાગકણ દ્વારકને બાબુ ઉપર મૂકી બારોબાર તેમાં દાખલ થતો હતો. બીજની આ રચના આદ્ય હશે, પણ સખીજહંસાના બીજમાં તે સામાન્યતઃ ગેરહાજર છે. ગ્રાચીનજીવયુગનાં બીજનું ખાસ અગત્યનું લક્ષણ એ છે, કે તેમાં ગર્ભની હાજરી હોતી નથી. એ ઉપરથી એમ સમજાય છે, કે ઉત્પન્ન થનારી નવી બાળક વનસ્પતિને પુષ્ટિ આપવાનું કામ તેસમયે બીજનું ન હતું. અને કામ તેણે આગળ ઉપર પોતાને માથે લઈ લીધું.

બીજ બધી બાબતોમાં, સખીજહંસાનાં બીજ યથાર્થ બીજ હતાં. સિલિંગ અલિંગ કોષાગારમાંથી તેઓ ઉત્પન્ન થયાં ત્યારથી તેમની ઉત્ક્રાંતિની વિવિધ દશાઓ હજી આપણે શોધી કાઢવાની છે. કેટલીક સીતાહાર વનસ્પતિઓના આશ્ચર્યકારક બીજની રચના એ દશાઓનું સ્વરૂપ સમજવામાં આપણને બહુ ઉપયોગી થશે, પણ આ પ્રશ્ન વિષે આપણે ૬ ઠા પ્રકરણમાં વિચાર કરીશું.

સખીજહંસાનું બીજ બહુજ ઉચીકોટિનું હતું, તોપણ એ વનસ્પતિઓ બીજધારી ઉદ્ભવિજ્જોની ઉત્ક્રાંતિની આદ્ય દશા હતી એમ માનવા ઠાંધ જ વાંધો નથી. તોપણ, આપણે એમ સમજવાનું નથી, કે સખીજહંસા ગ્રાચીન જીવયુગની ઉદ્ભવિજ્જોસૃષ્ટિમાં ઉત્ક્રાંતિની ઉચામાંઉચી દશા હતી.

સખીજહંસાની શોધ થઈ ત્યાર પહેલાં એજ યુગનો એક ખીજો વનસ્પતિસમૂહ શાસ્ત્રીઓની નજરે પડ્યો હતો. સખીજહંસાથી પણ વધારે ઉત્કાંતિ થયેલો તે સમૂહ ભવિ-
ધ્યની શંકુધારી વનસ્પતિઓની સ્પર્ધા કરતો હતો. આ સમૂહ
હૃદાકારી ઉદ્ભિજ્જનેનું કુટુંબ હતું. એજ કુટુંબની એક
હૃદાકૃતિ (કોર્ટેઈટસ) નામની નમુનારૂપ જાત છે, અને તેના
વિષે આપણને સંપૂર્ણ માહિતી મળેલી છે. ૩૦ વર્ષ ઉપર
એન્ડયુરિ અને રેનોઈટે ખનુજ મહેનત કરી એ ઉદ્ભિજ્જનનાં
છૂટાં છવાયાં તૂટક જીવશેષોનો અભ્યાસ કર્યો અને એ રીતે
મેળવેલી માહિતીને તેણે પદ્ધતિસર ગોઠવી આ વનસ્પતિના
જીવન-ઇતિહાસને સંપૂર્ણ બનાવ્યો. ત્યાર પછી, તેના વિષે
આપણને બહુ વધારે માહિતી મળી નથી.

આ વિશાળ કુટુંબના જીવશેષો મત્સ્યસ્તરયુગના
ખડકોમાંથી પણ આપણે હાથ આવે છે. તેનાં થડ લગભગ ૧૦૦
કુટ ઉંચાં વધતાં હતાં, અને તેમને પુષ્કળ ડાળીઓ ફૂટેલી
હતી. આ ડાળીઓની ઉપર ઉગેલાં પાંદડાં સાંકડાં અને
કેટલીકવાર આશરે ૩ કુટ લાંબાં હતાં. આ થડ ઉંચાં અને
ઉંચાં જમીનમાં દટાઈ ગયેલાં છે, અને તેમનાં ડુંકાં હજી
પણ એજ સ્થિતિમાં આપણે હાથ આવે છે. આ વૃક્ષોનો
સામાન્ય દેખાવ દક્ષિણ ગોળાર્ધની કેટલીક શંકુધારી વનસ્પ-
તિઓના જેવોજ હતો. ન્યુઝીલેન્ડમાં ઉગતાં કૉરિપાઈન
દેખાવમાં એ વૃક્ષોને ઘણાંજ મળતાં આવે છે. કેટલાંક શંકુધારી
વૃક્ષોનાં પાંદડાં ૬ કે ૭ ઇંચ લાંબાં અને ૨ ઇંચ પહોળાં છે.

કેઈ પણ સજીવ શંકુધારીનું પાંદડું આથી વધારે મોટું નથી. હૃદાકૃતિનાં થડની રચના પણ દક્ષિણ-ગોળાર્ધના એ શંકુધારી કુટુંબનાં થડને મળતી આવે છે; માત્ર હૃદાકૃતિના થડનો ગર બહુજ મોટો હતો, અને તેની ગોડવણી અખરોટ વૃક્ષના ગરના જેવી હતી. ખીણ બાબુએ, તેમનાં મોટાં પાંદડાંઓની ઘટના ઝેમિઆ વિગેરે તૃણદ્રુમીઓની પાંદડીઓને આબેહુણ સમાન હતી.

પૌષ્ટિક અવયવોની પેઠે જનનેંદ્રિયો પણ ઘણી બાબતોમાં સખીજહંસાથી વધારે ઉત્ક્રાંત થયેલી છે. આપણે પાછળ જોઈ ગયા કે સખીજહંસાની જનનેંદ્રિયો હંસરાજની જનનેંદ્રિયોથી વધારે ક્લિષ્ટ હતી, અને તોપણ તે હંસરાજને ઘણી રીતે સમાન હતી. સખીજહંસાનાં ખીજ અને પરાગકોશ બન્ને જનનચણ્વીનીજ ઉપર અથવા જનનપર્ણના અમુક ભાગ ઉપર ઉગતાં હતાં, અને આ ભાગ તેની સામાન્ય પાંદડીઓથી માત્ર સહેજ ભિન્ન હતો. હૃદાકૃતિ આ બાબતમાં સખીજહંસાથી પણ આગળ વધેલી હતી. તેની જનનેંદ્રિયોએ શંકુઓનું રૂપ ધારણ કર્યું હતું, અને હાલની શંકુધારી વનસ્પતિઓની પેઠે એ વસ્તુઓ સામાન્ય ડાળીઓથી તદ્દન ભિન્ન હતી.

પુલ્લિંગ શંકુઓ સંખ્યા બંધ ઉગતા હતા અને તેમના નરકેસરોનું જતન ભીંગડાંઓથી થતું હતું. દરેક નરતંતુ એક લાંબા દીંટાળે બનેલો હતો, અને તેને છેડે ૪ કે ૬ લાંબાં પરા-

ગકોશો ટટાર ઉગેલાં હતાં. કુમારિકાકેશી વૃક્ષના પુલ્લિંગ-
શંકુઓની સાથે તેમને સારી રીતે સરખાવી શકાય. કુમારિકાકેશી
વૃક્ષમાં, નરકેસરો એવાંજ હોય છે, અને દરેકની ટોચ ઉપર જે
પરાગકોશ ઉગેલાં હોય છે, પણ તેઓ ટટાર રહેવાને બદલે
નીચે લટકતાં રહે છે. તૃતીય યુગના ઉત્તરાર્ધમાં કેટલીકવાર એ
વૃક્ષના નરકેસરને ૩ કે ૪ પરાગકોશ હતાં, અને મધ્યજીવ-
યુગનાં કુમારિકાકેશી વૃક્ષોની બાબતમાં તો તેમની સંખ્યા એથી
પણ વધારે હતી. તોપણ નરકેસરોની સાથે ભીંગડાંઓની
હાજરી તો કેવળ હૃદાકૃતિ વનસ્પતિઓમાં જ હોય છે.

બહારના દેખાવમાં સિલિંગ જનનેન્દ્રિયો પુલ્લિંગ અવ-
યવોથી જરા ભિન્ન હતી. પુષ્પાંડની સંખ્યા થોડી હતી, અને
દરેક પુષ્પાંડ એક દૂંકા દીંટાને છેડે ભીંગડાંઓની વચ્ચે ઉગેલું
હતું. એ બહુ જ સદ્ભાગ્યની વાત છે કે પુષ્પાંડ અને વધારે
પાકેલાં બીજ બન્ને પૃથ્વીના ખડકોમાં બહુજ સારી રીતે સચ-
વાયેલાં છે. આ બીજમાં પરાગ-ગૃહનો સારો વિકાસ થયેલો છે,
અને તેમાં પડેલાં પરાગકણ હજી પણ આપણી નજરે આવે છે.
પરાગકણની રચના બહુકોપી છે એવું સ્પષ્ટ કરનાર પ્રથમ
જીવશ્રેષ્ઠ હૃદાકૃતિ ઉદ્દલિન્ગજનું હતું. તેનાં પુષ્પાંડ અને બીજ
થોડાજ સમય ઉપરની તૃણકૃમી વનસ્પતિઓનાં એ અંગોને
લગભગ સર્વાંશે સમાન હતાં, અને સખીજહંસાનાં કેટલાંક
બીજથી તેઓ સહેજ ભિન્ન હતાં. હૃદાકૃતિનું બીજ ચપટું
હતું, અને સખીજહંસાનાં કેટલાંક સભ્યોનાં બીજ પણ ચપટાં
હતાં. હૃદાકૃતિનાં અને સખીજહંસાનાં બીજને એકમેકથી

આજે ઓળખી કાઢવાં સહેલ નથી. આ વાત અગત્યની છે, કારણ કે આ મહાન્ વૃક્ષો ઘણી બાબતોમાં સખીજહંસાથી સહેજ લિન્ન છે. હૃદાકૃતિના અને લિન્નિનોડેન્ડન જેવી સખીજહંસાના થડને સાંધનારી પ્રાચીન જીવયુગના થડની સંપૂર્ણ પરંપરા આપણને પ્રાપ્ત થઈ છે, પણ હૃદાકૃતિનાં સાદાં પાંદડાં તૃણદુમ્બીનાં પાંદડાંને વધારે મળતાં આવે છે. એકંદરે એ વાત સ્પષ્ટ છે, કે હૃદાકારી વનસ્પતિઓ સખીજહંસા અને તૃણદુમ્બીવનાઓના ઉત્ક્રાંતિ-ક્રમની સાથે સંબંધ ધરાવે છે. આવી ઉંચી કોટિની બીજધારી વનસ્પતિઓની આટલી બધી પ્રાચીનતા અરેખર બહુ જ આશ્ચર્યકારક છે. સખીજહંસાની સાથેનો તેમનો સંબંધ એથી પણ વધારે પ્રાચીન હોયો જોઈએ, એટલે એ સંબંધનું મૂળ વધારે પ્રાચીન નહિં તો બદ્ધે મત્સ્યસ્તર યુગના પૂર્વાર્ધમાં તો હોવું જ જોઈએ.

હવે એ વાત સ્પષ્ટ થઈ, કે પ્રાચીન જીવયુગમાં બીજધારી ઉદ્ભવિજ્જોતા બદ્ધે એ મહાન્ વર્ગો હાજર હતા, અને ભુનિવાસી વનસ્પતિ સૃષ્ટિનાં અત્યંત, પ્રાચીન જીવશોષોમાં પણ એ બંને વર્ગોના સદ્યો આપણને મળી આવે છે. એક બાબતુએ, આ બે વર્ગો પૈકી સખીજહંસાનું વધારે વિશાળ કુટુંબ હતું. આ વનસ્પતિઓ હંસરાજનાં ઘણાં લક્ષણોને કાયમ રાખી ઉંચી કોટિનું બીજ ઉત્પન્ન કરતી હતી. બીજ બાબતુએ હૃદાકારી ઉદ્ભવિજ્જોતું કુટુંબ હતું. તેઓ 'બીજની બાબતનાં સખીજહંસાને સમાન હતી, પણ બીજ-બધી બાબતોમાં તેઓ વધારે ઉત્ક્રાંત થયેલી હતી. જ્યારે હૃદાકારી

વનસ્પતિઓ પ્રથમ પ્રસિદ્ધિમાં આવી ત્યારે ક્રાન્સના એપોર્ટા નામના પ્રાચીન ઉદ્ભવિજ્ઞાતાએ શોધી કાઢ્યું, કે તેમની જન નેંદ્રિયોની રચના શંકુધારી ઉદ્ભવિજ્ઞાનોનાં એ અવયવોથી પણ વધારે ઉંચી જાતની હતી. પણ તેમનાથી તેઓ લિન્ન અને વધારે આદ્ય હતાં અને એ વનસ્પતિઓ લવિધ્યમાં નાશને જ પાત્ર હતી.

પ્રાચીન જીવયુગના આ મહાન્ વનસ્પતિસમૂહનું શું થયું એ અગત્યનો પ્રશ્ન છે. તેઓ ખરેખર નાશ પામી કે તેમના કોઈ વંશજો આજે હયાત છે ? જે સ્વરૂપમાં આપણે તેમને ઓળખીએ છીએ, તે સ્વરૂપમાં તે ખરેખર તેમનો નાશ થયો છે, પણ એ નાશ બહુ જ ધીમે હતો, કારણ કે મધ્ય જીવયુગના ખડકોમાંથી પણ તેમનાં જીવશેષો આપણે હાથ આવે છે.

તેમનો પાસેમાં પાસેનો વંશ જ નહીં કુમારિકાકેશી વૃક્ષ છે. ઘણાં લક્ષણોમાં તે હંદાકારી વનસ્પતિઓને મળતું આવે છે. પુલ્લિંગ અને સ્ત્રિલિંગ બન્ને જનનેંદ્રિયોની રચના અને તેના આલુના જેવા બીજનાં ઉપાંગોની ગોઠવણી ઉભય હંદાકારીનાં એ અવયવોને લગલગ સંપૂર્ણ રીતે સમાન હતી. મધ્યજીવયુગમાં બહુ જ પ્રસાર પામેલું કુમારિકાકેશીનું કુટુંબ ઘણે ભાગે આ હંદાકારી વનસ્પતિઓમાંથી પ્રત્યક્ષ રીતે ઉત્પન્ન થયેલું નથી, પણ એજ મહાન્ વર્ગની કોઈ બીજી શાખામાંથી નહીં તેનો જન્મ થયેલો છે.

હુદાકારી અને શંકુધારી ઉદ્દલિન્નજોના સંબંધને લગતો પ્રશ્ન વધારે અગત્યનો અને કઠણ છે. સામાન્ય રીતે વિદ્વાન્ સેપોર્ટાની માન્યતા સત્ય હતી. આ બે ઉદ્દલિન્ન-વર્ગો પરસ્પર ભિન્ન છે, અને એ વાત, મુખ્યત્વે, હુદાકારીનાં બીજ બરાબર સ્પષ્ટ કરે છે. તેઓ શંકુધારીનાં નહિ, પણ તૃણદુર્મીનાં બીજને સમાન છે. બીજ બાબુએ, કાષ્ઠની રચના અને દેખાવમાં હુદાકારી ઉદ્દલિન્નજો બીજ કોઈ પણ વનસ્પતિઓના કરતાં પીતદ્રુ શંકુધારીઓને (એટલે મંકી-પઝલ અને કૌરિપાઇનના કુટુંબને) વધારે મળતી આવે છે. પીતદ્રુનાં નરકેસરોને અનેક લાંબાં પરાગકોશ હોય છે, અને આ બાબતમાં તેઓ પ્રાચીનજીવયુગના એ કુટુંબને કેટલેક અંશે સમાન છે. આ બન્ને વર્ગોની મંપૂર્ણ સરખામણી ઘણો સમય લેશે; તોપણ આ બન્ને વર્ગોની વચ્ચે એટલું બધું સામ્ય છે, કે તેમની વચ્ચે યથાર્થ સંબંધ હોવાની વાત લગભગ નક્કી છે. જે વિદ્વાનોએ હુદાકારી વનસ્પતિઓ સંબંધે આપણને પ્રથમ માહિતી આપી તેમનું પણ એવુંજ માનવું હતું. શંકુધારી ઉદ્દલિન્નજો જ પ્રથમ પ્રાચીનજીવયુગના ઉત્તરાર્ધમાં ઉત્પન્ન થઈ, અને વૃદ્ધોરગ યુગના ખડકોમાંથી હાથ આવેલી તેમની અત્યંત પ્રાચીન પ્રતિનિધિ વૉલ્ફીઆ ઘણે ભાગે પીતદ્રુના કુટુંબની સભ્ય હતી. વધારે વ્યાજબી માન્યતા તો એ છે, કે હુદાકારીનું કુટુંબ જે મહાન્ વર્ગનું સભ્ય છે, તેજ વર્ગના કોઈ અન્ય કુટુંબમાંથી શંકુધારી ઉદ્દલિન્નજો ઉત્પન્ન થઈ.

એક સમયે પ્રાચીનજીવયુગને શાસ્ત્રીઓ પ્રચન્નબીજને

યુગ કહેતા હતા. અંગારયુગનાં વિશાળ જંગલોને આપણે જોઈએ છીએ ત્યારે આ નામ યથાર્થ છે એમ આપણને લાગે છે. એ યુગની ઉદ્ભિન્નજ્ઞ સૃષ્ટિનો દેખાવ વનસ્પતિક ઉદ્યાનના (બોટેનિકલ ગાર્ડન) કૃત્રિમ ગરમ-મંડપમાં ઉગેલી હંસરાજોના જેવો હશે, કારણકે એ સમયે હંસરાજ અને તેના કુટુંબીઓથી જ પૃથ્વીનું પૃષ્ઠ છવાઈ ગયેલું હતું.

તોપણ, એ યુગની ઉદ્ભિન્નજ્ઞસૃષ્ટિમાં બધી વનસ્પતિઓથી જૂદો પડતો હૃદાકારી નામનો એક પ્રાચીન વનસ્પતિ-સમૂહ હાજર હતો. તેનાં મોટાં વૃક્ષોએ પ્રચ્છન્નખીજનાં બધાં લક્ષણોનો ક્યારનોયે ત્યાગ કરેલો હતો, અને તેઓ ઉંચી કોટિનાં ખીજધારી વૃક્ષોનાં બધાં લક્ષણો પ્રગટ કરતાં હતાં.

એ સિવાયની બાકીની ઉદ્ભિન્નજ્ઞસૃષ્ટિ હંસરાજનાં જેવી લાગતી વનસ્પતિઓથી ભરેલી હતી. તેમની ઘણી ઉપ-જાતો હતી, અને તેઓ જંગલોમાં જ્યાં ત્યાં ઉગી નીકળેલી હતી. કેટલીકવાર તો તેઓ વૃક્ષોના જેટલી ઉંચી વધતી હતી. આ ‘હંસરાજના’ મોટા ભાગનું બાહ્ય સ્વરૂપ સામાન્ય પ્રેક્ષકને ભૂલ ખવરાવે એવું હતું, પણ યથાર્થ રીતે તેમનાં જનનપર્ણોની ઉપર હંસરાજની પેઠે અલિંગકોષાગારો નહિ, પણ હૃદાકારીના જેવાંજ વાસ્તવિક ખીજ ઉત્પન્ન થતાં હતાં.

પ્રાચીનજીવયુગની આ બે મહાન્ ખીજધારી કોમો પૈકી વધારે ઉત્ક્રાંત થયેલી હૃદાકારી ઉદ્ભિન્નજ્ઞે શંકુધારી ઉદ્ભિન્નજ્ઞેથી વધારે પ્રાચીન અને આદ્ય હતી એમ લાગે છે, તોપણ

હૃદયકારીનું કુટુંબ શંકુધારીનું સાક્ષાત્ પૂર્વજ નથી એ વાત નક્કી છે. હંજરાજના જેવી લાગતી સળીજહંસાની લવિષ્યની સંતતિ વધારે લાંબી અને ચિરંજીવી હતી; કારણકે પ્રથમ તેમાંથી મધ્યજીવયુગની અત્યંત વિસ્તાર પામેલી તૃણક્રુમી-વનાઓ ઉત્પન્ન થઈ, અને લવિષ્યમાં તેઓ હાલની યથાર્થ સપુષ્પ વનસ્પતિઓની પૂર્વજ બની. પૃથ્વીની ઉદ્ભિન્ન-સૃષ્ટિમાં આટલા બધા લાંબા સમયથી સપુષ્પ વનસ્પતિઓએ કેવો મહત્વનો એક મુખ્ય ભાગ ભજવ્યો છે તે આપણે હમણાં જ પાછળ વાંચી ગયા.

પ્રકરણ ૫ મું.



વધારે ઉંચી કોટિની અલિંગકોષધારી ઉદ્ભિન્નજોની
ઉત્ક્રાંતિ-હંસરાજ વનસ્પતિઓ.

અત્યાર સુધી આપણે ખીજધારી વનસ્પતિઓની ઉત્ક્રાંતિ વિષે વિચાર કર્યો. એ પ્રશ્ન બહુજ અગત્યનો હતો, કારણ કે પૃથ્વીની હાલની ઉદ્ભિન્નજન્યુષ્ટિમાં એ વનસ્પતિઓ ઉંચામાં ઉંચી કોટિની, અને બહુજ અગત્યની છે. આપણે એવા નિર્ણય ઉપર આવ્યા છીએ, કે બહુજ પ્રાચીન કાળમાં, એટલે, મત્સ્યસ્તર યુગના આરંભમાં કે કદાપિ તેથી પણ વધારે ભૂતકાળમાં અલિંગકોષધારી હંસરાજ વનસ્પતિઓના પૂર્વજમાંથી ખીજધારી ઉદ્ભિન્નજો ઉત્ક્રાંત થઈ.

અલિંગકોષધારી ઉદ્ભિન્નજોને લિનિયસે પ્રચન્ન-ખીજ એવું નામ આપ્યું છે, કારણ કે તે સમયના શાસ્ત્રીઓની એવી માન્યતા હતી, કે આ વનસ્પતિઓની લિંગી પુનરુત્પત્તિ ગુપ્ત છે. હવે એ સ્વરૂપ પ્રસિદ્ધ થયું છે, હવે એ સ્વરૂપ પ્રસિદ્ધ થયું છે, તેપણ તેમનું જૂનું નામ રૂઢ થયેલું હોવાથી કાયમ રહ્યું છે. અલિંગકોષધારી ઉદ્ભિન્નજો આજે પણ પૃથ્વી ઉપર પુષ્કળ ઉગે છે. એ વર્ગની બધી વનસ્પતિઓ વિષે વિચાર કરવો અશક્ય છે, પણ આ મહાન્ વર્ગનાં જે કુટુંબોનો પૂરતો હેવાલ આપણને પ્રાપ્ત થયો છે,

માત્ર તેજ કુટુંબો એટલે બીજાધારી વનસ્પતિઓના નજીકના મળધી ઉચી ડોટિના અલિગઢોપધારી કુટુંબોનીજ ઉત્ક્રાંતિને આપણે અનુમતિશુ તેઓ બે રોતે મહત્વના છે બીજાધારી ઉલ્લિન્તોની સાથે તેઓ નિકટનો મળધ ધરાવે છે, અને એ ધેંકી ડેટલાક કુટુંબો, ભૂતરવિદ્યાના અત્યંત ભૂતકાળમા, તેમના હાવના વશનેથી પણ વધારે વિકાસ પામેલા હતા, તેથી તેમના ભૂતકાળનો ઇતિહાસ બહુજ રમુજ અને અગત્યનો છે

ઉચીકોટિની અલિગઢોપધારી ઉલ્લિન્તોનું સ્વરૂપ દૂકામા આ પ્રમાણે છે તેમનો જીવનક્રમ લિંગી અને અલિંગી વ્યક્તિઓની અવારનવાર નિયમિત પરપરાનો બનેલો છે, લિંગી અવયવોને ઉત્પન્ન કરનારી વ્યક્તિ હમેશા માત્રી અને નાની હોય છે (અનુમમાગ), અને અલિગઢોપોને ઉત્પન્ન કરનારી વ્યક્તિ વધારે મોટી અને વિશેષ વિકસિત હોય છે, આમાન્યત આ વધારે વિકસેલી વ્યક્તિને જ અલિગઢોપધારી વનસ્પતિ તરિકે ઓળખીએ ડીએ એ રીતે હમરાજ, સીતાહાર કે અવધુચ્છી વનસ્પતિ કેવળ અલિંગી છે, અને તેના બધા અલિગઢોપો એકજ જાતના હોય છે તેમની લિંગી પેઢિ એટલે અનુમમાગ પરગઢોપક અને ઝીકપી ઉત્પન્ન કરે છે, અને તે બહુ જ નાની વસ્તુ હોવાથી ઘણા લોકો તેને કદાપિ જોઈ શકતા નથી, તેઓ તો અલિંગી પેઢિને જ વનસ્પતિ તરિકે ઓળખે છે દાખલા તરિકે, સીતાહાર અને મર્પણ્ચ્છી (એડમંટ ગ્સ)

ઉદ્દલિન્ત્તેની બાળતમા, તેમની લિંગી વ્યક્તિ શાસ્ત્રીઓને માત્ર ૨૫-૩૦ વર્ષ ઉપર જ અપ્પટ થઈ

જળ-હ સરાજ, હાથાયુડી, અને મીતાહારની મિત્ર આઈસોઈટિસ વિગેરે વધારે ઉચી કોટિની પ્રચન્ન-બીજ વનસ્પતિઓમા તેમની સામાન્ય વ્યક્તિઓની જ ઉપર, કાઈક અશે, લિંગવિભાગ પ્રગટ થયેલો જણાય છે, કારણ કે તેમના અલિંગકોષો બે જાતના હોય છે તેમની બાળતમા, પેઠિ ઓની અવારનવાર પરપરા કાઈક અપ્રમિદ્ધ રહે છે, કારણકે પુલ્લિંગ કોષોની અનુસમાગ જરા પણ વિઝમતી નથી, અને અલિંગ અનુસમાગ વિકસી મોટી થાય છે, તોપણ તે મોટા અલિંગકોષમા જ સમાઈ રહે છે આપણે પાછળ જોઈ ગયા, કે બીજધારી વનસ્પતિઓમા, આ લિંગી વ્યક્તિ આથી પણ વધારે કૃશ બનેલી છે એ વનસ્પતિઓમા અલિંગ અનુસમાગ અને તેનું મોટું અલિંગકોષ બન્ને હમેશને માટે પુષ્પાડ કે બીજમા બીડાયેલા જ રહે છે વધારેમા આ બે લિન્ન જાતના અલિંગકોષોને ઉત્પન્ન કરનારી ડ્રિયો-એક બાબુએ, પરાગકોશધારી નરકેસરો, અને બીજ બાબુએ પુષ્પાડધારી ફલદ-પત્રો-પરસ્પર એટલી બધી લિન્ન છે, એટલે, તેમની બાળતમા ધર્મવિભાગ એટલી બધી ઉચી જાતનો છે, કે સામાન્ય રીતે તેમને અનુક્રમે પુલ્લિંગ અને અલિંગ જનને દ્રિયો એવા નામ આપણે આપવા પડ્યા છે

હવે, જે ઉચી કોટિની અલિંગકોષધારી ઉદ્દલિન્ત્તેમા

પેઢિઓની અવારનવાર પગ પગ વધાવે સ્પષ્ટ છે, તેમની તરફ આપણે ફગીથી વ્યાન આપીએ પૃથ્વીની હાલની ઉદ્ભિન્ન સ્થિતિમાં તેમની ત્રણ પ્રતિનિધિઓ હયાત છે હંમરાજ, સીતાહાર અને અશ્વપુરછી

મર્વ કોઈ હંસગજ વનમ્પતિથી પરિચિત છે થડના કરતા તેનું પાદડું ગ્રેમાણમાં બહુજ મોટું હોય છે પાદડું હંમરાજનું આદર્શ ઉપ અવયવ છે તેના સામાન્ય જનનપણોની ઉપર (પાછલી બાજુએ) કે કેટલીકવાર તેના ખાસ જનનપણોની ઉપર કે ઘણીવાર તેની પાદડીઓની ઉપર અમુક અલિગડોપાગારો ઉગેલા હોય છે પણ હંસરાજને કદાપિ શકું ઉગતો નથી ઘણી હંમરાજને માત્ર એકજ જાતના અલિગડોપો હોય છે કેવળ જળ-હંસરાજના નાના કુટુંબને જ બે જાતના અલિગડોપો ઉગે છે

સીતાહાર વનમ્પતિઓ હંમરાજથી સહેજ ભિન્ન છે, તેમના પાદડા નાના સાદા અને ઘણા હોય છે, અને તેઓ સામાન્ય રીતે ડાગીઓવાળા થડની ઉપર ઉગે છે તેમના સામાન્ય દેખાવ વિશાળ વીંચ વનમ્પતિને મળતો આવે છે આદ્યસોદ્યોત્સની જાત આ વાતનો મુખ્ય અપવાદ છે આ વનમ્પતિ સીતાહાર કુટુંબની છે, અને ઘણે લાગે તે પાણીમાં જ વને છે તેનું થડ બહુ જ ટૂંકું અને પાદડા લાંબા અને સાદા હોય છે દરેક પાદડાની ઉપર માત્ર એકજ અલિગડોપાગાર ઉગેલું હોય છે, અને ઘણે લાગે તે તેના ઉપલા પૃષ્ઠ ઉપર વળગેલું હોય છે, કેટલીક વાર તે થડ અને પાદડાનું તીકું જે

સ્થળે સંધાયેલાં હોય છે ત્યાજ ખૂણામાં ઉત્પન્ન થાય છે. કેટલીકવાર અલિંગકોષાગારવાળા પત્રો આમાન્ય પાંદડાં હોય છે; પણ ઘણીવાર તેઓ ખાસ બીજકણુદ્ભવ (સ્પોરોફિટ્સ) હોય છે, અને ત્યારે તેઓ શંકુના જેવો દેખાવ આપે છે. આ કુટુંબની ઘણી વનસ્પતિઓની ઉપર કેવળ એકજ જાતનાં અલિંગકોષ હોય છે, પણ ઘણી ઉદ્ભિન્નજ્ઞેને તો બે જાતનાં એટલે નાના અને મોટાં અલિંગકોષો હોય છે અને તેમની બાળતમા સહેજ ધર્મવિભાગ પણ ઉત્પન્ન થયેલો છે. લાઘકોષોડિઅમ અને ફાઇલોગ્લોસમ પહેલી જાતનાં, અને હાથાયુડી અને આઇસોઇટિસ બીજી જાતનાં દેખાતાં છે.

અશ્વપુચ્છી વનસ્પતિઓ આ જાતને વર્ગીયી તદ્દન લિન્ન છે. તેનાં પાંદડાઓ બહુ જ નાનાં થઇ ગયેલાં છે, અને પાંદડાંઓના પાયાઓ પરસ્પર મળી જવાથી ઉત્પન્ન થયેલા એક જાતના મ્યાનની ઉપર બાંધે કાંટાઓ ઉગ્યા હોય નહિં થું એવા તેઓ દેખાય છે. તેમનાં થડ ગાંઠાગાંઠાવાળાં અને સારાં વિકસેલાં હોય છે, અને તેમનાં પાંદડાંઓ અને ડાળીઓની રચના વમળના જેવી લાગે છે. તેમના શંકુઓ તુરત ઓળખાઇ આવે છે; આલિંગકોષાગારો દાલના જેવાં ભીંગડાંની અંદરની બાજુએ ઉગેલાં હોય છે, અને તેનાં બધાં અલિંગકોષો એકજ જાતનાં હોય છે.

* આપણે પાછલા પ્રકરણમાં જોઇ ગયા કે હંસરાજ વન

રૂપતિઓ બીજાધારી ઉદ્દલિન્નજોની અવતરણરેખાની બહુજ નજદીક છે, તેથી પ્રથમ આપણે તેમનું અવલોકન શરૂ કરીએ.

ખરેખર, હાલની હંસરાજો ઉંચી કોટિની ઉદ્દલિન્નજોની સાથે કાંઈજ મહત્વનો સંબંધ પ્રગટ કરતી નથી. એ વનસ્પતિઓનાં પ્રાચીન જીવશેષોજ આપણને આ બાબતનો પુરાવો આપે છે. હાલની હંસરાજ વનસ્પતિઓ ખરેખર પ્રચ્છન્નબીજાનાં લક્ષણો વ્યક્ત કરે છે, અને વધારે ઉંચી કોટિની વનસ્પતિઓથી તેઓ ઘણી બાબતોમાં ભેદ પ્રગટ કરે છે. જળ-હંસરાજનું કુટુંબ આ વાતનો અપવાદ છે. તેની ઉપર બે લિન્ન જાતનાં અલિંગકોષો ઉગે છે. સજીવ પ્રચ્છન્નબીજાઓમાં અત્યંત વિજાતીય અલિંગકોષોવાળું આજ કુટુંબ છે. આશ્ચર્યકારક વાત તો એ છે, કે દરેક મોટા કોષાગારમાં માત્ર એકજ અલિંગકોષ પરિપક્વ થાય છે, અને પુષ્પાંડના ગર્ભ-કોશની પેઠે તે અલિંગકોષાગારની બધી જગા રોડી લે છે. એઓલા નામની નાની તરતી જળ-વનસ્પતિમાં અલિંગકોષાગારની આસપાસ એક ઢાંકણ ઉત્પન્ન થાય છે, અને ત્યારે ખરા પુષ્પાંડની સાથેનું સામ્ય બહુજ ઉંચી જાતનું બને છે. તોપણ, તેમની બાબતમાં બીજ ઉત્પન્ન થતું નથી, અને ફલનની ક્રિયા પણ અલિંગકોષો પાણીમાં ખરી પડે ત્યાર પછી થાય છે. ઘણે ભાગે જળ-હંસરાજને બીજાધારી ઉદ્દલિન્નજોની સાથે ખરેખર કાંઈજ લેવાદેવા નથી; તે ઉત્ક્રાંતિવૃક્ષની કેવળ ભવિષ્યમાં ઉત્પન્ન થયેલી એક ગાખા છે, અને અવતરણની મુખ્ય રેખાની આથે તે કેટલેક અંશે આશ્ચર્યકારક અમાનતા પ્રગટ કરે છે.

આપણી સજીવ હ મગજના ઘણાં કુટુંબો મધ્યજીવયુગ માં પણ ઉગતા હતા આપણને બહુજ પરિચિત બહુમૂલ (પોલિપોડિએસી) હ મગજના જીવગેષો (મુખાલખ, પ્રેઃફર્ન, નરહ સરાજ, મેલફર્ન, એણુજ-હીહ સરાજ, હાટર્સટ વિગરે) વિવૃતબીજના યુગથી વધારે પ્રાચીનયુગના ખડકોમાંથી આપણને પ્રાપ્ત થતા નથી વધારે અગત્યના માત્ર જે કુટુંબો છે નૃપીહસરાજ, અને મેરેટ્રિએસી આપણે મ એમનોજ દુ ક ઇતિહાસ તપાસીશું, અને પ્રાચીનજીવયુગ કઈ વનસ્પતિઓમાંથી તેઓ ઉત્પન્ન થઈ, તે બનશે તો શ્રેષ્ઠ કાઢીશું

નૃપીહસરાજ બહુજ સુંદર વનસ્પતિ છે, અને લીનારાવાળી જમીન કે ભેજવાળા જ ગલોમા ઉગે છે અર્લેન્ડના ટાપુમાં તેમની વધારે વસ્તી છે તેઓ એટલી બ લોકપ્રિય છે, કે માણીઓ અને મ આહકો (કલેક્ટર્સ) તેમ ઘણે સ્થળેથી રણે ભાગે નાશ કરશે એવી ધાસ્તી રહે છે જાત પૃથ્વી ઉપર બહુજ પ્રસરેલી છે, યુરોપથી તે જાપાન સુધી, હિંદુસ્થાનમાં, અને દક્ષિણ આફ્રિકામાં, તથા ડેનેડ તે દક્ષિણ આફ્રિકા સુધી બધા પ્રદેશોમાં તે વનસ્પતિ યથેચ્છ ઉગે છે

આ વનસ્પતિમાં, જનનપર્ણનો ઉપલો ભાગ ફલી છે, પાદડીઓ ઘસાઈ જઈ ડેવળ દીંટા બની ગઈ છે, તેમની ઉપર અમર્ય અલિ ગકોષગારો ઉગેલા હોય છે, તે

નીચલા ભાગમાં સામાન્ય લીલા રંગની પાંદડીઓ ફૂટેલી હોય છે. તેની ખીણ ઘણી ઉપજતોમાં અને કેટલીક નૃપીહંસરાજમાં પણ ફલીબૂત અને પૌષ્ટિક એમ બે જાતનાં લિન્ન જનનપણો ઉગે છે; પણ દક્ષિણ ગોળાર્ધમાં ઉછરતી ટોડિઆ નામની હંસરાજમાં બધાં જનનપણો એકજ જાતનાં હોય છે, અને તેમની નીચલી બાજુએ અલિંગકોષાગારો ઉત્પન્ન થાય છે.

આ અલિંગકોષાગારો મુખાલખ, નર-હંસરાજ કે કુમારિકાકેશી હંસરાજ વિગેરે હાલની ઘણી હંસરાજોનાં એજ અંગોથી લિન્ન છે. આ વનસ્પતિઓમાં, અલિંગકોષાગારની આસપાસ ઘટ્ટ બનેલાં કોષોની એક હાર વર્તુળાકારમાં ગોઠવાયેલી હોય છે, અને તે જ્યારે સંકોચાય છે, ત્યારે અલિંગકોષાગારની દિવાલ ફાટી જઈ અલિંગકોષો બહાર વેરાઈ જાય છે. નૃપીહંસરાજના કુટુંબમાં, એવાં ઘટ્ટ કોષો અલિંગકોષાગારની માત્ર એકજ બાજુએ થોડી જગામાં ઉગેલાં હોય છે. આપણે આગળ જોઈશું, કે એ વસ્તુઓ જૂનાં અલિંગકોષાગારોનો નમુનો છે, અને તે માત્ર હાલની નૃપીહંસરાજમાં આપણને જણાય છે. ઇંગ્લાંડની નૃપીહંસરાજનાં થડ ટૂંકાં, જાડાં અને લગભગ જમીનની અંદર જ રહેનારાં હોય છે, પણ દક્ષિણ ગોળાર્ધમાં તેઓ ઉંચા અને હવામાં ટટાર ઉગે છે. તેમની રચના સામાન્ય હંસરાજનાં થડથી બહુજ લિન્ન છે, અને કેટલેક અંશે તે દ્વિજ વનસ્પતિના થડને મળતી આવે છે. નૃપીહંસરાજનાં થડમાં, ગરતી આસપાસ વાહિની-રેસાઓનું ચક્ર હોય છે; એ રેસાઓનું કાંઈ છૂટું છૂટું હોય છે,

પણ તેમનું વલ્કક રેસાઓના ચક્રની બહારની બાજુએ એકાકાર થયેલું હોય છે, અને તેથી એ ભાગ તૂટક હોતો નથી. દરેક પાંદડાના દીંટામાં માત્ર એક જ રેસો પસાર થાય છે. અમેરિકામાં ઉગતી આ ઉપજાતના થડમાં કેટલીક જગાઓએ કાષ્ઠની અંદરની બાજુએ થોડું વલ્કક હાજર હોય છે, અને એ નવાઈભરેલી વાત છે, કે બ્રિટિશ કોલમ્બીઆના કવીન ચાર્લોટના ટાપુઓમાં ખટિકાયુગના ખડકોમાંથી પ્રાપ્ત થયેલી એ કુટુંબની એક ઉપજાતમાં પણ વલ્કકની એજ વ્યવસ્થા છે. આ જીવશેષની બાજતમાં કાષ્ઠની બહારની અને અંદરની બન્ને બાજુએ વલ્કકની સુંદર પટ્ટીઓ છે. એ રીતે, ખટિકાયુગમાં નૃપીકુંસરાજનું થડ ઉત્ક્રાંતિની પરાકાષ્ઠાએ પહોંચ્યું હતું.

સદ્ભાગ્યે આ કુટુંબનાં જીવશેષોની લાંબી પરંપરા આપણે હાથ આવી છે, અને તેથી પ્રાચીન જીવયુગ સુધી આપણે તેના ઇતિહાસને અનુસરી શક્યા છીએ. એ કામ માટે વિદ્વાન ક્રિડસ્ટન અને ગ્વીને-વૉલ્ફને ખરેખરો ધન્યવાદ આપવો ઘટે છે. આપણે એ કુટુંબની જેમ જેમ વધારે જૂની વ્યક્તિઓને તપાસીશું, તેમ તેમ આપણને સમજાશે, કે જૂદા જૂદા રેસાઓનાં ચક્રો ધીમે ધીમે પ્રથમ એકાકાર થઈ અતુટક પ્રદેશ બને છે, અને પછી તે પ્રદેશ નક્કર કાષ્ઠના નળાનું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે. અલગત્ આ જીવશેષોની પરંપરા સંપૂર્ણ રીતે નિયમિત નથી, કારણ કે લિન્નજીનોની બાજતમાં કેટલીક વાર અતિચ્છાદિત થાય છે. સામાન્ય નૃપીકુંસરાજના જેવાં લાગતાં થડ કેવળ તૃતીય યુગનાજ ખડકોમાં નહિ, પણ વિવૃતબીજ

યુગના ખડકો મુઘી પણ પથરાયેલાં છે. તોપણ, ન્યુઝીલાંડમાંથી હાથ આવેલા વિવૃત્તબીજ યુગના થડમાં કાષ્ઠનો પ્રદેશ લગભગ સંધાયેલા અને અતૂટક હતો, અને દક્ષિણ આફ્રિકાની વીડના યુગની એક ઉપજાતમાં તો એક વિશેષતા છે: તેના થડના ગરનાં કોષોની વચ્ચે વચ્ચે અને કાષ્ઠના ચક્રની અંદરની બાજુએ કાષ્ઠની વાહિનીઓ પથરાયેલી છે. આ બધી ઉદ્ભિન્નતા નૃપી-હંસરાજનાજ કુટુંબની સભ્યો છે.

રૂશિયાના વૃદ્ધોરગ યુગના ઉપજાત ખડકોમાંથી કેટલાંક અત્યંત આશ્ચર્યકારક થડ આપણે હાથ આવ્યાં છે, અને તે ઉપરથી પ્રાચીનજીવયુગની નૃપી હંસરાજનાં થડ કેવાં હતાં તે આપણને જણાઈ આવે છે. એ ખડકોમાંથી વનસ્પતિઓનાં જીવશેષો કોઈક કોઈક સ્થળેજ આપણે હાથ આવે છે. અને તેથી એ ખડકોની વનસ્પતિઓ કેવી હશે તે આપણે માત્ર આખાં છૂટાં છવાયાં જીવશેષોની મદદથી સમજી શકીએ છીએ.. ઝેલેસ્કિઆ ગ્રેસીલીસ નામની ઉપજાતતા થડમાં કાષ્ઠનો પ્રદેશ અતૂટક અને પહોળો છે, અને જૂદા જૂદા રેસાઓ એકઠા મળી જવાથી તે અતૂટક બન્યો છે, એમ માનવા આપણી પાસે એક પણ ચિહ્ન નથી. તેની રચના સંખ્યા એક રમુજ વાત એ છે, કે એ પ્રદેશના બહારના ભાગની રચના સામાન્ય કાષ્ઠના જેવી છે, અને તેનો અંદરનો ભાગ વધારે ટૂંકી અને વધારે પહોળી વાહિનીઓનો બનેલો છે. તૃતીય યુગની ઉદ્ભિન્નતામાં પણ આવીજ રચના હોય છે. એ વાહિનીઓ થડમાં ઉંચે પાણી સહ જતી નથી, પણ તેઓ પાણીની ટાંકીઓની ગરજ સારે છે.

આ ઉપજાતના થડમાં તો ગર હતો, પણ ઝેલિસ્કિઆની એક ખીજ ઉપજાતમાં ઘણે ભાગે અંદરનું મોટાં કોપવાળું કાષ્ઠ થડના મધ્ય ભાગ સુધી પહોંચેલું હતું, અને મુંદર થેમ્નોપ્ટેરિસ હંસરાજમાં તો નક્કી જરા પણ ગર ન હતો, અને થડના વચલા ભાગની બધી જગામાં કાષ્ઠનો નક્કર નળો હતો. થડનો એ ભાગ ઉપર વર્ણવેલી ટુંકી અને પહોળી કાષ્ઠ-વાહિનીઓનો બનેલો હતો. તૃતીય યુગની નૃપી હંસરાજથી આ વાહિની-તંત્રની રચના બહુ જ સિન્ન છે, પણ દ્વીટાની રચના વિગેરે ખીજાં લક્ષણોની હાજરીને લીધે એ વાત નક્કી છે, કે એ ઉપજાત નૃપીહંસરાજના જ કુટુંબની સભ્ય છે. નૃપી હંસરાજનાં આ અત્યંત પ્રાચીન થડ પ્રાચીન જીવયુગમાં વધારે પ્રસરેલી પ્રિમોફીલીસીસ નામના બહુ જ જૂના હંસરાજના કુટુંબનાં કેટલાંક થડને બહુ જ સમાન છે.

એ રીતે, હાલના એક સજીવ કુટુંબનો ભૂતકાલીન ઇતિહાસ આપણે ઠેક પ્રાચીન જીવયુગ સુધી તપાસ્યો, અને એ યુગની અત્યંત પ્રાચીન વનસ્પતિઓની સાથે તેનું શું સામ્ય છે તે પણ આપણે જોયું. આ પ્રાચીન વનસ્પતિઓમાંથીજ ઘણે ભાગે હાલની સજીવ હંસરાજ અને નૃપી હંસરાજનાં કુટુંબો ઉત્પન્ન થયાં છે. શરીરની અંતર્ઘટના અગત્યનો પુરાવો છે, તો-પણ નૃપી હંસરાજના કુટુંબના ઇતિહાસનો પુરાવો કેવળ એટલા જ ઉપર આધાર રાખતો નથી. હિટિક અને ત્રિશુલિ-તસ્તરયુગનાં વળાં સુધી મધ્યજીવયુગના વિવિધ ખડકોમાંથી કેટલીક હંસરાજ વનસ્પતિઓ આપણે હાથ આવી છે, અને

તે મર્વેને નૃપી હંસરાજના જેવાંજ અલિંગકોષાગારો વળગેલાં હતાં, અને એ અત્યંત નવાઈની વાત છે, કે એવાં જ અલિંગ-કોષાગારો પ્રાચીન જીવયુગનાં અશ્મીભૂત જીવશેષોમાં પણ આપણી નજરે આવે છે. એ હંસરાજનાં બહુ જ જૂનાં અલિંગ-કોષાગારોનો નમુનો છે. કેવળ નૃપી હંસરાજના જીવશેષમાં જ નહિ, પણ તેની પૂર્વજ પ્રિમોફિલિસીનાં જીવશેષોમાં પણ એવાં જ અલિંગકોષાગારો હતાં. એ રીતે, જનનેદ્રિયો અને પૌષ્ટિક ઇદ્રિયો રૂપી બન્ને સાક્ષીઓ નૃપી હંસરાજના હાલના કુટુંબને આ પ્રાચીન વનસ્પતિસમૂહનું સંબંધી ઠરાવે છે; તેથી તેની ટૂંકી હકીકત અત્રે આપવી જરૂરની છે.

સખીજહંસાની શોધને લીધે પ્રાચીનજીવયુગની યથાર્થ હંસરાજ વનસ્પતિઓની સંખ્યા ખરેખર ઘટી જાય છે; તો-પણ, એ યુગના જે મોટા વનસ્પતિસમૂહો નક્કી હંસરાજનીજ જાતના છે. એ જે પૈકી વધારે સાદી ઉદ્ભવિજ્જોને મી. આર્બર પ્રિમોફિલિસીસના નામથી આપણને ઓળખાવે છે, કારણ કે તેમના વર્ગની કોઈ પણ વનસ્પતિના કરતાં તે વધારે પ્રાચીન છે. તેમના શરીરની અંતર્ઘટનાના જ્ઞાનથી આપણે તેમને તુરત ઓળખી શકીએ છીએ. તેમનો બહારનો દેખાવ કેવો હશે તે નક્કી કરવા આપણી પાસે પૂરતું સાધન નથી. હંસરાજનાં જનનપર્ણનાં કેટલાંક સુરક્ષિત બીજાં નક્કી પ્રિમોફિલિસીસનાજ કુટુંબનાં અંગો હોવાનું સાબીત થયું છે; તોપણ, એટલાજ સાધન ઉપરથી એ કુટુંબનું બાહ્ય સ્વરૂપ નક્કી કરવું તદ્દન અશક્ય છે.

હાલની ઘણી હંસરાજોના થડમાં વાહિનીઓના અસંખ્ય લિંગ નળાઓ હોય છે, નૃપીહંસરાજ અને એક કે બે બીજાં કુટુંબોની પેઠે ત્રિમોદિલિસિસને વાહિનીઓનો માત્ર એકજ નળો હતો; તેના જનનપર્ણના દીંટામાં પણ રેસાઓનો કેવળ એકજ નળો હતો. એ કુટુંબની કેટલીક વ્યક્તિઓના થડની રચના બહુજ સાદી હતી; કારણકે વાહિનીઓનો આ એકજ નળો પણ એકરૂપ (યુનિફોર્મ) કાષ્ઠના નક્કર સ્થંભનો બનેલો હતો, અને તેની આસપાસ વડકકતું પડ વિંટળાયેલું હતું. વૃદ્ધોરગ યુગની નૃપીહંસરાજની પેઠે તેની કેટલીક વ્યક્તિઓનાં થડના કાષ્ઠનો મધ્યભાગ બહારના પ્રદેશથી લિંગ હતો; અને કેટલીક વ્યક્તિઓનાં થડના મધ્યભાગમાં, વીડડયુગની નૃપીહંસરાજની પેઠે, કાષ્ઠ અને ગરતું મિશ્રણ હતું. વધારે કિલ્લટ રચનાવાળાં આવાં થડમાં કાષ્ઠના સ્થંભનો આકાર સાદા નળાના જેવો નહિ, પણ વાંસળીના જેવો હતો, અને તેમાં મોટી ખાંચ પડેલી હતી. કેટલીક બાબતમાં, એ થડનો શાખાતંત્ર, હાલની સુખાલબ વનસ્પતિની પેઠે, કેવળ થડની ટોચના બખ્ખે ફાંટાઓ થઈ ઉત્પન્ન થયેલો હતો, પણ બીજી કેટલીક વ્યક્તિઓમાં, શાખાઓ કક્ષરથ એટલે થડની બાજુઓ ઉપર ફૂટેલી હતી. થડમાંથી જે સ્થળે પાંદડું ફૂટેલું હોય છે, તે સ્થળે પાંદડું થડની સાથે ખૂણા કરે છે, અને એ ખૂણાને કક્ષા કહે છે; સામાન્ય રીતે નવી ડાળી એ ખૂણામાંથી ફૂટે છે. સામાન્ય હંસરાજ વનસ્પતિઓના શાખાતંત્રનું સ્વરૂપ આવી બાબતનું નથી, તો પણ હાલની તથાગી હંસરાજના (પ્રીક્ષીફર્ન) થડની ડાળીઓ કક્ષરથ હોય છે. ઘણી વ્યક્તિઓમાં, થડના

કરતાં તેમાંથી ફૂટેલાં દીંટાંઓ વધારે જાડાં હતાં. હમણાં જ આપણે પાછળ જોઈ ગયા, કે તેમનાં દીંટાંમાં વાહિનીઓનો માત્ર એકજ રેસો હતો. પ્રસ્તુત દીંટાંઓની બાબતમાં, આ રેસાની રચના વધારે કિલ્લટ હતી. સામાન્ય રીતે એવું બનતું હતું, કે પાંદડાના મુખ્ય દીંટાની દરેક બાજુએ પાંદડીઓની બે હાર ઉત્પન્ન થતી હતી; પણ આ વિચિત્ર રચના ઘણે ભાગે કેવળ ફલીભૂત જનનપણેનું જ ખામ્મ લક્ષણ હતી, કારણ કે આ ઉદ્ભિજ્જેનું સામાન્ય લક્ષણ એ હતું, કે પાંદડીઓ હીન ખામ્મ ફલીભૂત જનનપણેની જ ઉપર અલિંગકોષાગારો ઉત્પન્ન થતાં હતાં. આ બાબતમાં, આ આદ્ય હંસરાજો હાલની ઘણી હંસરાજોથી ક્યારનીયે વધારે ઉત્ક્રાંત થયેલી હતી. તોપણ, એ પ્રાચીન કુટુંબની ઘણી વ્યક્તિઓમાં, અલિંગકોષાગારો સામાન્ય પાંદડાંઓના નીચલા પૃષ્ઠમાંજ ઉત્પન્ન થતાં હતાં.

આપણે પાછળ જોઈ ગયા, કે એ અલિંગકોષાગારો ઘણીવાર લગભગ નૃપીહંસરાજનાં જ જેવાં હતાં. તેમની એક બાજુએ મોટાં અને ઘટ્ટ કોષોનો નાનો સમૂહ ઉગેલો હતો. બીજી ઘણી વ્યક્તિઓની બાબતમાં, તેમની રચના વધારે ઉચી જાતની હતી; અલિંગકોષાગારો અને તેમને વિખેરી નાંખવાનું ચંત્ર બન્ને વધારે મોટાં હતાં. કેટલીક બાબતમાં; હાલની ઘણી હંસરાજની પેઠે, ચકના આકારનું ચંત્ર હતું, પણ એ ચક લગભગ હંમેશાં એક કોષથી વધારે પહોળું હતું, એટલે, તે ચક બે કોષોની ગોળ હારનું બનેલું હતું. વળી, એ કુટુંબની કેટલીક બીજી ઉપજતોમાં આવી કોઈપણ જાતની ચંત્ર-રચના ન હતી.

આ બધાં અલિંગકોષો એકજ વતનાં હતાં, અને તેમનું કદ તૃતીય યુગની હંસરાજનાં એજ અંગોના જેટલું હતું.

હંસરાજને મળતી આવતી પ્રાચીનજીવયુગની બીજી વનસ્પતિઓની પેઠે, આ ઉદ્દલિન્ગજ્ઞેની બાળતમાં પણ એજ પ્રજ્ન ઉભો થાય છે: શું તેઓ યથાર્થ હંસરાજ હતી ? સદ્દલાગ્યે આપણી પાસે આ વાતને લગતો ઉત્તમ પુરાવો છે. પ્રીમોફિલિસીસના કુટુંબની અનેક વ્યક્તિઓમાં, તેમનાં અલિંગકોષાગારોમાં જ હજી પૂરાઈ રહેલાં અલિંગકોષો આપણે હાથ આવ્યાં છે. તેમનું અંકુરીભવન થતું હતું તેજ સમયે તેઓ જમીનમાં દટાઈ ગયેલાં હોવાથી, અને ત્યાંપણ તેઓ અત્યંત મુરશ્ચિત રહેલાં હોવાથી, તેમની એ ક્રિયાનું સ્વરૂપ આપણને મારી રીતે સ્પષ્ટ થાય છે. એ અંકુરીભવનની દશાઓ હાલની હંસરાજની અનુસમાંગના આરંભના વિકાસને બહુ જ મળતી આવે છે. લીની હવા કે કોઈ અન્ય પરિસ્થિતિને લીધે જો અલિંગકોષાગારોમાંથી અલિંગકોષો બહાર નીકળી ગયાં ન હોય તો હાલની હંસરાજોમાં પણ (નૃપી હંસરાજના કેટલાક સ્થળોમાં પણ એજ પ્રમાણે બને છે) સાધારણ રીતે અલિંગકોષાગારમાંજ અંકુરી ભવન થાય છે. પ્રસ્તુત જીવશેષોનાં દૃશ્યો પણ આકસ્મિક હશે; જો એમ જ હોય તો ઉદ્દલિન્ગજ્ઞવેત્તાઓને સદ્દલાગી જાણવા. એ વનસ્પતિઓનાં બીજાં બધાં લક્ષણો ઉપરાંત તેમનાં અલિંગકોષોના અંકુરીભવનનો પુરાવો નકકી સાબીત કરે છે, કે પ્રીમોફિલિસીસ ખરેખર યથાર્થ હંસરાજની આવ

કેમ હતી. આપણે પાછળ જોઈ ગયા, કે નૃપી હંસરાજની માથે આ પ્રાચીન કુટુંબ માક્ષાત્ મતત સંબંધ પ્રગટ કરે છે, હાલની હંસરાજના કેટલાક બીજાં કુટુંબોની સાથે પણ તેમને કેટલુંક સામ્ય છે, અને એમ સંભવે છે, કે પ્રાચીન જીવયુગના આ પ્રિમોફિલિસીસના વિશાળ કુટુંબમાથી જ મધ્યજીવ યુગના ઘણા વનસ્પતિ સમૂહોદ્ભવ થયા હતા.

તોપણ, પ્રાચીન જીવયુગમા પ્રિમોફિલિસીસ ત્રિવાય હંસરાજનું એક બીજું કુટુંબ હયાત હતું. હવે આપણે એ વધારે કિલ્લટ રચનાવાળા કુટુંબનું અવલોકન કરીશું, અને આપણે આગળ જોઈશું, કે આ બાબતમા પણ, હાલના એક વનસ્પતિસમૂહના જ માધનથી તેનાં જીવશૈલ્યોને આપણે જોળખી શકીશું. આ પ્રાચીન કુટુંબ મેરેટ્રિએસી હંસગજોને છે. કમનખીએ, આજે તેના થોડા જ વંશજો હયાત છે. ક્યુ શહેરના બાગમા હંસગજના મંડપોમા આ પ્રાચીન કુટુંબની કેટલીક હંસગજો આજે આપણા જોવામાં આવે છે ઘણે ભાગે, તેઓ ગરમ પ્રદેશોમા જ ઉછરે છે, તોપણ ન્યુઝીલેન્ડ અને દક્ષિણ-ચીનના મમશીતોષ્ણ મુલકોમા પણ તેમની થોડી હાજરી છે એ કુટુંબની ઘણી હંસગજો દેખાવમા બહુજ મુંદર હોય છે, અને હાલમા ઘણે સ્થળે ઉછેગતી તેની એન્જિઓપ્ટેરિસ નામની ઉપજાતમાં, જનનપર્ણ લગભગ ૧૨ ફુટ લાંબા હોય છે મામાન્ય રીતે, તેમના થડ ટુકા અને દળદાર હોય છે, અને તેમનાં બહુજ ઉંડી ખાંચવાળા જનનપર્ણ લીસાં અને લીંગડા વગરનાં હોય છે. બીજા હંસગજોનાં

એ અવયવોની ઉપર છાલાંના જેવાં લીંગડાં ઉગેલાં હોય છે. વધારેમાં, એન્જિઓપ્ટેરિસનાં જનનપર્ણોનાં દીંટાંના પાયા-ઓમાં બે દળદાર ઉપપર્ણો (સ્ટીપ્યુડસ) હાજર હોય છે.

તેના થડની રચના બહુજ ક્લિષ્ટ છે; તેનો વાહિની-તંત્ર વિવિધ આકારના અનેક નળાઓનો બનેલો છે, અને ઘણીવાર તેમના બે કે વધારે એકકેંદ્રી વર્તુળો હોય છે. તેમના પરસ્પર મળી જવાથી એક આશ્ચર્યકારક જાળ ઉત્પન્ન થાય છે. દરેક પાંદડામાં થડમાંથી ઘણા વાહિનીરેસાઓ દાખલ થાય છે. તેનાં મૂળીઆં અન્ય હંસરાજોથી વધારે મોટાં અને વધારે ક્લિષ્ટ હોય છે, અને તેઓ થડની ટોચ પાસે જ ઉત્પન્ન થઈ તેની છાલમાં ને છાલમાં જ નીચે ઉતરી છેવટે થડની બહાર નીકળે છે અને પછી તેઓ જમીનમાં દાખલ થાય છે. પૌષ્ટિક અવયવોની રચનામાં મેરેટ્રિએસી હંસરાજ ઘણે ભાગે બધી હંસરાજોમાં શ્રેષ્ઠ કોટિની છે, અને તેમની જનનંદ્રિયોની વ્યવસ્થા પણ ઉંચી જાતની છે.

આપણને યાદ છે, કે ઘણી હંસરાજોમાં અલિંગકોષાગારોના ‘ પુંજ ’ (સોરી) હોય છે, એટલે તેઓ સમૂહબંધ ઉગે છે; અને તોપણ, તેઓ પરસ્પર તદ્દન છૂટાં છે. મેરેટ્રિએસીના કુટુંબની ઘણી વ્યક્તિઓમાં, ઘણાં અલિંગકોષાગારો સમૂહમાં ગોઠવાઈ સંયુક્તકોષાગાર (સિનેન્જિઅમ) બનાવે છે. એન્જિઓપ્ટેરિસ અને તેને અત્યંત મળતી આવતી. એક બીજી જાતમાં એ પ્રમાણે થતું નથી; તેમની

ખાખતનાં અલિંગકોષાગારો બે હારમાં બહુજ પાસે પાસે ગોઠવાય છે, પણ તેઓ પરસ્પર સંધાયેલાં નથી. એ દરેક હારને પુંજ કહે છે. તોપણ, એ અલિંગકોષાગારો ઘણી હંસરાજોનાં એજ અંગોથી લિપ્ત છે. તેઓ વધારે મોટા અને વધારે નક્કર છે, અને તેમની જાડી દિવાલ ઘણાં કોષોની બનેલી હોય છે. અલિંગકોષાગારની ટોચ ઉપર થોડા ભાગમાં ઘટ થયેલાં કોષો ઉત્પન્ન થયેલાં હોય છે, અને નૃપી હંસરાજની પેઠે, એ કોષોના અંકોચાવાથી કોષાગાર ફાટી જઈ તેમાંથી અલિંગકોષો બહાર નીકળી આવે છે. મેરેટ્ટિઆ, ડેનિઆ, અને કોલકુસિઆ નામની એ કુટુંબની બીજી ત્રણ જાતોમાં અને તેમની ઘણી ઉપજાતોમાં અલિંગકોષાગારો સંયુક્ત હોય છે. મેરેટ્ટિઆ હંસરાજમાં સંયુક્ત કોષાગારોનો દેખાવ શીંગના જેવો હોય છે; દરેક સંયુક્ત કોષાગારમાં ખાનાંઓની બે હાર સાથે સાથે ગોઠવાયેલી હોય છે (દરેક હારમાં આશરે દસ ખાનાંઓ હોય છે) દરેક ખાનું તે એક અલિંગકોષાગાર છે. તેની એક ઉપજાતમાં એ આખી સંયુક્ત વસ્તુને દીટું હોય છે, અને તેથી તે બેન્નેટ્ટિસના સંયુક્ત પરાગકોશને બહુજ મમાન લાગે છે. જ્યારે સંયુક્ત કોષાગાર પરિપક્વ થાય છે, ત્યારે ફળના ગુદાના આકારનાં બે અડધીઆં છૂટાં થઈ ફાટ પડે છે, અને પછી દરેક અડધીઆના દરેક ખાનામાંથી અલિંગકોષો એ ફાટથી બહાર છટકી જાય છે. ડેનિઆ હંસરાજમાં પણ લગભગ આવીજ વ્યવસ્થા છે; તેમની ખાખતમાં ફેર માત્ર એટલોજ છે, કે સંયુક્ત કોષાગારમાં ફાટ પડતી નથી,

પણ અલિંગકોષો નાનાં છિદ્રોની વાટે બહાર છટકી જાય છે. આ જાતમાં ધર્મવિભાગ ઉત્પન્ન થયો હોય એમ લાગે છે, કારણ કે તેમાં ફલીભૂત અને સ્તરીભૂત એવાં બે જાતનાં જનનપર્ણો હોય છે. તોપણ મેરેટ્રિએસીના કુટુંબની ખીજ જાતોમાં એવું કંઈ પણ જણાતું નથી.

કોલકુસિઆનાં જનનપર્ણો હાર્સ-ચેસ્ટનટનાં પાંદડાંના જેવાંજ દેખાય છે. તેમની નીચલી બાજુએ ઉગેલાં સંયુક્ત કોષાગારો ગોળ હોય છે, અને તેમનો દરેકનો આકાર શુભાખનાં નાના સુંદર ફૂલના જેવો છે. તેમના મધ્ય ભાગમાં સહેજ ઉંડો ખાડો હોય છે, અને તેમાં અંદરનાં ખાનાંઓમાં છિદ્રોરૂપી દ્વાર આવેલાં હોય છે.

અલિંગકોષ રૂપી આ વિચિત્ર ફળ નકકી વધારે વિકસેલી જનનેંદ્રિયો છે, કારણ કે સામાન્ય હંસરાજનાં અલિંગકોષાગારો બહુ સાદાં હોય છે. તોપણ, આટલી બધી ઉંચી જાતનાં પૌષ્ટિક અને પુનરૂત્પત્તિનાં અવયવોવાળું 'મેરેટ્રિએસીનું' કુટુંબ બહુજ પ્રાચીન ઉદ્દલિન્નજ્ઞે છે. મધ્યજીવયુગની હંસરાજનાં કેટલાંક જીવશેષો આ કુટુંબના સભ્યો છે એમ ઉદ્દલિન્નજ્ઞવે-ત્તાઓનું માનવું છે, અને ત્રિશુષિત અને ચૂર્ણોપલ યુગના ખડકોમાંથી પ્રાપ્ત થયેલાં કેટલાંક જીવશેષો હાલની હંસરાજ વનસ્પતિઓને એટલાં બધાં સમાન છે, કે તેમનો સમાવેશ મેરેટ્રિઆ અને ડેનિઆ હંસરાજની જાતોમાં કરવામાં આવ્યો છે. પ્રાચીનજીવયુગનાં પ્રસ્તરોમાં હંસરાજની બહુજ

મોટી સંખ્યા હાજર છે, અને તેમની ઘટના અને જનને દ્રિયો રૂપે જતાવે છે, કે તેઓ મેરેટ્રિએસીની સંબંધીઓ છે. વસ્તુતઃ, પ્રાચીન જીવયુગના ઉત્તરાર્ધમાં હંસરાજનું આ કુટુંબ અગ્ર-ગણ્ય અને વિશાળ હતું, એવું માનવા આપણી પાસે સંપૂર્ણ પૂરાવો છે. મૂળીઆં અને પાંદડાં મહિત તેમનાં ઘડનાં ફુકાં જર્મીનમાં દટાઈ ગયેલાં હોવાથી, અને તેની ઘણી ઉપજતોનાં ઘડની અંતર્ઘટના જાહેર ચારી રીતે સચવાઈ રહેલી હોવાથી એ ઉદ્ભવિત્ત્વની આપણને સંપૂર્ણ માહિતી મળી શકી છે. ચડને વળગી રહેલાં જનનપર્ણોના જેવાંજ ઘણાં છુટા જનન-પર્ણોની ઉપર જનનેદ્રિયો અકબંધ મુરસિત રહેલી છે. બધાં અવયવો મુરસિત રહેલા હોય એવી તેના સિવાય બીજી એકકે પ્રાચીન ઉદ્ભવિત્ત્વ નથી. તોપણ, થોડાં વર્ષો ઉપર સુખીજ-હંમાની શોધ થઈ, ત્યાર પછી મેરેટ્રિએસીનાં આ જીવજો-ષોનું સ્વરૂપ નક્કી કરવામાં કેટલીક મુશ્કેલીઓ ઉત્પન્ન થઈ છે.

રચનામાં, તેમનાં થડ હાલની મેરેટ્રિએસીથી ભિન્ન હતા. પ્રાચીન જીવયુગમાં એ વનસ્પતિઓ જાહેર મોટી, એટલે લગભગ ૬૦ ફુટ ઉંચી વધતી હતી, અને તેમનાં થડની અંતર્ઘટના, સામાન્ય રીતે, તેમના હાલના કુટુંબથી પણ વધારે ઉંચી જાતની હતી, તોપણ તેમનું ઉભયનું સ્વરૂપ તો સમાન જ હતું. તેમનાં થડની આસપાસ મૂળીઆંના ઘટ્ટ પડતું વેદન હતું અને એ બાબતમાં તેઓ હાલની મેરેટ્રિએસીને સંપૂર્ણ રીતે મળતી આવતી હતી. તોપણ તેમનાં વિશાળ જનનપ્ર-ણોના પાહિની-તંત્ર વધારે સાદો હતો.

તેમની જનનેંદ્રિયોની રચના બહુજ વિશિષ્ટ હતી. તેનાં ફલીભૂત જનનપણોની ઉપર વિવિધ જાતનાં સંયુક્ત કોષાગારો હતાં. ઘણાં સંયુક્ત કોષાગારો તો ગોળ રકાળીના આકારનાં હતાં. હાલમાં માત્ર કૉલકુસીઆનીજ જાતમાં એવાં સંયુક્ત કોષાગારો આપણી નજરે આવે છે. કેટલાંક જીવશે-યોમાં અલિંગકોષાગારો માત્ર તેમના પાયા આગળથીજ સંધાયેલાં હતાં, અથવા હાલની એન્જિઓપ્ટેરિસની પેઠે તેઓ પરસ્પરથી લગલગ અલગ પણુ હોય; અને કેટલાંક જીવશેયોમાં તેઓ કૉલકુસીઆની પેઠે સંપૂર્ણ રીતે સંધાયેલાં હતાં. કેટલીકવાર હાલની મેરેટ્રિઆની કેટલીક ઉપજાતોની પેઠે સંયુક્ત કોષાગારને ઘીંટું હતું, અને કેટલીક જાળતોમાં, તેમનું સ્વરૂપ ડેનિયા અને એન્જિઓપ્ટેરિસની જનનેંદ્રિયોને બહુજ મળતું આવતું હતું.

આ બધાં લક્ષણો ઉપરથી એ વાત તદ્દન સ્પષ્ટ થાય છે, કે પ્રાચીનજીવયુગમાં, અને મુખ્યત્વે પ્રાચીનજીવયુગના ઉત્તરાર્ધમાં પૃથ્વીના લગલગ બધા ભાગોમાં પ્રસરેલું વનસ્પતિઓનું એક મોટું કુટુંબ હતું, અને હાલની મેરેટ્રિએસી હંસરાજોની સાથે તેને બહુજ સ્પષ્ટ સામ્ય હતું.

હવે આ પ્રશ્ન ઉભો છે: પ્રાચીનજીવયુગની આ વનસ્પતિઓ યથાર્થ હંસરાજ હતી, કે તેઓ સખીજહંસા હતી. એક મમયે લિજિનોડેન્ડ્રોનનાં પરાગધારી જનનપણો મેરેટ્રિએસીઅસ હંસરાજનાં અંગ મનાતાં હતાં. એક બીજું

જીવશેષ પણ મેરેટ્રિએસી હંસરાજનું સભ્ય છે એમ ધારવામાં આવે છે, અને તેની ઉપર બીજા ઉગેલાં છે. મધ્યજીવયુગની ઉચ્ચ વિકાસ પામેલી બેનેટ્રિટિ વનસ્પતિઓમાં પણ, તેમનાં નરકેસરો મેરેટ્રિએસીના કોઈ અપ્રસિદ્ધ સભ્યનાં ફક્તીભૂત જનનપણું હોય એમ મંલવે છે. વસ્તુતઃ, આપણી પામે એવું કોઈ પણ ચોક્કસ સાધન નથી, કે જેથી અમુક જનનેંદ્રિયો મધ્યાર્થ હંસરાજનાં અલિંગકોષો છે કે કોઈ બીજાધારી હંસરાજનાં પરાગકોષ છે એવું આપણે નક્કી કરી શકીએ બીજી બાબતોએ, મેરેટ્રિએસીના આ પ્રાચીનજીવયુગના આ મિત્રોની અંતર્ધટનાનાં બધાં લક્ષણો હંસરાજને મળતાં આવે છે, અને સખીજહંસાની અંતર્ધટનાની માથે તેને કાંઈજ સામ્ય નથી. દુકામાં, એમ સંભવે છે, કે પ્રાચીનજીવયુગનાં જે જીવશેષો મેરેટ્રિએસી વનસ્પતિઓ છે એમ ધારવામાં આવે છે, તેઓ પૈકી ઘણાં જીવશેષો એજ વર્ગની મધ્યાર્થ હંસરાજો હતા, અને કેટલાંક જીવશેષો બીજાધારી વનસ્પતિઓ હતા. એ બે વર્ગોના જીવશેષોને એકમેકથી ઓળખી કાઢવાં બહુજ સુશકેલ છે, અને તેથી એવું સ્પષ્ટ અનુમાન થાય છે, કે મેરેટ્રિએસી અને આજ બીજાધારી વનસ્પતિઓની વચ્ચે વાસ્તવિક અને સત્ય સંબંધ હોય. આપણને આ પુરાવો મળી આવ્યો તે પહેલાં ઘણો સમય ઘયાં અધ્યાપક રોકેસ એમ શિખવતો હતો કે તૃણકૃમીઓ મેરેટ્રિએસી નામના હંસરાજના એક કુટુંબમાંથી ઉતરી આવી છે, અને આ માન્યતા કેટલેક અંશે સત્ય હતી.

જો આપણે એમ સ્વીકારીએ, કે મેરેટ્રિએસી (અથવા, ઓછો સંબંધ બતાવનાર અને વધારે અર્થસૂચક નામ વાપરીએ તો મેરેટ્રિએસ) ખરેખર પ્રાચીનજીવયુગમાં હયાત હતી, તો એ વાત સ્પષ્ટ છે, કે એ યુગની હંસરાજ હાલની હંસરાજના જેટલો જ ઉચ્ચ વિકાસ પામેલી હતી, અને તે પૃથ્વી ઉપર વધારે પ્રસરેલી હતી. તે સમયની બધી હંસરાજોમાં સોથી ઉત્તમ વિકાસ પામેલી મેરેટ્રિએસીની વસ્તી બહુજ વધારે હતી (મળીજહંસાની સાથેનું તેમનું સામ્ય એ કુટુંબની પ્રાચીનતા સાબીત કરે છે), અને એ કુટુંબ તે સમયે હાલના કરતાં વધારે ફેલાયેલું હતું. હંસરાજનાં હાલનાં બીજાં સજીવ કુટુંબોની વસ્તી તે સમયે ઘણે ભાગે બહુજ ઓછી હતી, અને તેમનાં જીવશેષોનું સ્વરૂપ બહુજ શંકા પડતું હોવાથી તેઓ અમુક કુટુંબનાં જ સભ્યો છે એમ ચોક્કસ કરવું અશક્ય છે. તોપણ, એ યુગનાં ઘણાં જીવશેષોની રચના બહુજ સાદી ભાતની હંસરાજના જેવી હતી, અને તેઓ પરસ્પર જૂદી જૂદી બાળતોમાં સંબંધ બતાવતાં હતાં. ઘણે ભાગે, એમ લાગે છે, કે આ પ્રાચીન વનસ્પતિ સમૂહમાંથી જ હાલની ઘણી હંસરાજો ઉત્પન્ન થયેલી છે. તોપણ, આ વનસ્પતિઓ અત્યંત વિવિધ અને માત્ર સહેજ સાદી હતી.

પ્રાચીનજીવયુગની આ વિવિધ હંસરાજો અને સળીજહંસાની વચ્ચે કેવો સંબંધ હતો તે ભવિષ્યની શોધ ઘણે ભાગે સ્પષ્ટ કરશે, કારણકે આ બન્ને વનસ્પતિવર્ગો કોઈ વધારે પ્રાચીન પૂર્વજમાંથી જ ઉતરી આવેલા છે.

પ્રકરણ ૬ કું.

વધારે ઉંચી કોટિની અલિંગકોષધારી
ઉદ્ભિન્નજોની ઉત્કાંતિ-સીતાહાર વનરૂપતિઓ.

બીજાધારી ઉદ્ભિન્નજોના અવતરણની મુખ્ય રેખાની સાથે હંસરાજ વિગેરે વનરૂપતિઓ સંબંધ ધરાવતી હોવાથી તેઓ બહુજ અગત્યની છે. આ સિવાય, હંસરાજના ભૂતકાલીન ઇતિહાસનું બીજું કાંઈ જ મહત્વ નથી. પ્રાચીન જીવયુગની યથાર્થ હંસરાજોની શરીરરચના ઘણે અંશે તેમની હાલની વંશજોના જેવી જ હતી. પ્રાચીન હંસરાજો વિશાળ વૃક્ષો હતાં, અને આજે પણ કેટલીક એવી જ હંસરાજો હયાત છે, પણ તેઓ એક જ કુટુંબની સભ્યો નથી.

વધારે ઉંચી કોટિની અલિંગકોષધારી ઉદ્ભિન્નજોના જે બીજા મોટા વર્ગો છે તેમનો જીવનઇતિહાસ તદ્દન ભિન્ન છે. હાલની સીતાહાર અને અશ્વપુરછી વનરૂપતિઓ ભૂતકાળમાં એક સમયે અગ્રગણ્ય ગણાતાં વિશાળ વનરૂપતિ-કુટુંબોની છૂટી છવાઈ વંશજો છે. જ્યારે આપણે પ્રાચીન જીવયુગ મુધી તેમના ઇતિહાસને ધરાળાર અનુસરીશું ત્યારે જ આપણે અલિંગકોષધારી વનરૂપતિઓની મહત્તા સમજી શકીશું.

પ્રથમ આપણે સીતાહાર (કલખ-મોચીસ, લાઇકોપોડસ)

વનસ્પતિઓ સંબંધે વાત કરીશું; કારણ કે, પ્રાચીન જીવજુગની વનસ્પતિઓમાં તેઓ બહુ જ મહત્વની છે, અને એક સમયે માત્ર તેમણે જ બીજધારી ઉદ્ભિન્નજ્ઞેની સાથે હરિદ્રાઈ કરવા સખત પ્રયત્ન કર્યો હતો.

સીતાહારનાં લક્ષણોની ટૂંકી રૂપરેખા તો પાછળ આપણે જોઈ ગયા હજી પણ તેમની સાધારણ વસ્તી છે, વિદ્વાન બેકરે ‘હંસરાજના મિત્રો’ એ નામના પુસ્તકમાં તેની ચાર જાતોની કુલ ૪૭૮ ઉપજાતો ગણાવી છે, અને ત્યાર પછી એ સંખ્યામાં ઘણો વધારો થયો છે. તેનું સિલોટેસી નામનું એક નાનું કુટુંબ છે, અને તે એક બીજા વર્ગની વનસ્પતિઓની સાથે વધારે ઘાઠ સંબંધ ધરાવે છે. ઉપરની સંખ્યામાં લેખકે આ કુટુંબને ગણ્યું નથી.

સીતાહાર ઉદ્ભિન્નજ્ઞેનાં બે કુટુંબો છે: એક જ જાતના અલિંગકોષોવાળું સીતાહારી (લાઇકોપોડિએસી), અને બે લિન્ન જાતનાં અલિંગકોષોવાળું હાથાયુકી (સીલેજિનેલીસી). સીતાહારી વિષે આપણે વધારે વિવેચન કરીશું નહીં, કારણ કે તે કુટુંબ જો કે બહુજ મહત્વનું છે, તોપણ તેનો ભૂતકાલીન ઇતિહાસ લગભગ અપ્રસિદ્ધ છે. સીતાહારની જાતમાં આશરે ૧૦૦ ઉપજાતો છે, અને તેઓ પૈકી ૫ ઉપજાતો ગ્રેટબ્રિટનની વતની છે. એ પાંચ પૈકી ચાર ઉપજાતો પર્વતો અને ડુંગરોની ઉપર ‘લીનાશવાળી જમીનમાં વસે છે,’ અને બાકીની એક

ઉપજાત (લાઈકોપોડિઅમ ધન-ડેટમ) હેમ્પશાયરના ન્યુફાન્સ્ટ વિગેરે લેન્ડવાળા નીચાણના પ્રદેશોમાં વધારે ઉગે છે. તે બધીનો દેખાવ બહુ જ મોટી લીલ વનસ્પતિના જેવો છે. તેમની કેટલીક ઉપજાતોના થડ બહુ જ લાંબા હોય છે, અને તેમની ઉપર બધી જગાએ અમ ખ્ય નાનાં માદાં પાંદડાંઓ ઉગેલા હોય છે. તેની ઘણી ઉપજાતોમાં એક જાતના શંકુઓ ઉત્પન્ન થાય છે. સાબરશૃંગી લીલમાં (સ્ટેગ્મ હોર્ન મોસ, લાઈકો કલેવેટમ) એ શંકુઓ ફાટાવાળાં લાંબાં દીંટાંઓની ટ્રેય ઉપર ઉગેલા હોય છે, અને તેથી તેઓ તરત ઓળખાઈ આવે છે. તોપણ, લાઈકો સ્પીલેગોમાં કોઈ ખાસ શંકુ જણાતો નથી, અને તેનાં સામાન્ય પાંદડાંઓની ઉપર જ અલિંગકોષાગારો ઉત્પન્ન થાય છે. તેની બધી વ્યક્તિઓમાં ફ્લીભૂત પાંદડાના ઉપલા પૃષ્ઠની ઉપર માત્ર એક જ અલિંગકોષાગાર આવેલું હોય છે. તેમના સ્થાનની સહેજસાજ વિવિધતાને ખાદ કરીએ, તો આ વર્ગના ણન્ને-સજાતીય અને વિજાતીય અલિંગકોષી-સભ્યોને ઉપરની વાત લાગુ પડે છે. લાઈકો-સ્પીલેગો નામની ઉપજાતમાં બીજ કણદલ અને પૌષ્ટિક પાંદડાંઓની વચ્ચે કાંઈજ ભેદ નથી, અને તેથી એ વનસ્પતિઓ નક્કી વધારે સાદી અને વધારે આદ્ય છે.

જ્યારે સ્પીતાહારની વનસ્પતિ ખાળક હોય છે, ત્યારે તેના થડની રચના વધારે સાદી હોય છે, તેના મધ્ય ભાગમાં કાષ્ઠનો સ્થંભ છે, અને તેને મોટા મોટા ખુણાઓ હોય છે, એ સ્થંભની બહારની બાજુએ વલ્કક હોય છે. પણ જેમ-જેમ એ

વનરૂપતિ વૃદ્ધ થતી જાય છે, તેમ તેમ તેના થડની રચના વધારે ક્ષિણ્પત્ત બને છે. હવે, કાષ્ઠ અને વડકકની ઘણી અવારનવાર પટ્ટીઓ ઉત્પન્ન થયેલી છે, અને તેઓ મોઢિ મોઢિ અનેક રીતે ગુંથાઈ ગયેલી લાગે છે. એ વાત ખાસ જાણવા જેવી છે, કે આ વિશિષ્ટ રચના ઘણીવાર મૂળીઆંમાં પણ સતત પથરાયેલી હોય છે. દરેક પાંદડામાં વાહિનીનો માત્ર એક જ રસો હોય છે અને તે ત્યાં ફાંટાયેલો હોતો નથી. આ સાદી રચના આખા વર્ગનું—ખડ્કે હાલની સીતાહારમાં સામાન્ય લક્ષણ છે. ટ્રેટ્રિટનમાં ઉછરતી સીતાહારની કેટલીક પરદેશી ઉપજતોમાં થડ બહુ જ મજબૂત અને પાંદડાં બહુજ પહોળાં હોય છે, પણ આખી જાતમાં થડની સામાન્ય રચના તો લગ-લગ સમાન જ હોય છે. થડની ટોચમાંથી બે ફાંટાઓ ઉત્પન્ન થાય છે, અને એ દરેક ફાંટાના અગ્રમાંથી પાછા બે ફાંટાઓ ઉત્પન્ન થાય છે, અને એ પ્રમાણે થયાં જઈ એ વનરૂપતિઓનો શાખા-તંત્ર બને છે.

તેનું અલિંગકોષાગાર જરા મોટું હોવાથી તે ખૂલ્લી આંખે જોઈ શકાય છે, અને ફલીભૂત પાંદડાની ઉપલી બાજુએ તેના પાયા આગળ તે વળજેલું હોય છે. તેમાં અસંખ્ય ઝીણું અલિંગકોષો ઉત્પન્ન થાય છે (દાડખાનામાં વપરાતો રાજના જેવો પદાર્થ). આ અલિંગકોષોનું અંકુરીભવન અને તેમનામાંથી ઉત્પન્ન થયેલી અનુસમાંગ ઉદ્દલિન્જને હમણાં થોડાંજ વર્ષો થયાં પ્રસિદ્ધિમાં આવ્યાં છે. તેમની બાજતમાં એક મુશ્કેલી એ છે, કે અંકુરીભવનની ક્રિયા શરૂ થાય તે પહેલાં

અલિંગકોષોને બહુજ લાંબા સમય સુધી આરામ લેવો પડે છેઃ લાઘકો સિલોગોમાં એ સમય ૩ થી ૫ વર્ષનો અને સાળર-શૃંગી લીલમાં ૬ થી ૭ વર્ષનો હોય છે. એટલા બધા લાંબા આરામ પછી પણ તેમનો વિકાસ બહુજ ધીમા હોય છે, તેથી તેમનાં અલિંગકોષોને વાવ્યા પછી લાઘકો સિલોગોમાં ૬ થી ૮ વર્ષે અને સાળરશૃંગી લીલમાં ૧૨ થી ૧૫ વર્ષે અનુસમાંગ પરિપક્વ થઈ જનનેદ્રિયો ઉત્પન્ન કરે છે. એટલિટનની વતની આ પાંચ ઉપજાતોમાં અને બીજી કેટલીકમાં અનુસમાંગ જમીનની અંદર જ પોતાનું જીવન ગાળે છે, કારણ કે એ વન-રૂપતિઓનાં અલિંગકોષો વરસાદના પાણીથી ઘસડાઈ જમીનમાં છેક ઉંડાં જાય છે, અને પછી ત્યાં તેમનું અંકુરીલવન શરૂ થાય છે. એ અનુસમાંગની ઘટનામાં હરિતક (કલોરોફિલ) નથી, અને એ સંજોગે આશ્ચર્યની વાત એ છે, કે કુગની મદદ સિવાય એ અનુસમાંગ વિકસી શકતી નથી. કુગ અનુસમાંગની પેશિઓમાં ફેલાઈ જાય છે અને તેઓ બન્ને પરસ્પર પરોણવી બને છે. એ વાત ઘણી નવાઈ ભરેલી છે, તોપણ ઘણી વન-રૂપતિઓની બાળતમાં એજ વ્યવસ્થા આપણી નજરે આવે છે.

તોપણ, અલગત આ વાત બધી સીતાહાર વનરૂપતિ ઓને લાગુ થતી નથી, કારણ કે લાઘકો ઈનડેટમ અને તેની બીજી પરદેશી ઉપજાતોમાં, અનુસમાંગ પૃથ્વીના પૃષ્ઠની ઉપરજ અથવા ઝાડની છાલ ઉપર ઉગે છે; તેમાંથી પાંદડાંઓના જેવી વસ્તુઓ કુટે છે, અને તેમનો રંગ લીલો હોય છે. હરિતકવાળી અન્ય ઉદ્ભિજ્જોની પેઠે તે પોતાની પુષ્ટિ જાતેજ મેળવી શકે છે.

દરેક બાબતમાં, એજ અનુસમાંગ બે જાતનાં લિંગી અવયવો ઉત્પન્ન કરે છે. તેમનાં શુક્રકોષોને સામાન્યરીતે માત્ર બેજ કોષકેશ હોય છે, અને તેથી હંસરાજનાં શુક્રકોષોથી આ બાબતમાં તેઓ લિન્ન છે. શુક્રકોષના સાધનથી અંડ-કોષનું ફલન થયા પછી ગર્ભનો વિકાસ થાય છે, અને તે બહુજ લાંબા સમય મુધી અનુસમાંગની ઉપર જ વળગી રહે છે.

એકજ જાતનાં બધાં અલિંગકોષવાળો સીતાહારનો બીજો સભ્ય માત્ર એકજ છે, અને તેનું નામ ફાઇલોગ્લોસમ છે. આ સૂક્ષ્મ સીતાહાર ઉદ્દલિન્નજ ઑસ્ટ્રેલિઆ અને ન્યુઝી-લાંડમાં આજે ઉગે છે. તેનું થડ ગાંઠાળું (ટ્યુબરસ) અને ટુંકું હોય છે અને તેને થોડાં સાદાં પાંદડાં અને એક નાનો શંકુ હોય છે. લાઇકો ઇનન્ડેટમની પેઠે તેની અનુસમાંગ પણ લીલા રંગની હોય છે. આ જાત બહુજ રસુજ છે, કારણ કે પરિપક્વ દશામાં એ વનસ્પતિ સીતાહારની કેટલીક ઉપજાતોના ગર્ભની દશાને બહુજ મળતી આવે છે. તોપણ, એનો અર્થ ફાઇલોગ્લોસમ આદ્ય વનસ્પતિ છે, અથવા તે ઘસાઈ બઈ નાની બની ગયેલી છે વિગેરે અનુમાનો એકદમ કરવાં તદ્દન અયોગ્ય અને અસ્થાને છે. આ પ્રશ્નનો હજી કાંઈ છેવટનો ખુલાસો થયો નથી.

સીતાહારીનું કુટુંબ બહુજ આશ્ચર્યકારક અને એકલ-વાયું છે, અને ઘણે ભાગે તે એક પ્રાચીન કોમનું વંશજ છે. કમનસીબે, તેના ભૂસ્તરવિદ્યા વિષયક ઇતિહાસ અંગ્રાંધે આપ-

ણને કાંઈજ માહિતી નથી. ત્રિગુણિત યુગના ઉપલા ખડકો-
માંથી હાથ આવેલી નૈઐદિતાં નામની ઉદ્દલિન્ન સીતાહારને
ઘણે અંશે સમાન છે. તોપણ, હાલમાં આપણી પાસે સીતાહાર-
નું એકકે એવું જીવશેષ નથી કે જેમાં બધાં અલિંગકોષો
એકજ જાતનાં હોવાનું નક્કી થઈ શકે. જ્યાં જ્યાં પુરાવો
સંતોષકારક છે, ત્યાં ત્યાં સીતાહાર ઉદ્દલિન્નને જે જાતનાં
અલિંગકોષો ઉત્પન્ન કરતી હતી એમ સાબીત થયું છે. એ
વનસ્પતિઓમાં બધાં અલિંગકોષો કેવળ એકજ જાતનાં હતાં,
એવું કેવળ તેમનાં જીવશેષોના જ સાધનથી સાબીત કરવું
તદ્દન અશક્ય છે; કારણકે એ વનસ્પતિનાં સૂક્ષ્મ અલિંગકોષો
અને તેનાં એકજ જાતનાં બધાં સામાન્ય અલિંગકોષોને એક-
મેકથી આપણે ઓળખી શકતા નથી. પણ આપણને મોટું
અલિંગકોષ પ્રાપ્ત થયું કે તરતજ તેઓ જે જાતનાં કોષો
ઉત્પન્ન કરતી હતી એ વાત તરત સાબીત થાય છે.

હવે આપણે હાથાયુડી (સીલેનિનેલેસી) નામની વિ-
જાતીય અલિંગકોષોવાળી સીતાહારી ઉદ્દલિન્નને સંબંધે વાત
કરીએ. એ કુટુંબની ઉત્ક્રાંતિના ઇતિહાસથી આપણે સંપૂર્ણ
રીતે વાકેફ થયા છીએ. હાથાયુડી (સીલેનિનેલા) અને
આઇસોઇટિસ નામની એ કુટુંબની જે જાતો પરસ્પર
અત્યંત લિન્ન છે, અને ઘણે ભાગે તેમની વચ્ચે કાંઈજ ઘાટું
સામ્ય નથી.

હાથાયુડીને ઘણીજ ઉપજાતો છે; કયુ શહેરના વિદ્વાન

મી. બેકરે ઈ. સ. ૧૮૮૭ માં તેની ૩૩૪ ઉપજતો ગણાવી હતી, અને ભવિષ્યના લેખકોએ તેમની સંખ્યા લગભગ ૫૦૦ હોવાનું જાહેર કર્યું છે. તેઓ બહુજ મુંદર વનસ્પતિઓ છે, અને તેઓ પેદી ઘણી ઉદ્ભિજ્ઞને કૃત્રિમ મંડપોમાં ઉમંગથી ઉછેરવામાં આવે છે. ઘણીવાર તેઓ સીતાહારની ઉપજત હોવાનો ભાસ થાય છે, કારણકે તેઓ તેમને ઘણે અંગે સમાન લાગે છે, તોપણ તેમનો જીવન-ધૃતિહાસ સીતાહારથી બહુજ ભિન્ન અને દેખાવમાં સામાન્ય રીતે વધારે મુંદર હોય છે.

સીલેજિનેસા સ્પીનોસા નામની ટ્રેટિસિટનની માત્ર એકજ ઉપજત ભીનાશવાળાં સ્થળોએ અને પર્વતોની બાજુઓ ઉપર ઉગતી આપણને જણાતી નથી. સીતાહારની ઘણી ઉપજતોની પેઠે આ ઉપજતનાં બધાં પાંદડાંઓ પરસ્પર સમાન છે. તોપણ હાથાચુડીની બાબતમાં, સામાન્યતઃ, પાંદડાં બે જાતનાં હોય છે; થડની ઉપર પાંદડાંની ચાર હાર 'ઉગેલી' હોય છે—બે મોટાં પાંદડાંની અને બે નાનાં પાંદડાંની—અને જ્યારે થડ જમીનની ઉપર ઘસડાતું ઉગે છે, ત્યારે નાનાં પાંદડાંઓ તે થડની ઉપલી બાજુએ ઉગેલાં હોય છે. ઘણી ઉપજતોમાં, પાંદડાંવાળી આ ડાળીઓ એક સપાટીમાં પથરાયેલી હોય છે, અને તેથી તેમનો સામાન્ય દેખાવ હંસરાજના અંચુકત જનનપણુંને વધારે મળતો આવે છે.

ગોર્નિઓમાં ઉગતી સિલેજિ ટ્રેન્ડિસ વિગેરે આ કુટુંબની ક્રેટલીક ઉપજતો ટટાર ઉભી રહે છે, અને નાનાં

વૃક્ષોની પેઠે તેઓ એ કે વધારે કુટ ઉંચી વધે છે. અંગારયુગનાં રાક્ષસી સીતાહારનાં જંગલો કેવો દેખાવ આપતાં હશે તેનો આ ઉદ્ભવિત્ત્વે આપણને મહેજ ખ્યાલ આપે છે. સિલેજિ વિદહેનોવી વિગેરે પૂર્વ તરફના ગરમ દેશોમાં ઉગતી કેટલીક ઉપજતો તો એથી પણ વધારે ઉંચી વધે છે; તેઓ પાસેનાં ખીજાં વધારે જોરાવર વૃક્ષોની ડાળીઓને ટેકવી લગભગ ૨૦ કે તેથી પણ વધારે કુટ ઉંચે જાય છે.

હાથાયુડીનું એક બહુ જ સામાન્ય લક્ષણ તેની પાંદડાં-હીન ડાળીઓ છે. તેઓ થડના અથ્રમાંથી ચીપીઆની માફક ઉગી આવી નીચી વળી જમીન તરફ વધે છે, અને જમીને પહોંચતાં જ તેમનામાંથી મૂળીઆં ઉત્પન્ન થાય છે. આ મૂળધારી વસ્તુઓ જાતે થડ છે કે મૂળીઆં છે તે હજી મુધી નક્કી થયું નથી. એ કુટુંબની બાબતમાં આ મધ્યસ્થ અવયવોની હાજરી બહુ જ મહત્વનું દર્શક છે, અને એ દર્શક ઘણી સીતાહાર ઉદ્ભવિત્ત્વેમાં એક કે બીજા રૂપમાં સાધારણ છે.

એ આખી જાતના બધા સભ્યોમાં અલિંગકોપધારી અવયવોનું સ્વરૂપ ખરેખર શંકુઓના જેવું જ છે, અને તેમનાં સામાન્ય પૌષ્ટિક પાંદડાંઓથી આ ફલીભૂત પાંદડાંઓની વ્યવસ્થા તદ્દન જૂદી જ જાતની છે.

તેની વિવિધ ઉપજતોમાં થડની રચના અત્યંત વિવિધ છે. અત્યંત સાદી જાતોમાં (દાખલા તરિકે, સિલેજિ.રિપનો-

આમાં) થડના મધ્ય ભાગમાં કાઢનો માત્ર એક જ સ્થંભ હોય છે. આ કાઢ બહારની બાજુએથી ધીમે ધીમે અંદરની બાજુ તરફ વધતું જાય છે, અને તેના સ્થંભની આસપાસ વલ્કલનો પ્રદેશ છે. તોપણ ઘણી ઉપજતોમાં, થડની અંદર બે કે વધારે છૂટા અને વિવિધ આકારના વાહિનીઓના નળાઓ હોય છે; અને કેટલીક ઉપજતોનાં થડમાં તેમની વ્યવસ્થા બહુ જ ઉંચી જાતની અને વધારે ક્લિષ્ટ હોય છે. તોપણ, પાંદડાંઓની રચના, મુખ્યત્વે સીતાહારના જેવી જ સાદી હોય છે.

તેનું એક ખાસ લક્ષણ, દરેક પાંદડાની ઉપલી બાજુએ તેના પાયા આગળ જીભના આકારની ઉગેલી એક વસ્તુ છે, અને તે જીભકના (લિગ્યુલ) નામથી ઓળખાય છે. એ વસ્તુમાંથી બલક (મ્યુસીલેજ) નામનો પ્રવાહી પદાર્થ ઝમી કળીમાં સહેલાં બાળક અવયવોને ભીનાં રાખે છે. હાથાયુડી અને આઇસોઇટિસ બન્નેમાં પૌષ્ટિક કે ફ્લોભૂત બન્ને જાતનાં બધાં પાંદડાંઓની ઉપર હમેશાં જીભક હાજર હોય છે, અને પ્રાચીન જીવયુગની તેમની મિત્રોની બાજતમાં પણ તે ઘણે ભાગે ઉગતું હતું. એ રીતે, આ લક્ષણ બહુજ અગત્યનું છે, કારણ કે તેના સાધનથી હાથાયુડી અને તેની મિત્રોનાં જીવશોષોને આપણે સજાતીય અલિંગકોષોવાળી સીતાહારીનાં જીવશોષોથી તુરત અને સહેલાઈથી ઓળખી શકીએ છીએ.

ખીજ બધી સીતાહારી ઉદ્ભિજ્જ્ઞેની પેઠે હાથાયુડીમાં પણ દરેક ફ્લોભૂત પાંદડાની ઉપર માત્ર એકજ અલિંગ-

કોષાગાર ઉગેછે; તોપણ, હાથાયુડીમાં અલિંગકોષાગાર કક્ષસ્થ (એકસીલરી) હોય છે, એટલે પાંદડાની ઉપરજ ઉગવાને બદલે થડ અને તેના ફ્લીમ્બ્રૂટ પાંદડાની વચ્ચે તથા ખૂણામાંજ તે ઉત્પન્ન થાય છે. તોપણ આ ભેદ બહુ જ નજીવો છે.

બન્ને જાતનાં અલિંગકોષાગારો, સામાન્ય રીતે, એકજ શંકુમાં ઉત્પન્ન થાય છે; નાનાં અલિંગકોષો ઉત્પન્ન કરનારાં કોષાગારો શંકુના ઉપલા ભાગમાં, અને મોટાં અલિંગકોષો ઉત્પન્ન કરનારાં કોષાગારો તેના નીચલા ભાગમાં હોય છે. શંકુ ગમે તે સ્થિતિમાં હોયો હોય તોપણ મોટાં અલિંગકોષાગારો તેની નીચલી ખાણુએજ ઉગે છે, અમુક જગા મુધી, ઉગેલાં બન્ને જાતનાં અલિંગકોષાગારોનો વિકાસ સમાન હોય છે, અને તેમની સંખ્યા પણ મોટી હોય છે. આ જનક-અલિંગકોષાગારો છે. જે જનક-અલિંગકોષાગારોમાં નાનાં અલિંગકોષો ઉત્પન્ન થવાના હોય તેમનું દરેકનું વિભાજન ઘઈ ચાર અલિંગકોષો બને છે, અને પરિણામે અગણિત સૂક્ષ્મ અલિંગકોષો જન્મ પામે છે. પણ, મોટાં અલિંગકોષો બનાવવાને માટે માત્ર એકજ જનક કોષાગારનું વિભાજન થાય છે, અને પરિણામે માત્ર ચાર અલિંગકોષો ઉત્પન્ન થાય છે. તેઓ વધી બહુજ મોટાં થાય છે અને તે આખા અલિંગકોષાગારને ભરી દે છે. સામાન્ય રીતે સૂક્ષ્મ અલિંગકોષાગારથી આ કોષાગાર પ્રમાણમાં વધારે મોટું હોય છે. કેટલીકવાર, એ ચારે કોષોને બદલે માત્ર ત્રણ, બે કે એકજ કોષ વૃદ્ધિગત થાય છે. સામાન્યતઃ, મોટાં અલિંગકોષોનો વ્યાસ નાનકડાં અલિંગકોષોનો બે-ત્રણ ગણ હોય છે.

ગોકોપના વ્યાસથી દસગણો મોટો હોય છે, એટલે તેમના કદનું પ્રમાણ ૧૦૦૦ : ૧ છે; કેટલીકવાર આ પ્રમાણ એથી પણ વધારે મોટું હોય છે.

મોટા કોષાગારની અંદરજ મોટા અલિંગકોષનું અંકુરી-લવન થઈ અનુસમાંગ ઉત્પન્ન થાય છે. સામાન્ય રીતે, ત્યાર પછી એ મોટાં અલિંગકોષો ખરી પડે છે, અને અનુસમાંગ વધારે વિકસી કોષની દિવાલને તોડી બહાર નીકળી જાય છે; તોપણ, તે લીલો રંગ ધારણ કરતી નથી. એ દરમ્યાન નાનાં અલિંગકોષો પણ ખરી પડ્યાં હોય છે, અને દરેકનો વિકાસ થઈ એક નાનો કોષ-સમૂહ બને છે. આ વસ્તુઓ પરાગકોશકે છે, અને તેમાંથી જ કોષકેશવાળાં ઘોડાં શુક્રકોષો બહાર નીકળી આવે છે. જો તે વખતે પાણી હાજર હોય, તો તેઓ તેમાં કોષકેશના સાધનથી તરી પાસે પડેલી કોઈ સ્ત્રિલિંગ અનુસમાંગની સ્ત્રીકૃપી તરફ જાય છે. હંસરાજની પેઠે, સ્ત્રીકૃપીમાંથી માલિક એસિડ નામનો પદાર્થ પાણીમાં ઝમે છે, અને શુક્રકોષો તે પદાર્થને લીધે સ્ત્રીકૃપીના સ્થાન તરફ આકર્ષાય છે. પછી તેમના મેળાપથી ફલન થાય છે, અને આ ક્રિયાને અંતે ગર્ભ ઉત્પન્ન થાય છે. અનુસમાંગની ઉપર આવેલા મોટા કોષાગારમાં જ એ ગર્ભ કેટલોક સમય પડી રહે છે.

આપણે પાછળ વાંચી ગયા, કે કેટલીક ઉપજાતમાં ફલન અલિંગકોષાગારમાં જ થઈ ગર્ભ ઉત્પન્ન થાય છે. મોટું અલિંગકોષાગાર જનક વનસ્પતિના ઉપરથી ખરી પડતું નથી, અને

ત્યાંને ત્યાંજ ગર્ભનો વિકાસ થઈ નવી બાળક વનસ્પતિ ઉત્પન્ન થાય છે. પણ આ દૃશ્ય કેવળ અપવાદરૂપ છે, અને બધી ઉપજાતોમાં એમ બનતું નથી. તોપણ, વધારે ઉચ્ચ કોટિની બીજધારી ઉદ્ભવિત્ત્વેના નિયમિત વિકાસમાં જે વાત બને છે તેને આ દૃશ્ય બહુજ મારી રીતે મળતું આવે છે. તોપણ, હાથાયુડીની બાળતમા બીજ ઉત્પન્ન થતું નથી, કારણકે અલિંગકોષાગારનું સ્વરૂપ તેનું તેજ કાયમ રહે છે.

એ રીતે, હાથાયુડીનું વિજાતીય અલિંગકોષો ઉત્પન્ન કરવાનું લક્ષણ બહુ જ મારી રીતે સ્પષ્ટ થાય છે. આ વાત કેવળ સત્ય છે, કારણ કે પ્રાચીન જીવયુગથી જ એ ઉદ્ભવિત્ત્વે એજ રીતે પુનરુત્પત્તિનું કાર્ય કરે છે એમ પ્રત્યક્ષ પુરાવાથી સાબીત થયું છે. ખરેખર, એ યુગ પૂરે થયે ત્યાર પહેલાં ક્યારનોયે તેમજે આવો ઉચ્ચ વિકાસ પ્રાપ્ત કર્યો હતો.

વિજાતીય અલિંગકોષવાળી આઈસોઘટિસ નામની સ્ત્રીતાહારની બીજ મજબૂત દેખાવમાં હાથાયુડીથી તદ્દન ભિન્ન છે. તેની લગભગ ૫૦ ઉપજાતો છે, અને તે તેઓ મર્વે ઘણે ભાગે જલવાસી ઉદ્ભવિત્ત્વે છે. એક ઉપજાત ટ્રિટ-પ્રિટનનાં ઘણાં મરોવરોમાં કેવળ પાણીની મપાટી નીચે ઉગે છે. સૂકી જમીન ઉપર ઉગનારી આઈસોઘટિસની બે ઉપજાતો પૈકી એક જર્નસીના ટાપુમાં ઉછરે છે, અને તેથી તેને ટ્રિટપ્રિટનની વતની ગણવામાં આવી છે. એકંદરે, તેની ભૂવાસી અને જલવાસી ઉપજાતોની સંખ્યામાં કાંઈ મહત્વનો તફાવત નથી.

વનસ્પતિની આ જાત લાંબા સમય સુધી પાણી અને જમીનની વચ્ચે રખડેલી હોય એમ લાગે છે.

ખદી ઉપજતોમાં થડ બહુ જ ઠીંગણું હોય છે, અને તેઓ ઉંચાઈમાં ઓછાં અને પહેળાઈમાં વધારે વધે છે. તેમાં ખીચાખીચ ઉગેલાં લાંબાં પાદડાંઓ પીંછાના આકારનાં હોય છે. પૌષ્ટિક અને ફલીભૂત પાંદડાંઓની વચ્ચે કોઈ અવિકાસી ભેદ નથી, અને તેથી તેમની બાબતમાં શંકુ ઉત્પન્ન થતો નથી.

થડના નીચલા પૃષ્ઠમાં ઉંડી ખાંચો હોય છે, અને તેથી થડમાં બે, ત્રણ કે ઘણીવાર ચાર દળદાર ભાગ પડે છે: ખાંચોની બાજુઓમાંથી મૂળીઆં ઉત્પન્ન થાય છે.

એ ઉપજતની અંતર્ઘટનામાં, બહુ જ અગત્યનું લક્ષણ એ છે, કે તેનું થડ પરિવર્ધિની પેશિને લીધે અત્યંત જાડું થયાં જ જાય છે. સજીવ પ્રચન્ન બીજા ઉદ્ભવજ્ઞેમાં આ વાત ભાગ્યે જ બને છે. પરિવર્ધિની પેશિ નવું કાષ્ઠ અને વડકક બહુ જ મોટા પ્રમાણમાં ઉત્પન્ન કરે છે, પણ સુખ્યત્વે મધ્ય ત્વચાનો જ (કોર્ટેક્સ) ભાગ વૃદ્ધિંગત થાય છે. આ આખી ક્રિયાનું સ્વરૂપ કાંઈક વિશિષ્ટ છે, અને દ્વિદળ કે વિવૃત-ખીજામાં જે પદ્ધતિએ નવું કાષ્ઠ ઉત્પન્ન થાય છે તેથી આ ક્રિયા તદ્દન ભિન્ન છે. એ નવાઈ ભરેલી વાત છે, કે સિલેન્જિનેસા સ્પિનોસા નામની ઉપજતમાં થડનો પાયો પૂણ્ણ એજ રીતે જાડાઈમાં વધે છે. આઈસોઈટિસનાં પાંદડાંમાં વાહિનીઓનો માત્ર એકજ રેખો હાજર હોય છે. અને એ

સંક્ષણ આ ઉદ્દલિંગનેનું એક મુખ્ય લક્ષણ છે. હાથાયુડીની પેઠે, તેમનાં પાંદડાંમાં પણ હમેશાં છલક હાજર હોય છે.

આ ઉપલતમાં મૂળીઆં બહુજ અગત્યની વસ્તુ છે, કારણ કે તેમની રચના કેટલેક અંશે પાંદડાને મળતી આવે છે; તેના વાહિની-તંત્રમાં કાળનો અને વલ્કકનો માત્ર એકજ રસો હોય છે. આદર્શરૂપ મૂળીઆમાં આ દરેક વસ્તુના બે કે વધારે રેમાઓ હાજર હોય છે. હાથાયુડીમાં પણ મૂળી-આંની એવીજ રચના હોય છે.

આધમોઘટિસનાં અલિંગકોષાગારો અત્યંત મોટાં હોય છે, અને ઘણીવાર તેઓ બરાબર ૩ ઇંચ લાંબા હોય છે, પાયા અને છલકની વચ્ચે ફલીભૂત પાંદડાંની ઉપલી બાજુએ બખોલો હોય છે, અને દરેક બખોલમાં એક એક અલિંગકોષાગાર ઉત્પન્ન થાય છે.

આધમોઘટિસનાં અલિંગકોષાગારો અત્યંત મોટા હોય છે, અને ઘણીવાર તેઓ બરાબર ૩ ઇંચ લાંબાં હોય છે. ફલીભૂત પાંદડાંની ઉપલી બાજુએ, તેના પાયા અને છલકની વચ્ચે આવેલી બખોલમાં એક કોષાગાર ઉત્પન્ન થાય છે. પુખ્તપાંડતા હાંકણની પેઠે, તેની ઉપર પણ ઘણી વાર ઝીણું પડ હોય છે, અને તે કોષાગારની લગલગ ચારે બાજુએ વિંટળાયેલું હોય છે. એ વાત ધ્યાનમાં રાખવાની છે, કે આધમોઘટિસમાં અલિંગકોષાગારનું જનક કેવળ પાંદડું જ હોય છે, અને તેજ પાયાનો મોટો ભાગ તેણે જ રોકેલો હોય છે, તેની રચના જરા

વધારે કિલ્ખટ છે, કારણ કે સ્તરીભૂત પેશિના પટાઓથી એ ખખેલ ચાર ભાગમાં વહેંચાયેલી જણાય છે.

અલિંગકોષાગારનો એક ખામ સમૂહ અસંખ્ય નાનાં અલિંગકોષો ઉત્પન્ન કરે છે, અને તેના મોટા કોષાગારમાં પણ મોટાં અલિંગકોષોની સંખ્યા ૪૦ થી પણ વધારે હોય છે.

તેમનો ભવિષ્યનો વિકાસ લગલગ હાથાયુડીનાં એ અંગોના જેવો જ હોય છે; પણ આઈસોઈટિસની બાબતમાં સૂક્ષ્મ અલિંગકોષના પરાગકોષકમાંથી માત્ર ચાર શુક્રકોષો ઉત્પન્ન થાય છે, અને હંસરાજનાં શુક્રકોષોની પેઠે તેમને અસંખ્ય કોષકેશ હોય છે. આપણે પાછળ વાંચી ગયા કે બીજી સીતાહાર ઉદ્દલિન્નજેમાં શુક્રકોષને માત્ર બેજ કોષકેશ હોય છે.

અલિંગ અનુસમાંગ મોટા કોષાગારની અંદરજ ઉગે છે, અને અલિંગકોષનું ઝીણું પડ જ્યારે ફાટી જાય છે, ત્યારેજ તે ખૂલ્લું થાય છે. તેનું ફલનનું દૃશ્ય પણ હાથાયુડીના જેવું જ હોય છે, અને ગર્ભનો વિકાસ થઈ તેનો જીવનક્રમ સંપૂર્ણ બને છે.

વિજાતીય અલિંગકોષાગારવાળી સીતાહારની આ બે જીવંત જાતો એ રીતે પરસ્પર બહુજ લિન્ન છે. ઘણે ભાગે અવતરણ વૃક્ષની તેઓ બે લિન્ન શાખાઓ છે, અને પ્રાચીન-જીવયુગથી તે આજ મુઘી તેમનો જીવનક્રમ પરસ્પરથી તદ્દન સ્વતંત્ર અને અલગ રહેલો છે. કયાં કારણોને લીધે આપણી આવી મન્યતા થઈ ?

હાથાયુડીના ભૂસ્તરવિધાને લગતા ઇતિહાસને આપણે અંગારયુગ સુધી સારી રીતે અનુસરી શકીશું. તૃતીયયુગ અને મધ્યજીવયુગનાં તેનાં જીવજોયો બહુ મહત્વનાં નથી; તેઓ કેવળ આ ઉદ્ભવિજ્ઞની વંશરેખાને સતત સાંધી તેને અતૂટક બનાવે છે; પણ પ્રાચીન જીવયુગના ખડકોમાંથી એ સંબંધે બહુજ ઉત્તમ અને સંપૂર્ણ પુરાવો મળી આવે છે, અને ત્યાંથી આપણને તેની ઘણી અગત્યની ઉપજ્ઞતાનાં જીવજોયો પ્રાપ્ત થાય છે. એ યુગનાં તે કુટુંબના જીવજોયો સિલેજિનેલાઈટિસના નામથી ઓળખાય છે, પણ તેઓ પૈકી ઘણાં જીવજોયો હાલની જીવંત હાથયુડી ઉદ્ભવિજ્ઞોથી એકદમ ઓળખી શકાતાં નથી. અંગારયુગના ખડકોમાંથી હાથ આવેલી સિલેજિ પ્રિમિવસ નામની ઉપજ્ઞતાનાં પાંદડાંઓમાં હાલની વિવિધ ઉદ્ભવિજ્ઞોનાં લક્ષણો હાજર છે, અને તેમની ઉપર અમુક જ્ઞતાના શંકુઓ ઉગેલા છે. તેમનાં અલિંગકોષાગારો પણ એ અવયવોમાં અકબંધ સંચવાઈ રહ્યાં છે. એ દરેક કોષાગારમાં ચાર મોટાં અલિંગકોષો હાજર હતાં. હાલની જીવંત હાથયુડીમાં પણ એવીજ વ્યવસ્થા હોય છે. તે આખી વનસ્પતિ ખરેખર એજ જ્ઞતાની સમ્ય હોવી નોંધ્યે, કારણ કે એ ઉપજ્ઞતા પ્રાચીન જીવયુગથી તે આજ સુધી બહુજ અદ્ભુત રીતે એકરૂપ રહેલી છે. સિલેજિનેલાઈટિસની બીજી ઉપજ્ઞતા વધારે વિશિષ્ટ હતી. ફ્રાન્સમાં અંગારયુગના ઉપજ્ઞા ખડકોમાંથી મળી આવેલી સિલેજિસુઈસીનું થડ હમેશાં અગ્રમાંથી જ ફાટતું હતું, અને તેની ઉપર, હાલની ઘણી ઉપજ્ઞતાની જેમ, એ લિલ્લ કદની પાંદડાંઓની ચાર હાર ઉગેલી હતી. તેના શંકુઓ, છ ઇંચ

સાંખ્યા હતા; ઉપલા ભાગનાં અલિંગકોષાગારમાં અસંખ્ય સૂક્ષ્મ અલિંગકોષો હતાં, અને નીચલા ભાગનાં અલિંગકોષાગારો પૈકી દરેકમાં ૧૬થી૨૪ મોટાં અલિંગકોષો હતાં, અને તેમનો વ્યાસ સૂક્ષ્મ અલિંગકોષોના વ્યાસથી ૧૦ ગણો હતો. કોષાગારમાં મોટાં અલિંગકોષોની આટલી બધી મોટી સંખ્યા ઉત્પન્ન થતી હતી એ વાત ઉપરથી એવું સ્પષ્ટ સૂચન થાય છે, કે હાલની હાથાયુડીથી તે વનસ્પતિ ઓછી વિકસિત હતી. અંગારયુગના ખડકોમાંથીજ હાથ આવેલી એક ખીજ ઉપજત પણ એવુંજ લક્ષણ પ્રગટ કરે છે, વધારેમાં, તેનાં અલિંગકોષો ગારો સામાન્ય પાંદડાંની કક્ષાઓમાંજ (એક્સીલ્સ) ઉત્પન્ન થતાં હતાં. એ ઉપજતમાં કોઈ ખાસ શંકુ ઉત્પન્ન થતો ન હતો. સીતાહારમાં પણ આવી સારી વ્યવસ્થા છે, પણ હાલની હાથાયુડીમાં તેવી વ્યવસ્થા ગેરહાજર છે. આ વાતો ઉપરથી એમ જણાશે, કે અંગારયુગમાં આ વનસ્પતિ સમૂહના કેટલાક સભ્યો તેની હાલની વંશજોના જેટલાજ ઉત્ક્રાંત થયેલા હતા, અને કેટલાક સભ્યો ઉત્ક્રાંતિમાં ધીમે ધીમે પાછળ પડતા હતા. તોપણ, બહુજ નવાઈ ભરેલી વાત એ છે, કે દેખાવમાં હાથાયુડીને મળતી આવતી એજ યુગની એક અન્ય વનસ્પતિ ઉત્ક્રાંતિમાં તેના હાલના કોઈપણ સજીવ મિત્રથી વધારે આગળ ધસી હતી, અને યથાર્થ ખીજના જેવુંજ એક વિશિષ્ટ અવયવ તેની ઉપર ઉત્પન્ન થતું હતું. ઉત્તર-ઈંગ્લાંડમાં, અંગારયુગના નીચલા ખડકોમાં આવેલા કોલસાના ગોળાઓમાં, મિએકે-સ્મીઆ નામની આ ઉદ્ભિજ્જનેનાં અશ્મીભૂત જીવશેષો મુરક્ષિત રહેલાં છે. તેની રચનાનો સંપૂર્ણ અભ્યાસ થયેલો છે.

તેનું થક બહુજ પાતળું છે, અને તેની ઉપર પાંદડાંઓની ચાર હાર ઉગેલી હોય છે. પાંદડાંઓની કિનારી ઉપર વાળ હોય છે, અને તેમનાં ઉપલાં પૃષ્ઠની ઉપર મુંદર વિકાસ પામેલું જીલક ઉગેલું હોય છે. થડની રચના હાથયુડીની એક વધારે સાદી ઉપ-જાતને વધારે મળતી આવે છે.

જનનેન્દ્રિયોનો સમૂહ એક ઢીલા શંકુનો દેખાવ આપે છે; દરેક બીજકણુદલના ઉપલા પૃષ્ઠની ઉપર એક અલિંગકો-પાગાર હોય છે, અને તેમાં વિશાળ કદનું માત્ર એક જ મોટું અલિંગકોષ હોય છે. બીજના ગર્ભકોશની પેઠે, આ અલિંગ-કોષાગારની આખી બખેલને તે દરેક સ્થળે અડકેલું હોય છે. મોટા અલિંગકોષમાં રહેલી અનુસમાંગ કેટલીક વાર બહુ જ સુરક્ષિત રહેલી હોય છે. મોટા કોષાગારની આસપાસ ચારે બાજુએ એક પાતળું પડ વીંટાળાયેલું હોય છે; અલિંગકોષા-ગારને ફરને છેડે માત્ર દારક નામનું એક સાંકડું છિદ્ર ખૂદ્લું હોય છે. એ પાતળા પડની ઉપર અનેક લાંબા ભૂજ ઉગેલા હોય છે, અને તેઓ દારકથી પણ આગળ વધેલા હોવાથી એવું અનુમાન થાય છે, કે તેઓ સૂક્ષ્મ અલિંગકોષોને ત્યાં પકડી રાખવાનું કામ કરતા હશે. અલિંગકોષાગારના પાયા આગળ બીજકણુદલને પૌષ્ટિક પત્રની પેઠે જ એક જીલક ઉગેલું હોય છે. બીજકણુદલનું ફલક એટલે પાતુ પડેલું હોય છે, અને અલિંગકોષાગારની દરેક બાજુએ તે આગળ પડતું રહે છે, તેથી જ્યારે એ આખું પાંદડું ખરી પડે છે ત્યારે સામાન્ય પ્રેક્ષકને તેનો દેખાવ સપત્ર બીજના જેવો જ લાગે છે.

આપણે પાછળ વાંચી ગયા, કે પ્રાચીનજીવયુગની સીતાહાર ઉદ્ભિન્નજ્ઞે બીજધારી વનરૂપતિઓની સાથે હરિશ્ચંદ્ર કરવા સંપૂર્ણ પ્રયાસ કરતી હતી. હાથાયુડીના જેવી લાગતી મિએડેસ્મીઆ નામની સીતાહારની માત્ર એકજ ઉપજાત લગભગ યથાર્થ બીજ ઉત્પન્ન કરતી હતી. એ ઉપજાતની બાબતમાં પરિવેષ્ટન અને તેમાં રહેલું એક જ મોટું અલિંગકોષ છેવટ મુઘી અલિંગકોષાગારમાં જ રહેતાં હતાં એ આપણે પાછળ જોઈ ગયા, અને એ બન્ને બીજનાં મુખ્ય લક્ષણો છે. તોપણ, તેનું ફલીભૂત પાંદડું એ બીજ જેવી લાગતી વસ્તુનું ઉપાંગ હતું, અને કોમ્પોઝીટીના (એક વનરૂપતિ) ફળની જેમ તે આમું પાંદડું જમીન ઉપર ખરી પડતું હતું.

અંગારયુગની એક બહુજ નાની સીતાહાર ઉદ્ભિન્નજ્ઞમાં પુનરૂત્પત્તિની રીતનો આટલો બધો વિકાસ થયો હતો, અને બહુજ ઉંચી કોટિની ઉદ્ભિન્નજ્ઞેની એજ ક્રિયાને તે લગભગ સમાન હતી એ વાત બહુજ નવાઈ ભરેલી છે. જો મિએડેસ્મીઆ ખરેખર હાથાયુડી કુટુંબની સભ્ય હોય—અને એ વાત ઘણું અંશે સત્ય છે—તો આપણે એમ કબૂલ કરવું પડશે, કે પુનરૂત્પત્તિની બાબતમાં તો તે તેના કુટુંબની કોઈ પણ જાણીતી વનરૂપતિથી વધારે ઉત્ક્રાંત થઈ હતી. તેના કુટુંબના હાલના બીજ બધા સજીવ સભ્યોથી પણ તે વધારે ઉંચો વિકાસ પામેલી હતી. બીજનાં ઘણાં કુટુંબોની બાબતમાં બન્યું છે તેમ, આ બાબતમાં પણ ઓછી વિકસિત વનરૂપતિઓ જીવનકક્ષમાં વિજયવંત નિવડી ટકી રહી શકી, અને તેની

વધારે ઉત્કાંત મિત્રોનો તદન નાશ થયો. એ વાત ધ્યાનમાં રાખવાની છે, કે તે સમયે પણ સામાન્યતઃ બીજના સાધનથી પુનરૂત્પત્તિ થતી હતી, તોપણ, તે વખતે એવું જોર વિશેષ ન હતું. ભવિષ્યમાં તો એજ રીત પૃથ્વીના અંગેઓને વધારે અનુકૂલ બની. પ્રાચીનજીવયુગનાં બીજમાં ગર્ભ હમેશાં ગેરહાજર હતો, અને તેથી એવું સૂચન થાય છે, કે બીજના સાધનથી થતી પુનરૂત્પત્તિને એ સમયે સંયોગો ઘણે ભાગે બહુજ પ્રતિકૂલ હશે. આ પરિસ્થિતિમાં એમ બનવું સંભવે છે, કે બીજની દિશામાં થતો પ્રયોગ ભવિષ્યના કરતાં વધારે સફળ બને અને બીજધારી ઉદ્ભલિન્નજોની મુખ્ય શાખાની સાથે હરિદ્રાઈ કરી તેમાં વિજયી બનવાનો પણ વધારે સંભવ રહે.

ત્યારે મિએડેસ્મિઆની બાબતમાં પુનરૂત્પત્તિ બીજના સાધનથી કેવી રીતે થવા લાગી ? આ પ્રશ્નનો ખુલાસો મેળવવા માટે, ખરેખર, આપણે કેવળ અનુમાન બાંધવાનાં છે. આ નાની વનસ્પતિનાં જીવશેષો સામાન્ય રીતે શલ્કશૈલ (લિપિડોડેન્ડ્રોન) નામની એક મોટી સીતાહારનાં જીવશેષોની સાથે સાથેજ પૃથ્વીના ખડકોમાં પડી રહેલાં આપણી નજરે આવે છે. આ ઉદ્ભલિન્નજો ઘણે ભાગે તે સમયે વૃક્ષના જેટલી ઉંચી વધતી હતી. તેથી એવું સૂચન થાય છે, કે પાતળી અને નાજુક મિએડેસ્મિઆ ઘણે ભાગે તેના મજબૂત પડોશી વૃક્ષની ઉપરજ અંતરિક્ષલ બનતી હશે. હાલમાં પણ, ઘણી હાથાચુડી વનસ્પતિઓ વધારે મજબૂત ઉદ્ભલિન્નજોની ઉપર જ

અંતરિક્ષજ્ઞની પેઠે ઉગે છે. જો આ વાત સત્ય હોય તો બીજાં વૃક્ષોની ઉપર ઉગનારી મિએડેસ્મીઆને પુનરુત્પત્તિ કરવામાં સીતાહાર વૃક્ષોના જેટલીજ મુશ્કેલી પડતી હોવી જોઈએ. પાછળ આપણે જોઈ ગયા, કે વિજ્ઞાતીય અલિંગકોષોની પદ્ધતિમાં એક મોટો ગેરલાભ છે: ફલનની સિદ્ધિને માટે નાનાં અને મોટાં અલિંગકોષો એકજ સ્થળે એકકાં થવાની ખાસ જરૂર છે, અને કુદરત ખરાબર એજ પ્રમાણે અચૂક કામ કરે એ બહુ સંભવિત નથી; તેથી તેમનો આકસ્મિક મેળાપ અવશ્ય ધાય માટે નાનાં અલિંગકોષોની મોટી સંખ્યા ઉત્પન્ન થવી ખાસ જરૂરની છે. ઉંચાં ઝાડની ડાળીઓમાંથી, એટલે તેમના કે અંતરિક્ષજ્ઞના શંકુઓમાંથી ન્યારે અલિંગકોષો ખરી પડવા લાગ્યાં ત્યારે આ મુશ્કેલી ઉલટી વધી. જો આ ખાસ જરૂરનો મેળાપ જનક ઉદ્દલિન્નજ્ઞની ઉપર જ ધાય એવી વ્યવસ્થા વનસ્પતિઓ કરી લે, તો એ વાત કેવળ અકસ્માતને અંધીન રહે નહિં. ઉદ્દલિન્નજ્ઞે બીજ ધારણ કરી આ લાભ મેળવ્યો. હવે, મોટું અલિંગકોષ હમેશાં અલિંગકોષાગારમાં જ રહેવા લાગ્યું. વિજ્ઞાતીય અલિંગકોષોવાળાં વૃક્ષોમાં, અને મિએડેસ્મીઆ વિગેરે જે ઉદ્દલિન્નજ્ઞે અંતરિક્ષજ્ઞનું જીવન ગાળતી હતી તેમની બાબતમાં પણ આ પરિસ્થિતિ નક્કી બીજના જેવી ઇંદ્રિયના વિકાસને માટે બહુજ અનુકૂલ બની હશે.

પણ આ બધી વાત કેવળ કલ્પના છે. હાલની ઉદ્દલિન્નજ્ઞેની પેઠે પ્રાચીનજીવયુગની વનસ્પતિઓમાં પણ જીવન-કલહ હતો, અને તેમના જીવનની પરિસ્થિતિમાં ન્યાંમુધી

તેઓ બરાબર ઉપયોગી થઈ નહિ' ત્યાંમુધી તેમના શરીરની રચનામાં સારો વિકાસ કરવા તેઓ અશક્ત હતી, એ બે વાતો આપણને બરાબર સમજાય એ માટે આ અનુમાન કરવાની ખાસ જરૂર હતી. પણ, એ વાત સમજવી બહુ મુશ્કેલ છે, કે જીવનકલહમાં ટકી રહેવા માટે એક ઉદ્દભિન્ન અમુક યોગના ઉત્પન્ન કરે છે, અને બીજી વનસ્પતિ કેવળ જુદી જ રીતે પોતાનું એજ કાર્ય સિદ્ધ કરે છે.

ઉપરની વાત ઉપરથી એમ સમજાય છે, કે પ્રાચીનજીવ-યુગથી તે આજમુધી હાથાયુડી ઉદ્દભિન્નનેની શરીર-રચનામાં બહુજ થોડો ફેરફાર થયેલો છે; માત્ર એ કુટુંબની ઉચી કોટિની સભ્યોનો કેવળ નાશ થયેલો છે, કારણકે લવિચ્યના જીવનકલહમાં વનસ્પતિની બીજી કોમોની સાથે તેઓ બરાબર હરિફાઈ કરી શકી નહીં.

હજુ આપણે પ્રાચીનજીવયુગની સીતાહાર વનસ્પતિઓ-માં મુખ્ય શલ્કશૈલી (લેપિડોડેન્ડ્રી) નામની ઉદ્દભિન્નનેના સંબંધે કાંઈજ વાત કરી નથી. સજીવ ઉદ્દભિન્નનેની સાથેનો તેમનો સંબંધ હાથાયુડી વનસ્પતિઓના જેટલો સ્પષ્ટ નથી. તેથી પ્રથમ આપણે તેની ઉત્ક્રાંતિને ન અનુસરતાં તેનાં જીવ-શેષના સ્વરૂપની રૂપરેષા તપાસીશું, અને પછી આપણે વિચારીશું, કે હાલની ઉદ્દભિન્નજમ્બુદિમાં તેમનો કોઈપણ વંશજ હયાત છે, કે તેમનો કેવળ નાશ થયો છે.

પ્રાચીન જીવયુગની મુખ્ય સીતાહાર વનસ્પતિઓ

વૃક્ષો હતી, અને તેઓ પૈકી ઘણી ઉદ્ભિજ્જેના મંખધે આપણને સારી માહિતી મળી છે. પૃથ્વીના જેટલા ભાગોમાં અંગાર યુગના ખડકો તપામાયા છે તેમાંથી પ્રાપ્ત થયેલી સીતાહાર કુટુંબની મેંકડો ઉપખતોનું શાસ્ત્રીઓએ વર્ણન કરેલું છે. એ યુગની વનસ્પતિસૃષ્ટિમાં અદ્ભુત એકરૂપતા હતી. ઑસ્ટ્રેલિયા, દક્ષિણ આફ્રિકા કે દક્ષિણ અમેરિકા અને ગ્રેટબ્રિટનની વનસ્પતિઓની વચ્ચે કાંઈ જ મહત્વનો ફેર ન હતો. સીતાહાર વૃક્ષોનાં અવશેષો ઉપરથી એમ સ્પષ્ટ જણાય છે, કે તે યુગની વનસ્પતિસૃષ્ટિમાં તેમની સંખ્યા બહુજ મોટી હતી, અને લીનાશવાળી જમીનમાં ઉગી લવિધ્યમાં કોલસો બની ગયેલાં જંગલોમાં જ્યાં ત્યાં એજ વનસ્પતિઓ નજર આવે છે.

એ વૃક્ષો બહુજ મોટાં હતાં. ચાર પાંચ વર્ષ ઉપર બોલ્ટનની પાસે રોયલ આર્લેની ખાણમાંથી શલ્કવૃક્ષનું એક રાક્ષસી થડ હાથ લાગ્યું છે. એ થડના જે ભાગમાંથી ડાળીઓ ફૂટવી શકે થઈ ત્યાંથી તેનું મૂળ ૧૧૪ ફુટ દૂર હતું એ થડનો ૧૭ કે ૧૮ ફુટ લાંબો ભાગ તો ડાળીઓએ અને પાંદડાંઓએ રોકેલો હતો, એટલે એ થડ ૧૩૨ ફુટથી પણ વધારે લાંબું હશે. ખડકોના દબાણથી અથવા કોહી જવાથી એ થડનું જીવશેષ અપટું હતું. તેના પાયાની જાડાઈ ૩ ફુટ ૮ ઇંચ x ૧ ફુટ ૮ ઇંચ હતી, અને જે સ્થળે તેમાંથી શાખાઓ ફૂટેલી હતી ત્યાંની જાડાઈ ૧ ફુટ ૯ ઇંચ x ૪ ઇંચ હતી. દબાણને લીધે તે થડ અમળાઈ ગયેલું હતું, અને તેમાંથી કેટલાક દ્રવ્યનો નાશ પણ થયો હતો. આ

અન્ને વાતનો હિસાબ ન ગણીએ તો, તેની સ્વાભાવિક સ્થિતિમાં તે થડ' પાંચા' આગળ ૩ ફુટ અને ૧૧૪ ફુટની ઉંચાઈએ આશરે એક ફુટ જડું હશે; એ રીતે એ થડ પ્રમાણમાં પાંતળું હોવું જોઈએ. આ હકીકતને માટે લેખક મી. જેમ્સ લેમેકસનો અંતઃકરણ પૂર્વક આભાર માને છે.

ખીજી મુખ્ય જાત સીજિલેરિઆની છે, અને તેનાં થડ પણ એટલાંજ મોટાં અને પાતળાં હતાં; તોપણ, તેની કેટલીક સભ્યો ટૂંકી અને વધારે મજબુત હતી. જર્મનીમાંથી પ્રાપ્ત થયેલી એક સિજિલેરિઆના થડના પાયાનો વ્યાસ ૬ ફુટ હતો અને તે જાતે ૧૮ ફુટ ઉંચું હતું. તેની ટોચની જડાઈ માત્ર ૧ ફુટ હતી.

આ સીતાહારી વૃક્ષોનો દેખાવ સીતાહારના કુટુંબને વધારે મળતો આવતો હતો, પણ તેમની પુનરુત્પત્તિ કરવાની રીત હાથાયુડી ઉદ્દભિજ્જોને સમાન હતી. ખરેખર તેમનો વાસ્તવિક સંબંધ હાથાયુડીના વર્ગની વનસ્પતિઓની સાથે હતો, પણ હાથાયુડીના ખાસ કુટુંબની સાથે તેમને કાંઈજ નજીકનો સંબંધ ન હતો. આપણે જાણીએ છીએ, કે હાથાયુડીનું કુટુંબ શલ્કવૃક્ષીના જેટલું જ પ્રાચીન છે, અને આ બે વર્ગોની વચ્ચે કાંઈજ પ્રત્યક્ષ સંબંધ નથી.

શલ્કવૃક્ષી ઉદ્દભિજ્જો (આ નામમાં સીજિલેરિઆ અને ખીજી ઓછી અગત્યની જાતોનો સમાવેશ થાય છે) મત્સ્યસ્તર યુગમાં કયારનીયે સારો વિકાસ પામી હતી, અને તેઓ અંગાર-

યુગ અને વૃદ્ધોરગયુગના ખડકોમાંથી પણ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે: ધીમે ધીમે તેમની હાજરી ઓછી થાય છે અને મધ્યજીવ-યુગના ખડકોમાંથી તેમનું એકકે જીવશેષ આપણને હાથ લાગતું નથી.

દેખાવમાં, શલ્કવૃક્ષ અને સીન્જિલેરિઆની મુખ્ય જાતો પરસ્પરથી ભિન્ન છે. બન્નેમાં થડ ટટાર અને સામાન્ય રીતે ઉંચાં હતાં; પણ શલ્કવૃક્ષને છૂટથી ડાળીઓ ઉગતી હોવાથી તેનો દેખાવ આપણાં હાલનાં જંગલનાં વૃક્ષોના જેવો હતો, અને સિન્જિલેરિઆને ઓછી ડાળીઓ ઉગતી હોવાથી, અથવા, તેની કેટલીક ઉપજાતોમાં ડાળીઓનો તદ્દન અભાવ હોવાથી, તે કાંઈ જુદીજ જાતનો દેખાવ આપતી હતી. ન્યુઝીલેન્ડનું કુળી-વૃક્ષ (કેએજ ટ્રી, કોર્ડીલાઈન) અથવા ઓસ્ટ્રેલિઆનાં તૃણ વૃક્ષોનો (ગ્રાસ ટ્રીઝ, કસેન્થોડીઆ) દેખાવ સિન્જિલેરિઆને વધારે મળતો આવે છે. આ જાતની બધી વનસ્પતિઓનો શાખાતંત્ર ચીપીઆના આકારનો હતો, પણ એ ચીપીઆના બે ભૂજનો વિકાસ અસમાન હતો.

તેને સાદાં અને ઘાસના જેવાં ઘણાં પાંદડાંઓ હતાં, અને સીન્જિલેરિઆની એક ઉપજાતમાં તો તેઓ લાંબાઈમાં એક યાડ લાંબાં વધતાં હતાં. હાલની હાથાચુડીની પેઠે, દરેક પાંદડાને તેની ઉપલી બાજુએ પાયાની આગળ એક જીલક હતું. તેની જનનેન્દ્રિયનો આકાર શંકુના જેવો હતો, અને ઘણીવાર તેમનું કદ બહુજ મોટું હતું. સામાન્ય રીતે તેઓ નાની ડાળીઓના છેડાઓ ઉપર ઉગતી હતી, પણ સીન્જિલેરિઆની

જાતમાં, સામાન્યરીતે તેઓ સુખ્ય થઈની ઉપરજ ઉત્પન્ન થતી હતી.

શદ્કવૃક્ષ અને સીજિલેરિઆની વચ્ચેનો તફાવત સુખ્યત્વે આ વાત ઉપર આધાર રાખે છે. બન્ને જાતોમાં પાંદડાં ખરી પડ્યા પછી પણ તેમના પાયાઓ થડને વળગી રહેતા હતા. શદ્કવૃક્ષના પાંદડાના પાયાઓ થડના લગભગ આખા પૃષ્ઠને ઢાંકી દેતા, અને તેમની ગોઠવણી વમળના જેવી કે તિરકસ હતી, અને સિજિલેરિઆમાં એ ગોઠવણી ઉભી લીટીઓમાં હતી. સિજિલેરિઆના એક પરિચ્છેદમાં સ્પષ્ટ અનુદીર્ઘ રેખાઓ હતી, અને તેઓ ઘણે ભાગે પાંદડાના પાયાઓની ઉભી લીટીઓની પરંપરાનું સ્થાન ખતાવતી હતી. એ બે જાતો પૈકી શદ્કવૃક્ષ વધારે પ્રાચીન વનસ્પતિ હશે એમ લાગે છે.

આ બન્ને જાતોમાં મૂળીઆંનો તંત્ર સમાન છે. થડના પાયામાંથી ચાર ચોટાં મૂળ કૂટે છે, અને તેઓ જમીનમાં આડાં કે તિરકસ વધે છે. દરેક મૂળનું અગ્ર ચીપીઆની પેઠે, ઓછામાં ઓછું બે વાર ફેંટાય છે. જમીનમાં રહેલાં આ અવયવ કદમાં બહુજ વધતાં હતાં; વીલીઅમ્મને માપેલું એક મૂળ ૩૭ ફુટ ૪ ઇંચ લાંબું હતું અને તેના પાયાનો વ્યાસ ૨ ફુટ ૮ ઇંચ હતો. સુખ્ય મૂળમાંથી અસંખ્ય નાનાં મૂળીઆં કૂટેતાં, અને તેમના અનેક ફાંટાઓ જમીનમાં ખાંધી બાળુએ ફેલાતા હતા.

શદ્કવૃક્ષીના થડની અંતર્ધાર્તના પ્રથમ હાથાધુડીની સાદી

ઉપજાતના થડને કાંઈક સમાન હતી, પણ પછી જૂદી જૂદી ઉપજાતોમાં તે અત્યંત વિવિધ બની, અને લવિધ્યમાં નવા કાષ્ઠની વૃદ્ધિ થવાથી ઘણી બાબતોમાં તેનું બહુજ રૂપાંતર થઈ ગયું. તેના થડમાં હમેશાં વાહિનીનો એકજ રેસો હોય છે, કેટલાંક શલ્કવૃક્ષોમાં કાષ્ઠનો મધ્ય ભાગ નરકર હોય છે. ઘણી ઉપજાતોમાં ગર હોય છે, અને કેટલીક સિનિલેરિઆમાં કાષ્ઠની આસપાસનો પ્રદેશ વધારે જોછો તૂટક બની તે છૂટા છૂટા રેસાઓમાં વહેંચાઈ જાય છે. હાલની ઘણી સીતાહાર વનસ્પતિઓની પેઠે, તેનું આઘ કાષ્ઠ બહારથી અંદરની દિશાએ વૃદ્ધિગત થતું હતું; તોપણ ઘણાં શલ્કવૃક્ષોમાં અને બધી જાણીતી સિનિલેરિઆમાં પરિવર્ધિની પેશિના સાધનથી નવું કાષ્ઠ ઉત્પન્ન થઈ થડ ઘણું જ જાડું બનતું હતું; તેની મધ્ય ત્વચામાં (કોર્ટેક્સ) પણ પુષ્કળ પરિવર્ધિની પેશિ હાજર હતી.

શલ્કવૃક્ષી અને મુખ્યત્વે સિનિલેરિઆમાં એ રીતે નવું કાષ્ઠ ઉત્પન્ન થતું હોવાથી, એક સમયે ઉદ્ભિન્નજ્ઞવેત્તાઓની એવી માન્યતા હતી, કે તેઓ પ્રચન્નબીજ નહિ, પણ વિવૃતબીજ વનસ્પતિઓ હતી. વિદ્વાન્ વિલીઅમ્સને આ માન્યતા ખોટી છે એમ જાહેર કર્યું. નવા કાષ્ઠની ઉત્પત્તિ કેવળ બીજધારી વનસ્પતિઓનું જ લક્ષણ નથી; પ્રાચીન જીવ-યુગમાં ઉંચી કોટિની બધી પ્રચન્નબીજ વનસ્પતિઓ નવું કાષ્ઠ ઉત્પન્ન કરતી હતી. હાલના સમયમાં આ પ્રાચીન શક્તિ માત્ર આઈસોઇટિસ અને બીજી થોડી ઉદ્ભિન્નજ્ઞેમાં જ

આપણી નજરે આવે છે. વૃક્ષોમાં નવું કાષ્ઠ ઉત્પન્ન કરવાની શક્તિ ખરેખર હોવીજ જોઈએ. હાલમાં જેમ એ શક્તિ કેવળ દ્વિદળ વૃક્ષોનું જ લક્ષણ નથી, તેમ પ્રાચીન યુગમાં પણ વૃક્ષો સિવાય બીજા ઘણી ઉદ્ભવિજ્ઞાનેમાં એ શક્તિ હાજર હતી. હાલમાં, ઉંચી કોટિની કેટલીક દરિઆઈ વનસ્પતિઓમાં પણ (પર્ણાભા, વિગેરે લેમિનેરિઆ) એક જાતની પરિવર્ધિની પેશિ નવું કાષ્ઠ ઉત્પન્ન કરે છે, અને નિમેટોફાઈકસ નામની પ્રાચીન જીવયુગની મોટી શેવાલમા પણ એવીજ શક્તિ હતી.

સામાન્ય રીતે, શદ્કવૃક્ષના દરેક પાંદડાને થડમાંથી માત્ર એકજ વાહિની-રેસો મળતો હતો; પાંદડાંના રેસાઓ નાના હતા, અને જે કાષ્ઠમાંથી તેઓ નીકળી આવતા હતા, તેના ચક્રને તેઓ ઠેક મુધી જરા પણ તૂટક બનાવતા ન હતા. સીતાહાર અને હંસરાજની વચ્ચે આ એક બીજો ભેદ છે. હંસરાજના પાંદડાનો રેસો તેના મૂળ આગળ હમ્મેશાં તૂટક હોય છે, કારણ કે તેનાં મોટાં પાંદડાંઓને વધારે વાહિની રેસાઓની જરૂર છે.

સીજિલેરિઆની એક ઉપજાતમાં, એ વાહિનીરેસો જ્યારે મધ્યત્વચામાંથી પસાર થાય છે ત્યારે તેના અગ્રમાંથી ચીપીઆના જેવા બે ફાંટાઓ ઉત્પન્ન થાય છે, અને ત્યારે પાંદડાની અંદર આપણને બે સમાંતર રેસાઓ દેખાય છે. સીતાહાર વર્ગની ઉદ્ભવિજ્ઞાનેમાં, આ બાબતનું એ ઉપજાતના સિવાય બીજું એકકે દૃષ્ટાંત નથી.

પૃથ્વીના ખડકોમાં તેમનાં પાંદડાં બહુજ સારી રીતે

સચવાઈ રહેલાં છે. તેમના નીચલા પૃઠમાં જે એ ઉંડી ખાંચો હોય છે, તેમાં તેમનાં તુંડકો (સ્ટોમેટા) આવેલાં છે. હાલની સૂકી આબોહવામાં વસનારી વનરૂપતિઓમાં પણ તુંડકોની કાંઈક એવી જ વ્યવસ્થા હોય છે. શલ્કવૃક્ષી ઉદ્દલિન્જને ખરેખર એવી પરિસ્થિતિમાં ઉગતી ન હતી; પણ તેઓ ઘણે ભાગે ખારી અને લીની જમીનમાં ઉગતી હશે એમ લાગે છે, કારણ કે આ વનરૂપતિઓને પણ પાણીની કરકસર કરવાની હોવાથી તેમનાં તુંડકોની વ્યવસ્થા પણ કાંઈક અંશે એવી જ હોય છે.

એ વૃક્ષોનાં જમીનની અંદર ફેલાયેલાં અવયવોને આપણે ‘ મૂળીઆં ’ એવું નામ આપેલું છે, કારણ કે એ શબ્દ સ્પષ્ટ છે, અને તે અવયવોનો ધર્મ પણ હાલનાં મૂળી-આંના જેવોજ હતો. તોપણ, તેમની અંતર્ઘટના હાલનાં સામાન્ય મૂળીઆંનાં જેવી ન હતી; મુખ્ય મૂળની રચના થડના જેવી અને ઉપ-મૂળની રચના આઘસોઘટિસનાં મૂળીઆંના વાહિની-તંત્રના જેવી જ હતી, એટલે તેમાં કાષ્ઠ અને વલ્કકને ભાત્ર એક એક રેસો હતો. આ વ્યવસ્થા સામાન્ય રીતે પાંદડાની છે. ઉપ-મૂળીઆંની રચનામાં બીજી કિલ્લપતા છે; તેમના વાહિની-રેસાઓ ફંટાઈ મધ્ય-ત્વચામાં દાખલ થાય છે, અને એ રીતે તેઓ જમીનમાંથી પાણી ચૂસવાનું ખાસ યંત્ર બને છે.

સીતાહાર ઉદ્દલિન્જનેમાં એવી ઘણી વસ્તુઓ છે, કે જેમની રચના નથી મૂળની કે નથી થંડની; આ લક્ષણ ઘણે

ભાગે એ સમૂહની પ્રાચીનતા સ્પષ્ટ કરે છે. જે સમયે વનસ્પતિના શરીરમાં અવયવ વિભાગ સ્પષ્ટ થયો ન હતો તે સમયનું આ લક્ષણ છે. તોપણ, પ્રસ્તુત અવયવો, અને મુખ્યત્વે તેમનાં જીવશેષોના અવયવો તેમના ધર્મને સંપૂર્ણ રીતે યોગ્ય અનેલાં છે. શલ્કવૃક્ષીનાં મુખ્ય મૂળને હાથાચુડીની પત્રહીન અને મૂળીઆં ઉત્પન્ન કરનારી અદ્ભુત ડાળીઓની સાથે સરખાવી શકાય.

હવે આપણે જનનેંદ્રિયોનું અવલોકન કરીએ. આપણે પાછળ જોઈ ગયા, કે તેનાં અલિંગકોષાગારો હમેશાં એક જાતના શંકુઓમાં ગોઠવાયેલાં હતાં, અને તેમની સામાન્ય રચના હાલની હાથાચુડી નામની સીતાહારની જાતને લગભગ સમાન હતી. હાથાચુડીમાં પણ જે જાતનાં અલિંગકોષો હોય છે. કેટલીક જાખતમાં તેઓ ખરેખર આઘસોઘટિસને વધારે મળતા આવે છે, ફેર માત્ર એટલો જ છે, કે આઘસોઘટિસમાં સ્પષ્ટ શંકુ ઉત્પન્ન થતો નથી.

શલ્કવૃક્ષીની જનનેંદ્રિયોમાં જે જાતની વ્યવસ્થા હોય છે, એક બાજુએ, હાલની હાથાચુડી અને આઘસોઘટિસની પેઠે વિજાતીય અલિંગકોષોથી તેઓ પોતાની વંશવૃદ્ધિ કરે છે. બીજી બાજુએ, મીએટેરમીઆ વિગેરે શલ્કવૃક્ષી બીજના જેવી કોઈ વસ્તુઓના સાધનથી પોતાની પુનરુત્પત્તિ કરે છે. હાલની કોઈપણ સીતાહાર ઉદ્ભવિત્ત્વ આ બીજી રીતે વંશવૃદ્ધિ કરતી નથી. આ બીજી રીત ખરેખર વધારે ઉંચી જાતની છે.

પ્રથમ આપણે વિજ્ઞાતીય અલિંગકોષોવાળા વધારે સાદા શંકુઓ સંબંધે વાત કરીશું, કારણ કે આ મહાન્ કુટુંબનો મોટો ભાગ એ જ રીતે પુનરુત્પત્તિનું કાર્ય મિદ્ધ કરે છે.

શલ્કવૃક્ષના નમુનારૂપ શંકુઓની રચના બહુજ વિશિષ્ટ હતી. શંકુના અક્ષની ઉપર બીજકણુદલ બીચોબીચ ઉગેલાં હતાં અને તેમની ગોઠવણી, વમળના જેવી કે ગુચ્છાબંધ હતી. દરેક બીજકણુદલ એટલે ફલીભૂતપર્ણનો પાયો સહેજ અનુક્ષિતિજ (હોરિઝોન્ટલ) હતો અને તે ધીમે ધીમે પહોળો થઈ વધારે પહોળા પાંદડાના ફલકની સાથે એકાકાર થઈ જતો હતો. આ વસ્તુ ટટાર ઉભી વધતી હતી, અને કેટલીક વાર તેની નીચલી બાજુએ પણ તે થોડી લાંબી થયેલી હતી. પાંદડાનાં અનુક્ષિતજ ભાગના ઉપલા પૃષ્ઠની આખી લંબાઈ ઉપર અલિંગકોષાગાર ઉગતું હતું. તેની લંબાઈ કેટલીક વાર બહુજ વધારે હતી—એક સુંદર શંકુમાં અલિંગકોષાગાર લગભગ ૨ સેન્ટિમિટર લાંબું અને ૫ મીલીમીટર પહોળું હતું; જાણીતી પ્રચ્છન્નબીજાઓમાં ઘણે ભાગે આ મોટામાં મોટાં અલિંગકોષાગારો છે. અલિંગકોષાગારને દૂરને છેડે, બીજકણુદલના પાયાની નીચેજ જીલક ઉગતું હતું. તેણી એમ સમજાય છે, કે તેનો બધો અનુક્ષિતજ ભાગ પાંદડાનો પાયો લંબાવાથી ઉત્પન્ન થયેલો છે. શલ્કવૃક્ષના બધા શંકુઓમાં, ફલીભૂત પાંદડાના લાંબા પાયાની આખી લંબાઈમાં અલિંગકોષાગાર આવેલું હોય છે. બ્રોથ્રોડેન્ડોન નામની એક ઉપજાત કેટલીક બાબતોમાં શલ્કવૃક્ષ અને સિન્જિલોરિઆની તટસ્થ સંબંધી

હતી. તેતું અલિંગકોષાગાર ખીજકણુદલને એક નાના પાયાના માધનધી વળગેલું. હતું, અને તે ખીજકણુદલ ટૂંકું હતું. શલ્કવૃક્ષીના અલિંગકોષાગારના આ લાંબા પાયાનો દેખાવ હાલની સજીવ સીતાહારની કેવળ આઘસોઘટિસ નામની ઉપજાતમાં જ આપણી નજરે આવે છે.

આ જીવશેષભૂત વનસ્પતિની જાતનાં અલિંગકોષાગારોમાં ઘણીવાર સ્તરીભૂત પેશિની પટ્ટીઓ હાજર હોય છે. ખીજકણુદલમાંથી ઉંચે જઈ તેઓ ઘણે ભાગે અલિંગકોષોને પુષ્ટિ આપે છે, આપણે પાછળ નોંધ ગયા, કે આઘસોઘટિસનાં અલિંગકોષાગારોમાં પણ એવી જ વ્યવસ્થા હોય છે.

કેટલીક ઉપજાતોમાં એક જ શંકુમાં બે જાતનાં અલિંગકોષાગારો ઉત્પન્ન થાય છે, અને સામાન્ય હાથાચુડીની પેઠે નાનાં કોષાગારો ઉપલા ભાગમાં અને મોટાં કોષાગારો શંકુના નીચલા ભાગમાં હોય છે ખીજ ઉપજાતોમાં એક જ શંકુમાં એકજ જાતના અલિંગકોષાગારો ઉત્પન્ન થાય છે. તેની બધી ઉપજાતો વિજાતીય અલિંગકોષાગારોવાળી હતી એમ સાબીત કરવું અશક્ય છે, કારણ કે કેટલીક વાર માત્ર નાનાં અલિંગકોષો જ આપણી નજરે આવે છે; તોપણ યથાર્થ શલ્કવૃક્ષીના શંકુઓની રચના પરસ્પર એટલી બધી સમાન છે, કે એ મંબંધમાં કાંઈજ શંકા લાવવા જેવું નથી. સૂક્ષ્મ અલિંગકોષોની સંખ્યા બહુજ મોટી હતી; મોટાં અલિંગકોષાગારોમાં પણ મોટાં અલિંગકોષોની સંખ્યા નાની જ હતી,

પ્રથમ આપણે વિનતીય અલિંગકોષોવાળા વધારે સાદા શંકુઓ સંબંધે વાત કરીશું, કારણ કે આ મહાન કુટુંબનો મોટો ભાગ એ જ રીતે પુનરુત્પત્તિનું કાર્ય મિદ્ધ કરે છે.

શલ્કવૃક્ષના નમુનારૂપ શંકુઓની રચના બહુજ વિશિષ્ટ હતી. શંકુના અક્ષની ઉપર બીજકણુદલ બીચોબીચ ઉગેલાં હતાં અને તેમની ગોઠવણી, વમળના જેવી કે ગુચ્છાબંધ હતી. દરેક બીજકણુદલ એટલે ફલીભૂતપર્ણનો પાયો સહેજ અનુક્ષિતજ (હોરિઝોન્ટલ) હતો અને તે ધીમે ધીમે પહોળો થઈ વધારે પહોળા પાંદડાના ફલકની સાથે એકાકાર થઈ જતો હતો. આ વસ્તુ ટટાર ઉણી વધતી હતી, અને કેટલીક વાર તેની નીચલી બાજુએ પણ તે થોડી લાંબી થયેલી હતી. પાંદડાનાં અનુક્ષિતજ ભાગના ઉપલા પૃષ્ઠની આખી લંબાઈ ઉપર અલિંગકોષાગાર ઉગતું હતું. તેની લંબાઈ કેટલીક વાર બહુજ વધારે હતી—એક સુંદર શંકુમાં અલિંગકોષાગાર લગભગ ૨ મેન્ટિમિટર લાંબું અને ૫ મીલીમીટર પહોળું હતું; જાણીતી પ્રચ્છન્નબીજાઓમાં ઘણે ભાગે આ મોટામાં મોટાં અલિંગકોષાગારો છે. અલિંગકોષાગારને ફરને છેડે, બીજકણુદલના પાયાની નીચેજ છલક ઉગતું હતું. તેણી એમ સમજાય છે, કે તેનો બધો અનુક્ષિતજ ભાગ પાંદડાનો પાયો લંબાવાથી ઉત્પન્ન થયેલો છે. શલ્કવૃક્ષના બધા શંકુઓમાં, ફલીભૂત પાંદડાના લાંબા પાયાની આખી લંબાઈમાં અલિંગકોષાગાર આવેલું હોય છે. બોથ્રોડેન્ડ્રોન નામની એક ઉપજાત કેટલીક બાળતોમાં શલ્કવૃક્ષ અને સિર્જિલોરિઆની તટસ્થ સંબંધી

આ સીતાહાર ઉદ્દલિન્નજોમાં પુનરુત્પત્તિની રીત હાલના સ્વરૂપ કુટુંબના વિન્નનીય અલિંગકોષ વાળા સભ્યોના જેવીજ હતી. આટલા બધા લાંબા સમય સુધી આ જાતની પુનરુત્પત્તિ કેવી રીતે ટકી રહી એ સમજવું મુશ્કેલ છે. હાલની હાથાયુડી અને આઈસોઇટિસ પ્રાચીન જીવયુગની વંશજો છે એમ જ્યારે આપણે વિચારીએ છીએ. ત્યારે આપણને બહુજ નવાઈ લાગે છે.

તોપણ, સીતાહારની ઉન્નતિના કિવસો ઘણા સમય થયાં પસાર થઈ ગયા છે; ઉત્તમ વિકાસ પામેલી તેમની વંશજો અંગારયુગમાં છેડલી હાજરી આપી અદશ્ય થઈ ગઈ છે, અને હાલમાં તેમનો એક પણ વંશજ હયાત નથી. મિએડેસ્મીઆ નામની સીતાહાર વર્ગની એક બીજધારી ઉદ્દલિન્નજ વિષે આપણે પાછળ વાચી ગયા. સીતાહારનાં કેટલાંક વૃક્ષોની વંશવૃદ્ધિ એટલીજ ઉંચી જાતની હતી. તેમનાં જીવશૈલ્યોમાં બીજના જેવીજ લાગતી વસ્તુઓ આપણને પ્રથમ પ્રાપ્ત થઈ. સીતાહારની આ જાતનું નામ શલકકૃલી (લેપિડોકાર્પન) હતું, અને આ નામ કેવળ તેના બીજના સ્વરૂપનેજ ઉદ્દેશી પાડેલું છે. એ સિવાય તેની બાકીની રચના શલકવૃક્ષના શંકુને આબેહુબ મળતી આવે છે. એ બીજ સીતાહારનાં અંગો છે એમ સાબીત થયું ત્યાર પહેલા ઘણાં વર્ષો ઉપર આપણને તેમની ખીછાન ધ્યેલી હતી પણ તે સમયે એમ ધારવામાં આવતું હતું, કે તેઓ વિવૃતબીજના હૃદાકૃતિ કુટુંબના સભ્યોનાં અંગો હતાં.

પણ બોથ્રોડેન્ડ્રોન વિગેરે બીજી ઉપજાતોના શંકુઓમાં માત્ર ચારજ મોટાં અલિંગકોષો હાજર હતાં. આ બે જાતનાં અલિંગકોષોના કદમાં બહુજ તફાવત હતો; તેમના વ્યાસનું પ્રમાણ, ૫૦:૧ હતું, એટલે તેમના કદનું પ્રમાણ ૧૨૫૦૦૦:૧ થયું. મોટાં અલિંગકોષોનો વ્યાસ આશરે ૧ મીલીમીટર હતો, અને સિજિલેરિઆના કેટલાક શંકુઓમાં તેમનું કદ આથી બમણું હતું. એક સાધારણ ટાંકણીનું માથું તેમના કદનો સહેજ ખ્યાલ આપે છે. કેટલીક જાતના કોલસામાં મોટાં અલિંગકોષોગારો પુષ્કળ આપણી નજરે આવે છે.

સામાન્ય રીતે, મોટાં અલિંગકોષો કાંટાના જેવી રૂવાંટીથી ઢંકાયેલાં હતાં, અને ઘણીવાર નાનાં અલિંગકોષો એ રૂવાંટીમાં ભરાઈ ગયેલાં હતાં. જાનને અલિંગકોષોનું એકજ સ્થળે અંકુરીલવન થવા માટે એ વ્યવસ્થા ઉત્પન્ન થઈ હશે.

કેટલાક શંકુઓના જીવશેષોનું એવું સાફ જતન થયેલું છે, કે મોટા અલિંગકોષમાં ઉત્પન્ન થયેલી અનુસમાંગ પણ અકળાંધ ત્યાં સચવાઈ રહેલી છે. તે એકરૂપ અને મોટાં કોષોવાળી પેશિની બનેલી હતી, માત્ર મોટા અલિંગકોષના મોં આગળ નાનાં કોષો હતાં. મી. ડબલ્યુ. ટી. ગોર્ડને થોડાજ સમય ઉપર શોધી કાઢ્યું, કે એ ભાગમાં એક સુરક્ષિત સ્ત્રીકૃપી હાજર હતી. હાથાચુડી.કે આઈસોઈ-ટિસની સ્ત્રીકૃપી સાથેનું સામ્ય લગલગ સંપૂર્ણ છે, તેથી હવે આપણી પૂર્ણ ખાતરી થાય છે, કે પ્રાચીન જીવયુગની

આ સીતાહાર ઉદ્દભિજ્ઞાનેમાં પુનરુત્પત્તિની રીત હાલના સજીવ કુટુંબના વિનતીય અલિંગકોષ વાળા સભ્યોના જેવીજ હતી. આટલા બધા લાંબા સમય સુધી આ જાતની પુનરુત્પત્તિ કેવી રીતે ટકી રહી એ સમજવું મુશ્કેલ છે. હાલની હાથાચુડી અને આઈસોઈટિસ પ્રાચીન જીવયુગની વંશજો છે એમ ત્યારે આપણે વિચારીએ છીએ. ત્યારે આપણને બહુજ નવાઈ લાગે છે

તોપણ, સીતાહારની ઉન્નતિના દિવસો ઘણો સમય થયાં પસાર થઈ ગયા છે, ઉત્તમ વિકાસ પામેલી તેમની વંશજો અંગારયુગમાં છેડલી હાજરી આપી અદૃશ્ય થઈ ગઈ છે, અને હાલમાં તેમનો એક પણ વંશજ હયાત નથી. મિએડેસ્મીઆ નામની સીતાહાર વર્ગની એક બીજધારી ઉદ્દભિજ્ઞ વિશે આપણે પાછળ વાચી ગયા. સીતાહારનાં કેટલાંક વૃક્ષોની વંશવૃદ્ધિ એટલીજ ઉંચી જાતની હતી. તેમનાં જીવશેષોમાં બીજના જેવીજ લાગતી વસ્તુઓ આપણને પ્રથમ પ્રાપ્ત થઈ. સીતાહારની આ જાતનું નામ શદકફૂલી (લેપિડોકાર્પન) હતું, અને આ નામ કેવળ તેના બીજના સ્વરૂપનેજ ઉદ્દેશી પાડેલું છે. એ સિવાય તેની બાકીની રચના શદકવૃક્ષના શંકુને આબેહુળ મળતી આવે છે. એ બીજ સીતાહારનાં અંગો છે એમ માનીત થયું ત્યાર પહેલા ઘણાં વર્ષો ઉપર આપણને તેમની પીછાન થયેલી હતી. પણ તે સમયે એમ ધારવામાં આવતું હતું, કે તેઓ વિવૃતબીજના હૃદાકૃતિ કુટુંબના સભ્યોના અંગો હતાં.

એ શંકુની ખાસ્યાવસ્થામાં તેના ભાગોની રચના આગેહુખ શદ્કવૃક્ષોના શંકુઓના જેવી હતી. બીજકણ્ઠલનો આકાર સાધારણ હતો, અને તે દરેકની ઉપલી બાજુએ, એક મોટું અલિંગકોષાગાર હોય છે. ફલીભૂત પાંદડાના પાયા આગળના લાંબા ભાગને તેની નીચલી બાજુ ચોંટેલી હોય છે. જલકનું સ્થાન પણ બીજ ઉપજતોમાં હોય છે તેવું જ હતું. પણ હવે તેની આશ્ચર્યકારક વિશિષ્ટતા શરૂ થાય છે. અલિંગકોષાગારની લગભગ આખી બજોલ માત્ર એક જ મોટા અલિંગકોષથી ભરેલી છે. તેનું કદ અત્યંત મોટું છે અને તેની આસપાસ વિંટળાયેલું ઝીણું પડ એ અલિંગકોષાગારની દિવાલને લગભગ બધે સ્થળે અડકેલું હોય છે. વધારેમાં, આ પરિપક્વ થયેલા એક મોટા અલિંગકોષ ઉપરાંત, અવિકસિત અને નિરૂપયોગી બનેલાં બીજાં ત્રણ અલિંગકોષો એજ કોષાગારમાં હાજર હોય છે. તેથી એ વાત સ્પષ્ટ છે, કે તે અલિંગકોષાગારમાં પ્રથમ કુલ ચાર મોટાં અલિંગકોષો હાજર હતાં, અને તેમના જીવનકલહમાં માત્ર એકજ કોષ વિજયી બની પરિપક્વ થયું. હાથાયુડીમાં કેટલીકવાર, અને વિજતીય અલિંગકોષવાળી જળ-હંસરાજોમાં હંમેશાં એવું જ દૃશ્ય બને છે. હાલની બીજધારી ઉદ્દલિન્નનેના ગર્ભ-કોશનો વિકાસ પણ કેટલેક અંશે આ દૃશ્યને મળતો આવે છે.

જ્યારે એ શંકુ બરાબર યુવાન થાય છે, ત્યારે તેનાં અલિંગકોષોનો દેખાવ બીજનો સંપૂર્ણ ભાસ ઉત્પન્ન કરે છે. બીજકણ્ઠલમાંથી એક જાડું પડ ઉત્પન્ન થઈ એ અલિંગ-

કોપાગારને ચારે બાજુએ વિંટળાઈ જાય છે, અને માત્ર તેની ટોચ આગળ જ એક નાનું છિદ્ર ખૂલ્લું રહે છે. આ છિદ્રને દ્વારક કહીએ તો ચાલે, પણ આ છિદ્ર તો એક લાંબી તઈડ જેવું હતું અને તે અલિંગકોપાગારના જેટલુંજ લાંબું હતું. જો એ કોપાગારને આડું કાપીએ તો તે આબેહુબ બીજનો દેખાવ આપે છે. એ 'બીજના' મોટા અલિંગકોપમાં અત્યંત સુરક્ષિત રહેલી અનુસમાંગ ઘણાં જીવશેષોમાં આપણી નજરે આવી છે, પણ તેની સ્ત્રીકૂખીની રચના સંબંધે હજી આપણને કંઈજ માહિતી મળી નથી. બીજકણુદલ સુદ્ધાંત એ બીજ જેવી વસ્તુ આખી જમીન ઉપર ખરી પડતી હતી. કેટલીકવાર તો તે ખરાબર ૩ ઇંચ લાંબી હતી.

બીજનો લાસ ઉત્પન્ન કરનારાં આ લક્ષણો મુખ્યત્વે મિએડેસ્મીઆના જેવાં જ હતાં. આ વનસ્પતિની બાબતમાં પણ એકજ મોટું અલિંગકોપ હતું, બીજની આસપાસ પડ હતું, અને તે આખી વસ્તુ જમીન ઉપર ખરી પડતી હતી, મોટું અલિંગકોપ પણ ઠેક મુઘી કોપાગારમાં જ રહેતું હતું. તોપણ, શલકેફેલીની બાબતમાં તેની જનનેદ્રિયનું બીજ સાથેનું સામ્ય વસ્તુતઃ અસંપૂર્ણ હતું; કારણકે તેની બાબતમાં દ્વારક બહુ જ લાંબું હતું, અને પરિપક્વ થયેલા મોટા અલિંગકોપ ઉપરાંત તેમાં બીજાં ત્રણ નિરૂપયોગી કોપો હાજર હતાં. આ બે લક્ષણોથી એ વાત સ્પષ્ટ થાય છે, કે શલકેફેલી ઉદ્ભવિજ્ઞે પ્રચલ્નબીજનાં લક્ષણોનો હજી તદ્દન ત્યાગ કર્યો ન હતો.

સામ્ય બતાવનારી કેટલીક વાતો છે. શકવૃક્ષ અને આઈસો-
ઇટિસ બન્ને જાતોમાં, ફલીભૂત પાંદડાને અલિંગકોષાગાર તેના
ચપટા પાયાના ચપટા સાધનથી ચોંટેલું છે, અને સીતાહારની
બીજ કોઈ પણ ઉપજાતોમાં એવી રચના આપણી નજરે
આવતી નથી. અલિંગકોષાગારમાં કેટલીક સ્તરીભૂત પેશિની
હાજરી, અને કેટલીકવાર તેની આસપાસ બહારની બાજુએ
વિંટળાયેલું પડ, એ બે વાતો પણ તે જીવશેષને હાલના સજીવ
કુટુંબની સાથે સંબંધથી જોડે છે. બન્નેની બાજતમાં
નવું કાષ્ઠ ઉત્પન્ન થઈ થડ જાડું બને છે, અને તેમનાં મૂળની
રચના પણ સમાન હોય છે. બીજી બાજુએ, તેમની વચ્ચે
અસમાનતા પણ છે, એક વર્ગની સહ્યો મોટાં વૃક્ષોના જેટલી
ઉંચી વધતી હતી, અને બીજા વર્ગની સહ્યો ટૂંકી જળ-વાસી
વનસ્પતિઓ છે, અને થડની જગાએ તેમને એક ચપટી
કર્ણિકા (ડિસ્ક) હોય છે. આઈસોઇટિસને શંકુ પણ
હોતો નથી.

પ્રાચીનજીવયુગ પૂરો થયા પછી શકવૃક્ષોના ઇતિહાસને
આપણે જરા પણ અનુસરી શકીશું ? ત્રિગુણિતયુગના ખડકો-
માંથી એક કે બે એવાં જીવશેષો પ્રાપ્ત થયાં છે, કે તેઓ
ત્રિગુણિતયુગના હોવાની આપણને શંકા પડે છે, સ્વીડનમાં
ત્રિગુણિતયુગના ઉપલા ખડકોમાંથી વિજેતીય અલિંગકોષવાળો
એક મોટો શંકુ હાથ આવ્યો છે, અને તે ઘણું ભાગે-કોઈ
શકવૃક્ષીનું જીવશેષ હોવાનું જણાય છે. જર્મનીમાં અને
સ્કાન્ડિનેવિયામાં ત્રિગુણિતયુગના ખડકોમાંથી 'બુરેમિઆ' નામની

શલ્કવૃક્ષી અને મિએડેસ્મિઆનાં બીજની મૂલ્ય-
બાબતો કેટલી બધી અસમાન હતી તે જોતાં, તથા તેમનાં
બીજાં અવયવોનાં લક્ષણોની ભિન્નતા તરફ નજર કરતાં, એ
વાત તદ્દન સ્પષ્ટ થાય છે, કે આ બે વર્ગોની ઉત્ક્રાંતિ એકમેકથી
તદ્દન સ્વતંત્ર હતી. હાથાચુડીનાજ કુટુંબની એક નાની
ઉપજાતમાં, અને સીતાહાર વર્ગના શલ્કવૃક્ષી નામના કુટુંબમાં,
એટલે, અવતરણ-વૃક્ષની બે ભિન્ન શાખાઓમાં તે સમયે
ખરેખર આવી ઉંચી જાતની પુનરુત્પત્તિની ખાસ જરૂર હતી.
તોપણ, બીજના સાધનથી વંશવૃદ્ધિ કરવાના આ બંને વર્ગો
પૈકી એકેકેની બાબતમાં, એ રીત લવિવ્યમાં કાયમ રહ્યાનો
કે તેનો વધારે વિકાસ થયાનો આપણી પાસે કાંઈજ પુરાવો
નથી. આપણી હાલની બીજધારી વનસ્પતિઓ તદ્દન જૂદાજ
કુટુંબોમાંથી ઉત્પન્ન થયેલી જણાય છે (પ્રકરણ ૨ થી ૪).

પ્રાચીનજીવયુગ પછી બધી શલ્કવૃક્ષી વનસ્પતિઓ નાશ
પામી, કે તેમણે કોઈક વંશજોને પાછળ મૂકી ? આ પ્રશ્ન
ખરેખર બહુજ અગત્યનો છે. આપણે હમણાંજ જોઈ ગયા કે
તેઓ હાથાચુડી કુટુંબની જનક નથી, કારણ કે આ કુટુંબનાં
જીવશેષો પ્રાચીનજીવયુગના ખડકોમાંથી પણ આપણે હાથ
આવે છે, અને તેઓ સીતાહાર વૃક્ષોની સાથે પણ કાંઈ
મહત્વનો સંબંધ બતાવતી નથી. એ બે વર્ગોની વચ્ચે સ્પષ્ટ
સંબંધ છે એ વાત ખરી, પણ તેઓ બંને એકજ પૂર્વજ-
માંથી ઉત્પન્ન થયા એવું સાબીત કરનાર પુરાવો હજી સુધી
આપણે મેળવી શક્યા નથી.

બીજી બાબતો, શલ્કવૃક્ષી અને આઈસોઇટિસની વચ્ચે

ઇટિસના જેવાં લાગતાં કેટલાંક જીવશેષો મળી આવ્યાં છે, પણ તેઓ આ પ્રશ્નનો ખુલાસો મેળવવામાં કાંઈ જ મદદ કરતાં નથી.

એ રીતે, શસ્કવૃક્ષીના ભવિષ્યના ઇતિહાસનો પ્રશ્ન આપણે અધુરો મૂકવો પડે છે; પ્રાચીનજીવયુગના આ મોટાં વનસ્પતિકુટુંબનો મધ્યજીવયુગના આરંભમાં ઘણે ભાગે તદ્દન નાશ થયો, અથવા, તેના અવનતિ પામતા કેટલાક નિર્ગળ વંશજો ભવિષ્યમાં અથડાતા ટીચાતા જીવ્યા. પાણી અને જમીન ખન્નેમાં વસનારી આઈસોઇટિસ નામની ઠીંગણી નાની વનસ્પતિઓ તેમની અવનતિની પરાકાષ્ઠા હોય એમ લાગે છે. હવે આપણે સીતાહાર કુટુંબની ઉત્ક્રાંતિના ઇતિહાસનું સિંહાવલોકન કરીએ.

મજાતીય અલિંગકોષોવાળી સીતાહારના ઇતિહાસ વિષે આપણને ખરાખર માહિતી નથી. એ કુટુંબનાં લક્ષણો ઉપરથી એટલી વાત સ્પષ્ટ થાય છે, કે તે પ્રાચીન અને આદ્ય હતું, પણ એ ઉપરાંત વધારે બહુવાનું આપણી પાસે કાંઈ જ સાધન નથી.

વિજાતીય અલિંગકોષોવાળી સીતાહારમાં, હાથાયુડીનું કુટુંબ અંગારયુગમાં સારી રીતે ઉછરતું હતું, અને ત્યારથી તે અત્યારમુધી તેનો વંશ કાયમ રહેલો છે. વધારેમાં, તે સમયની અને હાલની હાથાયુડીની રચનામાં કાંઈજ મહત્વનો ભેદ નથી. તેના કેટલાક પ્રાચીન સભ્યો હાલના જીવંત સભ્યોના જેટલા જ, કેટલાક એટલા, અને કેટલાક અહુજ અધારે ચિક-

એક આશ્ચર્યકારક ઉદ્દલિન્ગ પ્રાપ્ત થઈ છે, અને તે આ પ્રાચીન કુટુંબને આઘસોઘટિસની સાથે સાંધનારી એક સાંકળ હશે એમ શાસ્ત્રીઓનું માનવું છે. તેનું થડ ટટાર અને ૩ કુટથી વધારે લાંબું હતું. સિજિલેરિઆની પેઠે તેના થડની ઉપર પાંદડાંઓના મૂળનું સ્થાન બતાવનારા છાછરા ખાડાઓ છે, અને સીતાહાર-વૃક્ષના મુખ્ય ચાર મૂળીઆંની પેઠે આ થડના નીચલા ભાગમાં ચાર ટૂંકી મૂળીઆંના જેવીજ વસ્તુઓ ઉગેલી છે. આ ચાર ભૂજ ઉપ-મૂળીઆંના પાયાઓથી જડેલા છે. એ વાત સ્પષ્ટ છે, કે આ વિચિત્ર રચના શઠકવૃક્ષીનાં ચાર મૂળીઆંવાળા થડના પાયાની અને આઘસોઘટિસના ઉંડી ખાંચવાળાં દળદાર મૂળીઆં યુક્ત થડની વચ્ચે મધ્યસ્થ દશા બતાવે છે. આ વાત મત્ય છે, એમ સ્વીકારી લેવાનું આપણને બહુ મન થાય છે, પણ તેમની સૂક્ષ્મ બાબતોમાં આ સામ્ય વધારે ટકી શકતું નથી. પ્લુરોમિઆ નક્કી મોટા શંકુઓ ઉત્પન્ન કરતી હતી. તેમનાં શુવશેષભૂત થડની ઉપર મોટા શંકુઓ ઉગેલા હતા, અને તેમાં વિજાતીય અલિંગકોષો હાજર હતાં. પણ અત્રે આ એક થોડી સુફકેલી છે: સંશોધકોના કહેવા પ્રમાણે, ફલીભૂત પાંદડાના નીચલા પૃષ્ઠમાં એ અલિંગકોષાગાર ઉગેલું હતું; 'સીતાહારથી આ વાત તદ્દન ઉલટી છે. જ્યાં મુધી આ અસમાનતાનો ઘરાબર ખુલાસો થાય નહીં ત્યાં મુધી પ્લુરોમિઆ એ બે વર્ગોને સાંધનારી સાંકળ છે એમ માનવું તદ્દન અશક્ય છે.

ખટિકાયુગના અને તૃતીયયુગના ખડકોમાંથી આઘસો-

અશ્વપુરુષીનાં પાંદડાંઓ બહુજ નાનાં અને તેમની રચના કાંઈક જુદીજ ભાતની હોય છે. તેઓ પુષ્ટિના કાર્યમાં કાંઈજ ભાગ લેતાં નથી (હવાના અંગારવાયુમાંથી, કાર્બોનિક એસિડ ગેસ, અંગારતુ તત્વ ખેંચી લઈ એ તત્વને પાણી અને બીજા સાદા પદાર્થોની સાથે મેળવી વનસ્પતિને માટે ખોરાક બનાવવાની ક્રિયાને અંગાર-પરિપચન, કાર્બન-એસિમિલેશન અથવા પુષ્ટિ કહે છે.) સામાન્ય વનસ્પતિઓમાં એ કામ પાંદડાંનેજ કરવાનું હોય છે. પાંદડાંઓનું દરેક ચક્ર કે જુમખું લાંખું થઈ મ્યાનની પેઠે થડની આસપાસ વિંટળાઈ જાય છે. એ મ્યાનના અગ્ર ઉપર જે નાના નાના કાંટાઓ હોય છે, તેઓ આ પાંદડાંઓના કેવળ છૂટા ભાગો છે.

અશ્વપુરુષી ઉદ્ભવિજ્જોમાં, લીલા રંગની નાની ડાળીઓ, અથવા તેમનું મુખ્ય થડ પુષ્ટિનું કાર્ય કરે છે. આ ગાંઠાળુ થડની ગાંઠોમાંથી ડાળીઓ ઉત્પન્ન થાય છે, તેમની સંખ્યા તે સ્થળે આવેલા જુમખાનાં પાંદડાંઓના જેટલી હોય છે, પણ તેઓ તેમની કક્ષામાં નહિ પણ તેમની વચ્ચે વચ્ચે ઉગેલી હોય છે. એ રીતે, તેઓ વધારે ઉચી કોટિની ડાળીઓથી ભિન્ન છે. તેઓ પાંદડાના મ્યાનમાંથી બહાર ઉગી આવે છે, અને જ્યારે એ ડાળીઓ કળીઓમાં છૂપાયેલી હોય છે ત્યારે આ પાંદડાંઓજ તેમનું રક્ષણ કરે છે. તેના જમીનની અંદર રહેલા થડમાંથી જે ડાળીઓ કૂટેલી હોય છે, તેઓ પૈદી કેટલીકના પાયાઓમાંથી મૂળીઆં ઉત્પન્ન થાય છે; આ મૂળધારી ડાળીઓનો વધારે વિકાસ થતો નથી.

મજબૂત હોવાથી, અને તેમનાં પાંદડાંઓ થડને વિંટળાતા હોવાથી તેઓ કાંઈક જુદીજ નાતનો દેખાવ આપે છે. પાંદડાં અને ડાળીઓ બન્ને (ડાળીઓવાળા થડમાં) ગોળ વર્તુળાકારમાં કે ગુચ્છાળાંધ ગોઠવાયેલાં હોય છે. ઉપર વર્ણુવેલી ટ્રેટાક્ટનની બે સામાન્ય ઉપજાતો (ઇકવીસીટમ આર્વેન્સી અને ઇકવીમેકસીમમ) અને તેની બીજી કેટલીક ઉપજાતોમાં, જમીનની બહાર આવેલું થડ બે જાતનું હોય છે: એક શંકુધારી ફલીભૂત, અને બીજું પૌષ્ટિક થડ. શંકુધારી થડ શ્રીકા રંગનું, શાખાહીન, ટૂંકું અને અદ્વાયુષી હોય છે; અને પૌષ્ટિક થડ લીલા રંગનું, ડાળીઓવાળું, ઉંચું અને દીર્ઘાયુષી હોય છે તોપણ, તળાવોમાં ખૂબ ઉગતી લીસી-અશ્વપુચ્છી (સ્કુપ્-હૉર્સટેલ, ઇકવી લીનોસમ) વિગેરે ઉપજાતોના થડમાં આવે કાંઈજ ભેદ નથી. તેમની બાબતમાં, સામાન્ય લીલા રંગનાં થડ ઉપરજ શંકુઓ ઉગે છે. આ બધી ઉપજાતોને જમીનની અંદર પણ ડાળીઓવાળાં થડ હોય છે. એ થડ જમીનમાં પુષ્કળ ઉંડાં ઘૂસેલાં હોવાથી તે ઉદ્ભિજ્જને એકવાર નામ્યા પછી તેમને સહેલાઈથી ઉખેડી શકાતી નથી. ટૂંકામાં, અશ્વપુચ્છી ઉદ્ભિજ્જને એક પ્રાચીન કુટુંબની થોડી વંશજ છે; અને તોપણ, તેઓ હજી બળવાન છે. હાલની પરિસ્થિતિમાં તેઓ પોતાનો જીવનક્રમ બહુજ ઉત્તમ રીતે ચલાવવા સશક્ત છે હિપ્પોધિસનાં સરોવરોમાં તેઓ પુષ્કળ નામેલી છે, અને ત્યાંની જળ-વાસી સપુષ્પ વનસ્પતિઓને પણ તેઓ હરાવી ફર ખસેડી મૂકે છે.

હાલની ખીજ કોઈ પણ સજીવ પ્રચલ્નખીજના શંકુથી તદ્દન ભિન્ન છે. અશ્વપુચ્છીના શંકુનો અક્ષ વધારે મજબૂત હોય છે, અને તેની ઉપર ઢાલના જેવાં ભીંગડાંઓનાં અસંખ્ય ઝુમખાંઓ ખીચાખીચ ઉગેલાં હોય છે. એ ભીંગડાંઓની ઉપર અલિંગકોષો ઉત્પન્ન થાય છે. બહારથી જોનારને તો માત્ર ઢાલો જ દેખાય છે. તેઓ એટલી બધી ખીચાખીચ ઉગેલી હોય છે, કે તેમના પરસ્પર દબાણથી તેઓ પટકોણના આકારની થઈ જાય છે. ઘણીવાર દરેક ઝુમખામાં ૨૦ ભીંગડાં ઉગેલાં હોય છે. આ ઢાલ જેવા ભીંગડાંને એક દીંટું હોય છે, અને તે શંકુના અક્ષને કાટખૂણે વળગેલું હોય છે. એ દીંટાની ટોચ ઉપર જે ચપટી કઠિુંકા હોય છે તે જ આપણને ઢાલનો ભાસ ઉત્પન્ન કરે છે. દરેક કઠિુંકાની નીચલી બાજુએ, પછી ૧૦ અલિંગકોષાગારો વતું જાકારમાં ઉત્પન્ન થાય છે, અને તેઓ ભીંગડાંઓનાં દીંટાઓની વચ્ચેની બધી જગા રોકી દે છે.

એ વાત ધ્યાનમાં રાખવાની છે, કે લેખક આ ઢાલ જેવાં ભીંગડાંને બીજકણુદલ કહેતો નથી. હાલની અશ્વપુચ્છીની બાબતમાં કદાપિ આ શબ્દનો ઉપયોગ કરીએ, તો તેમાં કાંઈ વાંધો નથી; કારણ કે તેનાં ફલીભૂત ભીંગડાંનો આકાર તેનાં પૌષ્ટિક પાંદડાંઓથી ભિન્ન છે, અને તોપણ, તેમના બન્નેનું સ્થાન અને વિકાસ-પદ્ધતિ સમાન છે. પણ હાલની અશ્વપુચ્છીની જીવશેષભૂત પ્રાચીન સંબંધીઓની બાબતમાં તેમનું ફલીભૂત પાંદડું વસ્તુતઃ આખું પાંદડું નથી, એમ આપણને લાગે છે. બીજકણુદલની બાબતમાં ફલીભૂત પાંદડું અપૂર્ણ પાંદડુંના એક ભાગ હોયો જોઈએ.

તેની જનનેન્દ્રિય હમેશાં સ્પષ્ટ શંકુનો આકાર ધારકરે છે, અને આ ભાગ સામાન્ય ડાળીઓથી તદ્દન ભિન્ન હોય છે.

તેના થડની અંતર્ધાટના દ્વિદળ વનસ્પતિના પાતળ થડને ઘણે અંશે સમાન છે. તેમાં છૂટા છૂટા વાહિની-રેસાઓ વર્તુળાકારમાં ગોઠવાયેલા હોય છે; અને દરેક રેસો, ગાંઠ આગળ, બહાર દોડી પાંદડાના મ્યાનમાં દાખલ થાય છે, એ રીતે દરેક પાંદડામાં વાહિનીનો એક રેસો હોય છે. મુખ્ય થડ અને મુખ્ય ડાળીઓનો ગર પોલો હોય છે. દરેક વાહિની-રેસાની અંદરની બાજુએ એક પોલી નળી હોય છે, અને તેની મધ્ય ત્વચામાં પણ પોલી નળીઓનો એવો જ બીજો તંત્ર હોય છે. આ થડમાં કાષ્ઠ બહુ જ થોડું ઉત્પન્ન થાય છે, અને તેની ગાંઠ આગળ જે કાષ્ઠ ઉત્પન્ન થાય છે, તે વાહિની-રેસાઓને સાંધી એક સંપૂર્ણ અને સતત ચક્ર બનાવે છે.

તેનાં મૂળીઆં મુખ્યત્વે વધારે ઉંચી કેટલિનાં નમુનારૂપ મૂળને વધારે મળતાં આવે છે. શ્રીતાહારનાં મૂળીઆંની રચના આ મૂળીઆંથી તદ્દન ભિન્ન છે.

વધારેમાં, આ કુટુંબની બાળતમાં એ વાત ખાસ નોંધવા જેવી છે, કે તેની કેટલીક ઉપજાતોમાં, જર્મીનની અંદરના થડની ડાળીઓ ઉપર તેમની વંશવૃદ્ધિ કરનારી ગાંઠો (ટ્યુમર્સ) ઉત્પન્ન થાય છે.

અમ્બુપુટીના શંકુની રચના તદ્દન વિશિષ્ટ છે, અને તે

હાલની ખીજ કોઈ પણ સજીવ પ્રચલ્નખીજના શંકુથી તદ્દન મેન્ન છે. અશ્વપુચ્છીના શંકુનો અક્ષ વધારે મજબૂત હોય , અને તેની ઉપર હાલના જેવાં ભીંગડાંઓનાં અસંખ્ય જુમખાંઓ ખીચોખીચ ઉગેલાં હોય છે. એ ભીંગડાંઓની ઉપર અલિંગકોષો ઉત્પન્ન થાય છે. જહારથી જોનારને તો 'માત્ર' દાલો જ દેખાય છે. તેઓ એટલી બધી ખીચોખીચ ઉગેલી હોય છે, કે તેમના પરસ્પર દબાણથી તેઓ પટકોણના આકારની થઈ જાય છે. ઘણીવાર દરેક જુમખામાં ૨૦ ભીંગડાં ઉગેલાં હોય છે. આ દાલ જેવા ભીંગડાને એક દીંટું હોય છે, અને તે શંકુના અક્ષને કાટખૂણે વળગેલું હોય છે. એ દીંટાની ટોચ ઉપર જે ચપટી કર્ણિકા હોય છે તે જ આપણને હાલનો ભાસ ઉત્પન્ન કરે છે. દરેક કર્ણિકાની નીચલી બાજુએ, પ થી ૧૦ અલિંગકોષાગારો વર્તુળાકારમાં ઉત્પન્ન થાય છે, અને તેઓ ભીંગડાઓનાં દીંટાઓની વચ્ચેની બધી જગા રોકી દે છે.

એ વાત ધ્યાનમાં રાખવાની છે, કે લેખક આ દાલ જેવાં ભીંગડાંને ખીજકણુદલ કહેતો નથી. હાલની અશ્વપુચ્છીની બાબતમાં કદાપિ આ શબ્દનો ઉપયોગ કરીએ, તો તેમાં કાંઈ વાંધો નથી; કારણ કે તેનાં ફલીભૂત ભીંગડાનો આકાર તેનાં પૌષ્ટિક પાંદડાંઓથી ભિન્ન છે, અને તોપણ, તેમના બન્નેનું સ્થાન અને વિકાસ-પદ્ધતિ સમાન છે. પણ હાલની અશ્વપુચ્છીની જીવશેષભૂત પ્રાચીન સંબંધીઓની બાબતમાં તેમનું ફલીભૂત પાંદડું વસ્તુતઃ આપું પાંદડું નથી, એમ આપણને લાગે છે. ખીજકણુદલની બાબતમાં ફલીભૂત પાંદડું આખા પાંદડાંનો એક ભાગ હોવો જોઈએ.

તેના અલિંગકોષાગારમાં બધાં અલિંગકોષો એક જ જાતનાં હોય છે. તેમાં નવાઈની વાત એ છે, કે દરેક અલિંગકોષને ચાર લાંબી પટ્ટીઓ વળગેલી હોય છે: જ્યારે તેઓ ભીની હોય છે, ત્યારે તેઓ સંકેત્યાઈ અલિંગકોષની આસપાસ વિંટળાઈ જાય છે, પણ જ્યારે હવા સૂકી થાય છે ત્યારે તેઓ ફરીથી ખેંચાઈ સીધી થઈ જાય છે. એ રીતે તેઓ અલિંગકોષોને ગતિમા મૂકે છે. અલિંગકોષોને દૂર વેરી નાખવા માટે આ યંત્રનો ઉપયોગ થતો હશે, પણ ઉદ્ભિજ્જ-વેત્તાઓ હજી આ બાબતમાં કંઈ જ ચોક્કસ નિર્ણય ઉપર આવ્યા નથી.

આપણે પાછળ જોઈ ગયા, કે બધાં અલિંગકોષો એક જ જાતનાં હોય છે, અને તોપણ તેમની અનુસમાંગ લગભગ હમેશાં ભિન્નભિન્ન હોય છે. પુલ્લિંગ વ્યક્તિ નાની અને સ્ત્રિલિંગ વ્યક્તિ મોટી હોય છે. અનુસમાંગનો આ લેદ અલિંગકોષોની ઉપર આધાર રાખતો નથી, પણ જે પરિસ્થિતિમાં તેમનું અંકુરીલવન થાય છે તે પરિસ્થિતિ આ લેદનું કારણ છે. ભીની રેતી વિગેરે ખોરાકહીન જમીનમાં તેમનું અંકુરીલવન થાય તો પુલ્લિંગ અનુસમાંગ ઉત્પન્ન થાય છે, પણ ખોરાકથી સંપૂર્ણ હોય એવી જમીનમાં તેનું અંકુરીલવન થતાંજ સ્ત્રિલિંગ અનુસમાંગનો જન્મ થાય છે. આ અનુસમાંગ રંગે લીલી હોય છે. તે અને તેનાં ઉત્પત્તિ કરવાનાં લિંગકોષો હંસરાજની એ વસ્તુઓને લગભગ સમાન છે. હંસરાજની જે તેનાં ગુદ્ધકોષોને પણ ઘણા કોષકેશ હોય છે. એ વાત

ખરેખર આશ્ચર્યકારક છે, કે આ બે મહાન વર્ગોની અલિંગ-કોષધારી પેઢિઓ આટલી બધી લિન્ન છે, અને તેમની લિંગ-કોષધારી પેઢિઓ, એટલે, અનુસમાંગ બહુજ સમાન છે.

વીસ ઉપજતોનું અશ્વપુરછી નામનું આ નાનું કુટુંબ, પ્રાચીનજીવયુગના એક બહુ જ જૂના વનસ્પતિસમૂહનું વંશ-જ છે, અને તે તેના ઉત્ક્રાંતિના ઇતિહાસની છેલ્લી દશા પ્રગટ કરે છે. તેમના વિષે આપણને સારી માહિતી પ્રાપ્ત થઈ છે, અને તેના ભૂતકાળના ઇતિહાસને આપણે જેમ જેમ વધારે અનુસરીએ છીએ, તેમ તેમ એ કુટુંબ વધારે અગત્યનું અને ઉચી રચનાવાળું હોવાનું જણાય છે. દુકામાં, અશ્વપુરછી કુટુંબની ઉત્ક્રાંતિનો, પ્રાચીનજીવયુગથી તે આજસુધીનો ઇતિ-હાસ ઉત્તરોત્તર વિકાસનો નહિં પણ અવનતિનો છે.

તૃતીયયુગની ઉપજતો, સામાન્ય રીતે હાલની મોટી અશ્વપુરછીના જેવી હતી; મધ્યજીવયુગના ઉત્તરાર્ધની ઉપ-જતો પણ લગભગ એવી જ હતી. વીંદના ખડકોમાંથી પ્રાપ્ત થયેલી ઇકિવીસિટાઇટિસ બર્ચેટિ^૧ નામની ઉપજતને આ-પણી હાલની સાધારણ અશ્વપુરછીની પેઠે ગાંઠો (ટયુબર્સ) ઉત્પન્ન થતી હતી. અશ્વપુરછીની પેઠે ઇકિવીસિટાઇટિસની જાતમાં પણ પાંદડાંઓ મ્યાનની પેઠે થડને વિંટળાતાં હતાં અને તેથી આ જાણતમાં આ બે જાતો લગભગ સમાન હોવાથી તેઓ તુરત ઓળખી શકાતી નથી. વિવૃતખીજયુગના ખડકો-માંથી તેની મોટી ઉપજતો આપણે હાથ આવી છે, અને ત્રિયુ-

ષ્ટિત યુગના ખડકોમાં તો આ કુટુંબનાં સદસી વૃક્ષે દટાયેલાં આપણી નજરે ચઢે છે. દાખલા તરિકે, ઇકવીસિટાઇટિસ એરેનેશીયસનું થડ ૮ ઇંચ જાડું હતું અને તેની ઉપર ઉગેલા એક જુમખામાં ૧૨૦ પાંદડાંઓ હતાં. સ્વીડનમાં ત્રિશુષ્ટિતયુગના ક્રિટિક નામના ઉપલા ખડકોમાંથી ઇકવી. સ્ટ્રેનિકસ નામની એક ઉપજાત હાથ લાગી છે. તેનું ખારીક અવલોકન કરવાથી વિદ્વાન્ હેલિને માલમ પડ્યું, કે તેના એક જુમખામાં જેટલાં પાંદડાંઓ ઉગ્યાં હતાં, તેનાથી ત્રણ ગણા વાહિની-રેસાઓ તેના થડમાં હાજર હતા. હાલની સજીવ અશ્વપુરછી ઉદ્ભિજ્જનેમાં આ બન્નેની સંખ્યા સમાન હોય છે. એ જીવશેષમાં વાહિની-રેસાઓની સંખ્યા વધારે હોવાથી એ વાત નક્કી છે, કે તેનો વાહિની-તંત્ર વધારે કિલ્બટ અને ઉચી જાતનો હતો. આ જીવશેષભૂત ઉપજાતનો વાહિની-તંત્ર પ્રાચીનજીવયુગનાં અશ્વપુરછી-વૃક્ષોના જેવો હતો. તોપણ, હાલની અશ્વપુરછીની પેઠે ઇકવીસિટાઇટિસની જાતમાં પાંદડાંઓ મ્યાનની પેઠે થડને વિંટળાતાં હતાં, અને આ બન્ને વર્ગોની જનનેંદ્રિયોનું સ્વરૂપ પણ સમાન હતું. ક્રિટિક યુગની એક ઉપજાતમાં, વિદ્વાન્ હેલિએ ઢાલના જેવાં ભીંગડાંનું કાળજીપૂર્વક અવલોકન કર્યું છે; તેમની બાજતમાં દરેક ભીંગડાની ઉપર અલિંગકોષાગારોની સંખ્યા વધારે હતી, પણ એ સિવાય બીજી બાજતોમાં તેઓ હાલની અશ્વપુરછીનાં ભીંગડાંઓને સંપૂર્ણ રીતે સમાન હતાં.

ત્રિશુષ્ટિતયુગના ખડકોમાંથી પ્રાપ્ત થયેલી શીઝોન્યુરા

નામની એક ઉપજાતમા (આ ઉપજાત મુખ્યત્વે પૂર્વ ગોળા-
ર્ધમાં વધારે ઉગતી હતી), પાંદડાં રૂપી મ્યાનો અનિયમિત-
પણે ચીરાયેલી હતી, અને તેથી તેઓ છુટાં પાંદડાંઓનો
આભાસ ઉત્પન્ન કરતી હતી. દ્વિટિક યુગમાંથી હાથ આવેલી
નયી-ખેત (નીઓ-કેલેમાઈટિસ) નામની ઉપજાતમાં
પાંદડાંઓ સંપૂર્ણ રીતે છુટાં, લાંબાં અને સાંકડાં હતાં, અને
તેઓ થડને જરા પણ વિંટળાયેલાં ન હતાં. આ જાત અને
તેની સમકાલીન ઇકવીસીટાઇટિસની જાતમાં, તેમના દરેક
જુમખાનાં પાંદડાંઓની સંખ્યાથી બે કે ત્રણ ગણા વાહિની-
રેસાઓ થડમાં હાજર હતા. નયી-ખેતનાં જાણીતાં લક્ષણો
ઉપરથી તો એટલું સ્પષ્ટ છે, કે તે પ્રાચીન જીવયુગની ખેત
(કેલેમાઈટિસ) જાતનીજ વંશ જ હતી. ત્રિશુષ્ણિત યુગની
ઉદ્ભિજ્જસ્ટિમાં હાલની ઉદ્ભિજ્જનેની પૂર્વજો અને પ્રાચીન-
જીવયુગની વંશજો બન્ને હાજર હતી, અને એક વર્ગનું
રૂપાંતર થઈ બીજા વર્ગની ઉદ્ભિજ્જને ઉત્પન્ન થઈ, અથવા તે
સમયે આવું રૂપાંતર થતું હતું એમ સાબીત કરનારાં ઘણાં
જીવશોષો તેજ યુગના ખડકોમાંથી આપણને પ્રાપ્ત થયેલાં છે.
તોપણ, એ રૂપાંતર તે સમયે બરાબર સંપૂર્ણ થયું ન હતું.
વિદ્વાન હેલિએ સાબીત કરી આપ્યું છે, કે હાલની અશ્વપુચ્છી
વનસ્પતિઓ નક્કી ત્રિશુષ્ણિત યુગની રાક્ષસી ઇકવીસીટાઇ-
ટિસ ઉદ્ભિજ્જનેમાંથી પ્રત્યક્ષ અને સીધા વંશમાં ઉતરી
આવેલી છે. પ્રાચીન જીવયુગના ખડકોમાંથી પ્રાપ્ત થતી બહુજ
વધારે વિકસિત ખેત નામની ઉદ્ભિજ્જને અને ત્રિશુષ્ણિત
યુગની વનસ્પતિઓની વચ્ચેની સંબંધની સાંકળ હજી સંપૂર્ણ

થઈ શકી નથી; તોપણ, નથી-ખેત અને ઇકવીસીટાઇટિસ સ્કેનીકસની ઉપજતો આ બે ઉદ્દલિન્ગસૃષ્ટિઓને લગભગ મંપૂર્ણ રીતે જોડતી હોય એમ લાગે છે.

કમનસીબે, મધ્યજીવયુગના ખડકોમાંથી અશ્વપુચ્છીનું એક પણ અશ્મીભૂત જીવશેષ હજી મુઘી આપણે હાથ ચઢ્યું નથી, તેથી એ યુગની અશ્વપુચ્છી ઉદ્દલિન્ગનેની રચના વિષે આપણું જ્ઞાન બહુ જ ઓછું છે. પ્રાચીનજીવયુગના ખડકોમાં, અશ્મીભૂત, છાપો અથવા મુદ્રાઓ, અને બીજાંઓ એ ત્રણે જાતનાં જીવશેષોની મોટી સંખ્યા હાજર છે, તેથી તેમની રચના સંબંધે આપણું જ્ઞાન બહુ જ વિશાળ છે, તોપણ, એ તૂટક જીવશેષોને ગોઠવી એક વનસ્પતિનું ચોક્કસ શરીર ઉત્પન્ન કરવું એ બહુ જ કઠિણ છે. તોપણ, આપણા ચાલુ કામ પૂરતી હકીકત એકઠી કરી એ પ્રાચીન વનસ્પતિસમૂહના સ્વરૂપને મમજવા આપણે યથાશક્તિ પ્રયાસ કરીશું.

પ્રાચીનજીવયુગનાં અશ્વપુચ્છી વૃક્ષોને, આ કુટુંબની તે યુગની મુખ્ય જાત ‘ખેત’ ઉપરથી આપણે ‘ખેત’ એવું જ નામ આપીશું તો નહશે. તેમનું સ્વરૂપ ખરૂં જાણેવું લાગવાથી તેમને પ્રથમ એ નામ આપવામાં આવ્યું હતું, પણ ઇ. સ. ૧૮૭૪ માં વિદ્વાન્ સક્લાઉએ તેમને પ્રથમ અશ્વપુચ્છીની સાથે સરખાવી બતાવી. એ રીતે, ખેત ઉદ્દલિન્ગે ઇકવીસીટાઇટિસ નામના મહાન્ વર્ગનો એક ભાગ છે, અને તેમાંથી આપણી હાલની અશ્વપુચ્છીઓ અને મધ્યજીવયુગની ઇકવીસીટાઇટિસ વનસ્પતિઓ ભવિષ્યમાં ઉત્ક્રાંત થઈ, બધી

નહીં તો બલ્કે કેટલીક બેત ઉદ્ભિન્નભે તો વૃક્ષો હતી, અને ઘણે ભાગે તેઓ રાક્ષસી સીતાહારના બેટલી ઉંચી વધતો હતી. ઘણી બાબતોમાં, તેનાં ઉંચાં ટટાર થકી કાદવમાં ઘસડાતા ભૂ-પ્રકાંડમાંથી (હીઓમ્સ) ઉત્પન્ન થયેલાં દેખાય છે. હાલની કેટલીક સજીવ અશ્વપુચ્છીના બેવોજ લગલગ તેમનો દેખાવ હતો, માત્ર આ પ્રાચીન બેત ઉદ્ભિન્નભેતું કદ બહુ જ મોટું હતું. મોટા શાખાતંત્રવાળાં આ વૃક્ષો બહુજ સુંદર દેખાતાં હશે. તેમને પુષ્કળ ડાળીઓ અને બહુજ નાનુક ડાંખળીઓ હતી.

હાલની અશ્વપુચ્છીઓની પેઠે, તેમનાં પાંદડાં હમેશાં ગુચ્છાબંધ ઉગતાં હતાં. તેઓ પરસ્પર તદન છૂટાં, અથવા માત્ર પાયાઓ આગળજ સંધાયેલાં હતાં. અંગારયુગની ઉપજતોમાં તેઓ સામાન્ય રીતે સાદાં અને સાંકડાં હતાં. સુખ્ય થકી કે મોટી શાખાઓની ઉપર ઉગેલાં પાંદડાંઓ માત્ર થોડાજ ઇંચ લાંબાં હતાં, અને નાની ડાંખળીઓમાંથી ઉત્પન્ન થયેલાં પાંદડાંઓ બહુજ ઝીણાં, પણ ગુચ્છાબંધ ઉગેલાં હતાં, અને તેથી એકંદરે તેમનું મોટું પૃષ્ઠ હવા-અજવાળામાં ખૂલ્લું રહેતું હતું. ઘણીવાર, રડતી કલચણની (વીર્પીંગ વીલો) ડાળીઓની પેઠે તેની બહુજ નાની ડાંખળીઓ નમી જઈ નીચે લટકી પડેલી હતી. હાલની સજીવ અશ્વપુચ્છીઓની પેઠે, તેમની ડાળીઓ થડની ગાંઠો ઉપર પાંદડાંઓની વચલી જગાઓમાં જ ઉગેલી હતી. કેટલીક ઉપજતોમાં, ડાળીઓ ગુચ્છાબંધ અને થડની માત્ર અમુક ગાંઠો ઉપર જ ઉત્પન્ન થતી હતી; બીજી ઉપજતોમાં તેઓ બધી ગાંઠો ઉપર ઉગતી, પણ સામાન્ય રીતે,

દરેક ગાંઠ આગળ માત્ર એકજ ડાળી ઉત્પન્ન થતી હતી; વળી બીજી કેટલીક ઉપજતોમાં ડાળીઓ બહુજ થોડી અને અનિયમિતપણે છૂટી છવાઈ ઉગેલી હતી. કેટલોક પુરાવો એમ સાબીત કરે છે, કે કેટલીક ડાળીઓ અમુક સમયે વખતોવખત ખરી પડતી હતી, અને બહુજ નાનુક ડાંખળીઓની ખાળતમાં ઘણે ભાગે હમેશા એમ જ બનતું હોય તો એ વાત મંભવે છે. હાલની અશ્વપુચ્છીઓમાં, ઘોરગસેલા (લાયર્) અને રૅન્ડમ્ સાઈપ્રસ (ટેકસોડિઅમ ડીસ્ટીચમ) આ બે ઉપજતો એવું જ દૃશ્ય પ્રગટ કરે છે.

તેમના શંકુઓ બહુજ ઉંચા વિકાસ પામેલી જનનેન્દ્રિયો હતી, અને ઘણીવાર તેઓ હાલની કોઈ પણ અલિંગકોષધારી ઉદ્ભિન્નજ્ઞની જનનેન્દ્રિયોથી વધારે કિલ્લ રચનાવાળી હતી. તેઓ ડાંખળીઓની ટોચ ઉપર ઉગતા; પણ લગભગ આઠ ઇંચ લાંબા કેટલાક બહુ જ મોટા શંકુઓ મુખ્ય થઈ કે મજબૂત શાખાની ઉપરજ ઉત્પન્ન થતા હતા, અને તેમની રચના ગુચ્છાબંધ હતી.

થડના નીચલા ભાગ ઉપર પુષ્કળ મૂળીઆં ફૂટેલાં હતા. ગ્રેન્ડ યુરિએ વણુવેલા એક જીવશેષનું થડ તો તેના પાયાથી લગભગ ૯ ફુટ ઉંચાઈ મુખી મૂળીઆથી ઢંકાયેલું હતું.

હવે આપણે બેત ઉદ્ભિન્નજ્ઞેની રચનાની મુખ્ય મુખ્ય ખાખતો તપાસીશું; કારણ કે, તેનાં બધાં અવયવોનાં જીવશેષોનું બહુજ સારું જતન થયેલું છે. ઉત્તમમાં ઉત્તમ નમુનાઓ, કેટલેક અંશે, ઇંગ્લાંડમાં અંગારયુગના નીચલા ખડકોમાં

આવેલા કોલસાના ગોળાઓમાંથી, અને કેટલેક અંશે, ક્રાન્સમાં એજ યુગના ઉપલા ખડકોમાંથી આપણને પ્રાપ્ત થયા છે. અશ્વપુચ્છીની પેઠે, તેના મુખ્ય થડમાં ગર પોલો હતો, અને બહુજ ઝીણી ડાળીઓ સિવાય થડના બાકીના બીજા બધા ભાગોમાં પણ ગરનું એજ સ્વરૂપ હતું. બેતનાં બહુજ સામાન્ય જીવશોષો આ પોલા ગરનાંજ બીજાં છે. એવાં કેટલાંક બીજાંનો વ્યાપ આશરે એક ફુટ છે. આટલા ઘેરાવાવાળો ગર જે થડનો ભાગ હશે તેવા વૃક્ષનું કદ કેટલું બધું મોટું હશે !

ખાત્યાવસ્થામાં, બેતનું થડ કે ડાળી લગલગ હાલની અશ્વપુચ્છીના જેવી જ હતી. તેમાં પણ, છૂટા છૂટા વાહિની-રેસાઓનું ચક્ર હતું, અને દરેક રેસાની અંદરની બાજુએ એક પોલી નળી હતી. બેતના આવા બાળક થડનો પરિચ્છેદ જોઈ કોઈ પણ ઉદ્દલિન્નજેતા તેને એકદમ ‘અશ્વપુચ્છીનું જીવશોષ’ કહેશે. પણ બેતની આ દશા તેની આખી જીંદગીમાં કાયમ રહેતી ન હતી. ભવિષ્યમાં, વિવૃત્તબીજા કે દ્વિદળ વૃક્ષની પેઠે તે બેત વૃક્ષ પોતાના થડને જાડાઈમાં વધારવા લાગ્યું. તેના થડમાં નવા કાષ્ઠનો પહોળો પ્રદેશ ઉમેરાયો. તેમા વચ્ચે વચ્ચે ગરની પટ્ટીઓ હતી; આ નવા કાષ્ઠની બહારની બાજુએ વલ્કક હતું, અને તેમની બન્નેની વચ્ચે પરિવર્ધિની પેશિ હાજર હતી. કેટલાંક જીવશોષોમાં એ પરિવર્ધિની પેશિનાં નાજુક ટોપો પણ સચવાઈ રહેલાં જણાય છે. ઘણી બેત ઉદ્દલિન્નજેનાં જીવશોષોની આવી રચના હોય છે; જેમાં નવું કાષ્ઠ ઉત્પન્ન ન થયું હોય એવા બાળક થડનું. જીવશોષ

માત્ર કોઈ કોઈ વારજ આપણે હાથ ચઢે છે. એતના થડમાં નવા કાષ્ઠની પેશિઓ હાજર હોવાથી ઉત્તમ ઉદ્ભિજ્ઞજવેતાઓ પણ એ વનસ્પતિઓનું યથાર્થ સ્વરૂપ સમજવામાં લાંબા સમય મુધી છેતરાયા. એત અશ્વપુચ્છીની સંબંધી હતી એ જૂના મતનો તિરસ્કાર થયો અને તે વનસ્પતિઓ વિવૃતખીજવર્ગની ઉદ્ભિજ્ઞજે છે એ વાત સ્વીકારાઈ; કારણ કે પ્રચન્નખીજમાં શંકુધારીની પેઠે નવું કાષ્ઠ હોઈ શકે એ વાત કેવળ અવિશ્વસનીય હતી. ટૂંકામાં, સીતાહારના કુટુંબમાં સીજિલેરિઆના સંબંધમાં જેવો પ્રશ્ન ઉત્પન્ન થયો હતો તેવોજ આ પ્રશ્ન હતો. લવિધ્યમાં તેમની જનનેદ્રિયો સંબંધે વધારે માહિતી મળી, તેમજ, ખીજાં કુટુંબોની પણ એવીજ સમાન ખાબતો લક્ષમાં લેવાઈ, અને છેવટે શાસ્ત્રીઓ એવા નિર્ણય ઉપર આવ્યા, કે ખીજધારી ઉદ્ભિજ્ઞજેની પેઠે પ્રચન્નખીજ વનસ્પતિઓમાં પણ નવું કાષ્ઠ ઉત્પન્ન થવું અસંભવિત ન હતું.

એત ઉદ્ભિજ્ઞજેમાંજ, કાષ્ઠ અને વડકકની રચના લગભગ શંકુધારીના જેટલીજ ઉંચી જાતની હતી; અલબત્ત, તેમની કેટલીક ઝીણી ઝીણી ખાબતોમાં ભેદ હતો. અંગાર-યુગના ઉપલા ખડકોમાંથી જડેલી કેલેમોડેન્ડ્રોન નામની જાતમાં કાષ્ઠની રચના વધારે ક્લિષ્ટ હતી, અને તેમાં મુખ્યત્વે ગરની પટ્ટીઓ બહુજ ઉંચી જાતની હતી. એના જેવી બીજી ઘણી જાતો હતી. જૂન-માડની (કોર્ક-ઓક) પેઠે કેટલીક એત વનસ્પતિઓ બહુજ જડી છાલ ઉત્પન્ન

કરતી હતી. તેની કેટલીક ઉપજતોના થડમાં વાહિની-રેસાઓની વ્યવસ્થા ત્રિગુણિતયુગની ઉપર વર્ણવેલી કેટલીક અશ્વપુરુષીઓના વાહિની-તંત્રના જેવીજ હતી. હાલની જીવંત અશ્વપુરુષીમાં, એ રેસાઓની સંખ્યા અને ગાંઠ આગળ ઉગેલાં પાંદડાંઓની સંખ્યા મમાન છે; પણ પ્રસ્તુત પ્રાચીન ઉપજતોમાં રેસાઓની મંખ્યા જમણી કે ત્રણગણી હતી.

કેમ્બ્રિજના વિદ્વાન ટોમસે થોડાં વર્ષ ઉપર નાનાં ડાંખળીઓની ઉપર ઉગેલાં નાનાં નાનુક પાંદડાંઓની રચનાનું બહુજ સાફ અને ખારીક અવલોકન કર્યું છે. તેઓ યથાર્થ અને સંપૂર્ણ નાનાં પાંદડાંઓ હતાં. એ દરેક પાંદડામાં એક વાહિની-રેસો, મંડજ-મ્યાન (સ્ટાર્ચ-શીધ), અંગાર-પરિપચનની પેશિ, યાંત્રિકબળ આપનારી રેસાવાળી પેશિ, અને બહિર્વંચા એટલી વસ્તુઓ હતી, અને તે પાંદડાના માત્ર ઉપલા પૃષ્ઠ ઉપર એ બહિર્વંચામાં તુંડકો (સ્ટોમેટા) હતાં. તે આખી ડાળી લટકતી રહેતી હોવાથી તેનાં પાંદડાંઓની વાસ્તવિક નીચલી બાજુ આ સ્થિતિમાં ઉપલી બાજુ જનતી હતી. એ તુંડકોના કેપોની દિવાલો ઉપર, હાલની અશ્વપુરુષીઓમાં હોય છે એવા જ કેટલાંક ચિહ્નો હતાં. આથી વધારે સારી અને સંપૂર્ણ રચના બતાવનારાં ખીજાં કોઈ જીવશ્રેણી આપણે હાથ લાગ્યાં નથી.

મૂળીઓ પ્રત્યક્ષ થડમાંથી જ ઉત્પન્ન થતાં હતાં; અશ્વપુરુષીમાં તો તેઓ ડાળીઓના પાયાઓમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે.

કેટલીક રીતે એ મૂળીઆંની રચના અશ્વપુચ્છીના મૂળીઆંને આબેહુમ સમાન છે, પણ બેતનાં મૂળીઆં બહુજ વધારે મોટાં હતાં, અને થડની પેઠે તેઓ પણ નવા કાષ્ઠની પુષ્કળ પેશિ ઉત્પન્ન કરતાં હતાં. તેમની રચના સંબંધે એક નવાઈ ભરેલી વાત એ છે, કે તેમની મધ્યત્વચામાં મોટી હવા-ગળોલો (એર-સ્પેસીસ) હતી. ઘણી ભીની જમીનમાં કે પાણીમાં ઉગનારાં મૂળની રચનાનું આ વિશિષ્ટ લક્ષણ છે.

હવે આપણે તેના શંકુઓની રચનાને તપાસીએ. સામાન્ય રીતે, તેઓ અશ્વપુચ્છીના શંકુઓથી વધારે કિલ્લટ રચનાવાળા હતા. અશ્વપુચ્છીના શંકુનો અક્ષ ઢાલના જેવાં ફલીભૂત ભીંગડાંઓથી ખીચાખીચાં ભરેલો હતો. બેત વૃક્ષના શંકુના અક્ષની ઉપર ઢાલના જેવાં ફલીભૂત ભીંગડાંઓ તો હતાંજ, પણ તે ઉપરાંત તેને એ ભીંગડાંઓનું રક્ષણ કરનારાં સ્તરીભૂત ઉપપર્ણો પણ હતાં. સામાન્ય બેતની જનનેંદ્રિયની રચના આ પ્રમાણે હોય છે: આખા શંકુની ઉપર ફલીભૂત ભીંગડાંનાં અને સ્તરીભૂત ઉપપર્ણનાં ઝુમખાં અવારનવાર નિયમિત પછે ઉગેલાં હોય છે. એ ઝુમખાંઓની વચ્ચેનું અંતરબંધે સ્થળે સમાન હોવાથી, બે સ્તરીભૂત ઉપપર્ણનાં ઝુમખાંઓની વચ્ચે, અને તેમનાથી સમાન અંતરે ફલીભૂત ભીંગડાંનું ઝુમખું હોય છે, અને એવીજ રીતે બે ફલીભૂત ભીંગડાંઓના ઝુમખાંની વચ્ચે અને તેમનાથી સમાન અંતરે સ્તરીભૂત ઉપપર્ણનું ઝુમખું ઉગેલું હોય છે. સામાન્ય રીતે, ફલીભૂત ભીંગડાંઓથી ઝમણાં ઉપપર્ણો એક ઝુમખામાં હાજર હોય છે.

આ ફલીભૂત ભીંગડાંઓનો આકાર અશ્વપુચ્છીનાં ભીંગડાંઓના જેવોજ હોય છે. તેઓ પણ ઢાલના જેવાં હોય છે, અને એ ઢાલની નીચલી ખાંભુએ અલિંગકોષાગારો ઉત્પન્ન થાય છે, પણ જેતની ખાખતમાં તેમની સંખ્યા માત્ર ચારજ હોય છે.

ક્રાન્સની કેટલીક જેતમાં, આ શંકુઓની રચના વધારે ઉંચી જાતની હોય છે; તેમની ખાખતમાં, ફલીભૂત ભીંગડાંઓની ઉપલાં અને નીચલાં ઉપપર્ણો વધારે વિકાસ પામી પરસ્પર મળી જાય છે; અને એ રીતે ઉત્પન્ન થયેલી બંધ બખોલમાં તે ફલીભૂત ભીંગડાંઓ કેદ થાય છે.

આ જાતના ઘણા શંકુઓમાં અલિંગકોષાગારો સામાન્યતઃ ચાર ચારના સમૂહોમાં હોય છે, અને તેઓ બધાં સજાતીય હોય છે. તોપણ, તેઓ પૈકી કેટલાંક અલિંગકોષો નિરૂપયોગી બનેલાં હોય છે. જેતની એક ઉપજાતનો શંકુ વિજાતીય અલિંગકોષવાળો છે, એટલે તેના એકજ શંકુની ઉપર બે સિન્ન જાતનાં અલિંગકોષો ઉત્પન્ન થતાં હતાં, અને નાનાં અલિંગકોષોના વ્યાસથી મોટાં અલિંગકોષોનો વ્યાસ ત્રણ ગણો મોટો હતો. વિજાતીય અલિંગકોષોની આ દશા બહુ ઉંચી કોટિની ન હતી. એ મોટાં કોષોની સાથે નિરૂપયોગી બનેલાં અલિંગકોષો પણ હાજર છે. તેથી એવું સૂચન થાય છે, કે આ જેત વનસ્પતિઓમાં વિજાતીય અલિંગકોષોની ઉત્પત્તિ શરૂ થઈ. કેટલાંક અલિંગકોષો નિરૂપયોગી ન્યવાથી

બાકી રહેલા કોષો વધી મોટા અલિંગકોષો બની શક્યા. હાલની કેટલીક જળ-હંસરાજમાં વિદ્વાનોએ એવોજ પ્રયોગ કરી મોટા અલિંગકોષો ઉત્પન્ન કર્યા છે.

તોપણ, કેટલીક બેત વનસ્પતિઓ, આ બાબતમાં પણ, તેમની વંશજોથી વધારે વિકસિત હતી; કારણકે તેઓ બે જાતનાં અલિંગકોષો ઉત્પન્ન કરતી હતી. વિજાતીય અલિંગ-કોષો ઉત્પન્ન કરનારી સીતાહારનો વિકાસ આ બાબતમાં અલગત બેત ઉદ્ભવજ્ઞોથી વધારે ઉંચી જાતનો હતો.

બેતની એક બીજી ઉપજાતના શંકુમાં, ફક્ત ભૂત ભીંગડાંઓ, ઉપપણોનાં ગુમખાંઓની ખરાબર મધ્યમાં ઉગવાને બદલે, તેમની નીચે, તેમની કક્ષાઓમાંથી જ ઉત્પન્ન થતાં હતાં. આ વાતથી એવી શંકા ઉભી થાય છે, કે એ ફક્ત ભૂત પાંદડાંઓ ખરેખર બીજકણુદલ તો નહિં હોય ! તેઓ ઘણે ભાગે ડાળીઓ તો ન હતી, પણ એ વાત તદ્દન સંભવિત છે, કે આ બન્ને જાતની જનનેદ્રિયોમાં એ ભીંગડાંઓ પ્રથમ તેમની નીચે જ ઉગેલાં ઉપપણોમાંથી ઉત્પન્ન થયેલી વસ્તુઓ હશે, અને તેથી તેઓ આખાં પાંદડાંઓ નહિ, પણ પાંદડાંઓના અચુક ભાગો છે.

અત્યાર મુઘી કરેલું વર્ણન, અંગારયુગની બેતને, એટલે અંગારયુગના ઉત્તરાર્ધમાં ઉછરતી બેત વનસ્પતિઓને લાગુ પડે છે. અંગારયુગના પૂર્વાર્ધની કે મત્સ્યસ્તર યુગની બેત વિષે આપણને આટલી બધી માહિતી નથી, પણ તેમના

સંબંધે માત્ર એક કે બે વાતો જણાવવા જેવી છે. અંગારયુગના નીચલા, અને મત્સ્યસ્તરયુગના ઉપલા ખડકોમાંથી પુરાણી-બેત (આર્કિઓ-ટેલેમાઈટિસ) નામની બેતની એક બહુજ મહત્વની જાત મળી આવી છે. તેના વંશજોની પેઠે પુરાણી-બેત પણ વૃક્ષ હતું, અને તેની રચના પણ કાંઈક વિશિષ્ટ હતી. તેના ઘડની ઉપર ઉગેલા દરેક ઝુમખાનાં પાંદડાં તેમના નીચલા ઝુમખાનાં પાંદડાંઓની ખરાબર ઉપર ઉત્પન્ન થયેલાં હતાં; પણ સવિધ્યની બેત અને અશ્વપુચ્છીઓમાં દરેક ઝુમખાનાં પાંદડાં તેમના નીચલા ઝુમખાનાં પાંદડાંઓથી અવારનવાર જગાએ ઉગેલાં હોય છે. પણ વધારે નવાઈ ભરેલી સિન્નતા તો એ પાંદડાંઓનેજ લગતી છે. પુરાણી-બેતનાં પાંદડાંઓ લાંબાં હોય છે, અને તેઓ ટોચમાંથી વારંવાર ચીપીઆના જેવાં ફાંટાઓ ઉત્પન્ન કરે છે. સામાન્ય અશ્વપુચ્છીનાં પાંદડાંઓ સાદાં અને નાનાં હોય છે, અને તેમની બાજતમાં આવું કાંઈ જ હોતું નથી. તોપણ, અંગારયુગના ઉપલા ખડકોમાંથી ઈંમણું એક બેતનું જીવજોપ આપણને મળી આવ્યું છે, અને તેનાં પાંદડાંઓ પુરાણી-બેતને બહુ જ મળતાં આવે છે.

પુરાણી-બેતના શંકુઓ પણ બહુ રમુજી હતા, ઉપ-પર્ણોનાં ઝુમખાંઓ અને ફલીભૂત ભીંગડાંઓની અંખ્યા મમાન ન હતી, અને આખા શંકુની ઉપર તેમનું સ્થાન પણ અવાર નવાર ન હતું. એ શંકુનાં લગલગ બધાં ઝુમખાંઓ ફલીભૂત ભીંગડાંઓથી ભરેલાં હતાં, અને કોઈ કોઈ વાર જ બહુ લાંબે અંતરે ઉપપર્ણો ઉગેલાં આપણી નજરે આવતાં હતાં. એ રીતે;

આ પ્રાચીન જોતના શંકુની વ્યવસ્થા બીજી જોત-ઉદ્ભિજ્ઞેથી હાલની સામાન્ય અશ્વપુરુષીને વધારે સમાન છે. તોપણ, એ દરેક ફલીભૂત ભીંગડાની ઉપર ચાર અલિંગકોષાગારો ઉત્પન્ન થતાં હતાં, અને એ બાબતમાં પુરાણી-જોત પ્રાચીનજીવયુગની જોતને વધારે મળતી આવે છે. પ્રાચીનજીવયુગના બીજા કેટલાક શંકુઓ અશ્વપુરુષીને કાંઈક કાંઈક અંશે મળતા આવે છે, પણ તેમના સંબંધે આપણને બહુ માહિતી નથી. તોપણ, એટલી વાત તો સ્પષ્ટ છે, કે આ કુટુંબની જનનેંદ્રિયોમાં તે સમયે અત્યંત વિવિધતા હતી.

અંગારયુગના નીચલા ખડકોમાંથી પ્રાપ્ત થયેલું જોતનું એક જીવશેષ જરા મહત્વનું છે, કારણ કે તેના કાષ્ઠની રચના કાંઈક વિશિષ્ટ છે. અશ્વપુરુષી વિગેરે સામાન્ય જોતમાં, બધું કાષ્ઠ વાહિની-રેસો અને પોલી નળી બન્નેની બહારની બાજુએ હોય છે, અને તે આખું કાષ્ઠ અંદરથી બહારની બાજુ તરફ વધે છે. પણ આઘ-જોતના (પ્રોટો-કેલેમાઇટિસ) એ જીવશેષમાં તે નળીની અંદરની બાજુએ પણ કાષ્ઠ છે અને આ લાગ બહારથી અંદરની બાજુ તરફ વિકસેલો છે. બીજા સમૂહોની સાથે, અને મુખ્યત્વે સ્કીનોફાઇલમના કુટુંબની સાથે સરખામણી કરવામાં આ તફાવત બહુ જ મહત્વનું સાધન થશે.

ઉત્તરસમુદ્રમાં આવેલા બેર ટાપુમાં મત્સ્યસ્તર યુગના ઉપલા ખડકોમાંથી સ્યુડોબોર્નિઆ નામની એક આશ્ચર્ય-કારક ઉદ્ભિજ્ઞ આપણને હાથ લાગી છે. તે વૃક્ષના જેટલી

ઉંચી વધતી ન હતી, અને તોપણ તે એક મોટી વનસ્પતિ હતી. તેનું થડ ગાંડાળું હતું, અને તેની ઉપર ઉગેલો દરેક ગુચ્છો આશરે ચાર પાંદડાંઓનો બનેલો હતો. પુરાણ-ખેતનાં પાંદડાંઓથી પણ આ પાંદડાંઓ વધારે સંયુક્ત હતાં; કારણ કે તેના દરેક પાંદડામાંથી ચીપીઆના જેવા ફાંટાઓ અને ઉપફાંટાઓ ઉત્પન્ન થયા હતા, અને તે ઉપરાંત દરેક પાંદડામાં અસંખ્ય ઝીણા ચીરાઓ હતા. સ્યુડોબોર્નિઆના થડની સાથે આ પાંદડાંઓનાં જીવશેષોને કેવો સંબંધ છે એ વાત પ્રસિદ્ધ થઈ તે પહેલાં તેઓ હંસરાજનાં જનનપર્ણો તરિકે ઓળખાતાં હતાં. તેમની જનનેંદ્રિયોનો આકાર લાંબા દીલા શંકુઓના જેવો છે, અને તેમના સંબંધે હજી આપણને સંપૂર્ણ માહિતી મળી નથી. એ વનસ્પતિ ઘણે ભાગે નક્કી ખેતની ઉપજત હતી, અને તેનાં અત્યંત ચીરાયેલાં પાંદડાંઓ હંસરાજનાં જેવાંજ હોવાથી તે ઉપજત વિદ્વાનોનું ધ્યાન ખેંચે છે. પુરાણ-ખેતને પણ ધ્યાનમાં લઈએ, તો આપણને એમ સમજાય છે, કે અશ્વપુરુષીની વંશજોને ઉંચો જાતના સંયુક્ત પાંદડાંઓ હતા. લવિષ્યમાં એ પાંદડાંઓની અવનતિ થઈ, અને પ્રથમ તેઓ ખેતના જેવાં સાદાં સાંકડાં પાંદડાં બન્યાં, અને પછી તેમણે ઈકિવીસિટાટિસનાં અને હાલની અશ્વપુરુષીનાં મ્યાનના જેવાં પાંદડાંઓનું સ્વરૂપ લીધું.

એ રીતે, ગ્રેટબ્રિટનની ભીની જમીનમાં અને ખેતરોમાં ઉગતી અશ્વપુરુષીઓ એક વિશાળ અને બહુજ પ્રાચીન વનસ્પતિકોમની છેલ્લી વંશજો છે; પ્રાચીન જીવયુગમાં એ

વિશાળ કોમ ઉચ્ચતમ વિકાસ પામી હતી, અને તે સમયની ઉદ્ભવિત્ત્વ સૃષ્ટિના અગ્રેસર કુટુંબોમાં તે મુખ્ય હતી. પાંદડાંની કિલ્લટ રચના વિગેરે કેટલાંક લક્ષણોમા તેના પ્રાચીન સભ્યો ખડુજ ઉંચું સ્થાન ભોગવતા હતા, તોપણ, આ ખાખ-ખતમાં લવિખ્યમાં તેઓ ધીમે ધીમે સાદા બનતા ગયા અને એ વાત તેમની સામાન્ય પ્રગતિના દ્રશ્યને અનુકૂળ હતી. એમ સંભવે છે, કે પ્રાચીનજીવયુગના ઉત્તરાર્ધમાં, એટલે અંગારયુગના અંતમાં જેત ઉદ્ભવિત્ત્વે તેમના વિકાસની પરાકાષ્ઠાએ પહોંચી હતી. અંગારયુગના ઉપલા ખડકોમાંથી મળી આવેલી ઉપજતો ખરેખર ઉંચી જાતની રચનાવાળી હતી; તેમની જનનેંદ્રિયો અને તેમના કાષ્ઠની રચના ખડુજ વંધારે વિકસેલી હતી. લવિખ્યમાં, એ સમય પછી તેમની અવનતિ શરૂ થઈ, અને મધ્યજીવયુગ, અને તૃતીયયુગના ખડકોમાંથી પ્રાપ્ત થતાં એ કુટુંબનાં જીવશેષોને આપણે સારી રીતે અનુસરી શકીએ છીએ. એ કુટુંબના અત્યાર મુધીના ઇતિહાસથી આપણે ખરાબર વાકેફ છીએ. આ જીવશેષો હમેશાં અપૂર્ણ હોય છે, પણ સ્ત્રીતાહાર કુટુંબના કરતાં અશ્વપુચ્છીના કુટુંબની ઉત્ક્રાંતિ કે અવનતિને અતૂટકપણે અનુસરવું વધારે મહેલું છે. તેના વંશના કેટલાક વેલાઓનો તો નક્કી નાશ થયેલો હોવો જોઈએ; દાખલા તરીકે, વિજ્ઞતીય અલિંગિયોવાળી જેત વનસ્પતિઓ કોઈ વંશને પાછળ મૂક્યા નથી; તોપણ, પ્રાચીનજીવયુગની કેટલીક રાક્ષસી જેત વનસ્પતિઓ હાલની અશ્વપુચ્છીની પૂર્વજો છે એમ માનવા માટે આપણી પામે ઘણાં સબળ કારણો છે.

ઇકવીસિટેલ્સના વર્ગની ઉત્પત્તિ સંબંધે વિશેષ માહિતી આપનારાં બીજાં જીવશેષો હજી આપણને મળી આવ્યાં નથી, પણ તેમનાં ઘણાં લક્ષણો વ્યક્ત કરનારી, અને તોપણ તેમનાથી બીજા બાળતોમાં ભિન્ન એવી કેટલીક બીજા પ્રાચીન ઉદ્ભવિજ્ઞો છે; તેમનો એકકે વંશજ આજે હયાત નથી, અને તેઓ સર્વે જીવશેષનીજ સ્થિતિમાં છે. આ જૂની વનસ્પતિઓના અવલોકનથી, ઇકવીસિટેલ્સની ઉત્ક્રાંતિ ઉપર જરા વધારે પ્રકાશ પડશે. એ સ્ફીનોફિલ્સ નામનું જૂનું કુટુંબ બહુ વિશાળ ન હતું, પણ લુપ્ત વનસ્પતિઓની શરીર-વ્યવસ્થાની માહિતી મેળવવા માટે તે બહુજ અગત્યનું છે. આ કુટુંબ સ્ફીનોફાઇલમ નામની વનસ્પતિજાતનું સભ્ય છે. એ જાત પ્રથમ મત્સ્યસ્તરયુગના ઉપલા ખડકોમાં આપણી નજરે આવે છે, અને આખા અંગારયુગમાં અને વૃદ્ધોરગસ્તર યુગમાં પણ તેની વંશજો પુષ્કળ ઉછરતી હતી. મધ્યજીવયુગના આરંભમાં એ જાતનો લોપ થાય છે. તોપણ હાલની સજીવ વનસ્પતિસૃષ્ટિમાં સિલોટેસી નામનું અંત-રિક્ષજાત વર્ગનું કુટુંબ આ જીવશેષભૂત ઉદ્ભવિજ્ઞોની સાથે કેટલોક સંબંધ ધરાવતું માત્રુમ પડે છે. સિલોટેસીના કુટુંબને પ્રથમ સીતાહારનું સભ્ય ગણવામાં આવ્યું હતું.

સ્ફીનોફાઇલમ ઉપજાતની સભ્યો પાતળી અને મુંઢર વનસ્પતિઓ હતી. તેમનો દેખાવ જેત ઉદ્ભવિજ્ઞોથી તદ્દન ભિન્ન હતો. તેના અત્યંત ઝાડા થડનો વ્યાસ ફક્ત ૧ સેન્ટિ-મિટર હતો. એ ગાંઠાળા અને રેસાદાર થડની ઉપર સામાન્ય રીતે

છ છ પાંદડાંઓના ગુચ્છાઓ લાંબે લાંબે અંતરે ઉગતા હતા; એ પાંદડાંઓ અવાર નવાર ન ઉગતાં એક બીજાની ઉપર સીધી લીટીમાં જ ઉત્પન્ન થયેલાં હતાં. આ બાબતમાં સ્ફિનોફાઇલમ પુરાણ—એતને સમાન, અને ભવિષ્યની બેત અને અશ્વપુરછીથી અસામાન હતી.

તેમનાં પાંદડાંઓ ફાયરના આકારનાં હતાં (સ્ફિનોફાઇલમ = ફાયરના આકારનું પાંદડું), અને તેમનો પાતળો છેદ થડને ચોટેલો હતો. ફંટાયેલા અથવાળા કેટલાક વાહિની—રેસાઓ એ પાંદડાંઓમાં પથરાયેલા હતા. કેટલીકવાર, એ પાંદડાંઓમાં ઉંડી ઉંડી ખાંચો હતી, અને ઘણીવાર તે ખાંચો ઠેઠ ખાયા મુધી પહોંચવાથી ૬ ફાયરોને બદલે તદ્દન સાંકડી અનેક પાંદડીઓ ઉત્પન્ન થતી હતી, અને આ દરેક પાંદડી સ્વતંત્ર પાંદડાનો દેખાવ આપતી હતી. એક જ વનસ્પતિની ઉપર આવાં બન્ને જાતનાં પાંદડાંઓ હતાં. બેતની પેઠે, તે થડની ગાંઠો ઉપર જ પાંદડાં ઉગતાં હતાં, અને તેનાં મૂળી-આંતુ' સ્થાન અને રચના પણ બેતનું અનુકરણ કરતાં હતાં.

કેટલીક ઉપજતોમાં, જનનેદ્રિય બહુ જ સ્પષ્ટ શંકુઓ ઉત્પન્ન કરતી હતી, અને બીજી ઉપજતોમાં ફલીભૂત પાંદડાં અને સામાન્ય પાંદડાંઓની વચ્ચે કાંઈ જ ભેદ ન હતો.

તેનાં થડ લાંબાં અને પાતળાં હોવાથી એવું અનુમાન થાય છે, કે બેડેસ્ટ્રોઝ ઉદ્ભિન્નજેની પેઠે વાડની ઉપર કે પાસે ઉગેલી બીજી વધારે મજબૂત વનસ્પતિઓની ઉપર ઉચે ચઢી તેઓ પોતાની પુષ્ટિ મેળવતી હશે.

આ વનરૂપતિસમૂહ બહુ જ મનોહર છે; તે વનરૂપતિ-
ઓનું સૌંદર્ય તેમનાં બીબાઓમાં અને તેમની શરીરચળા
તેમનાં અશ્મીભૂત હૃવશેષોમાં બહુ જ મુરશિત રહેલી છે.
તેમના થડમાં માત્ર એક જ વાહિની-રેસો પથરાયેલો હતો.
તેમનું કાષ્ઠ સહેજ ત્રિકોણાકાર હતું, અને તેમાં ગર તદ્દન
ગેરહાજર હતો. ઘણી સીતાહાર વનરૂપતિઓની પેઠે તે કાષ્ઠ
બહારથી અંદરની તરફ વૃદ્ધિગત થતું હતું. આ વાત બાળક
થડને લાગુ પડે છે; ભવિષ્યમાં પરિવર્ધિની પેશિ નવું કાષ્ઠ
અને વલકક ઉત્પન્ન કરે છે, અને જૂની મધ્યત્વચાને બદલે
કોઈક જાડી છાલ પણ ઉત્પન્ન થાય છે. એ જ પ્રમાણે
મૂળીઆં પણ વધી જાડાં થાય છે. વિવિધ વાહિની-રેસાઓ-
વાળાં કાચરના આકારનાં પાંદડાંઓ કાંઈક અંશે હંસરાજની
પાંદડીઓનો દેખાવ આપે છે; ત્યારે તેમની પાતળી ચીરીઓ
બની જાય છે ત્યારે તેમની રચના વધારે સાદી બને છે, અને
દરેક પાંદડીમાં માત્ર એક જ રેસો હાજર હોય છે.

તેની જનનેન્દ્રિય બહુ જ વિશિષ્ટ હતી. તેના અત્યંત
સ્પષ્ટ શંકુઓ બેતના શંકુઓને ઘણે અંશે સમાન હતા.
તેનાં અલિંગકોપાગારોને ઉત્પન્ન કરનારાં અવયવો, ઘણી વાર
એ કુટુંબનાં ફલીભૂત ભીંગડાંઓના જેવાં જ હતાં; તેપણુ,
તેમનામાં બહુ જ વિવિધતા હતી. સ્કૉટલેન્ડમાં અંગાર-
યુગના નીચલા ખડકોમાંથી ચીરોસ્ટ્રોબ્રા નામના રિફ્રેનો-
ફિલના એક કુટુંબનો બહુ જ કિલ્લટ રચનાવાળો શંકુ પ્રાપ્ત
થયો છે, તેમાં દરેક અલિંગકોપધારી અવયવને ચાર

અલિંગકોષો હતાં, અને તેઓ આબેહુબ ખેતના જેવાં જ હતાં, પણ તેમની ગોઠવણી ભિન્ન હતી. એ શંકુનો વ્યાસ ૪ સેન્ટિમીટર હતો અને તેની લંબાઈ ૧૦ સેન્ટિમીટરથી પણ વધારે હતી. તેની ઉપર ઉગેલા દરેક ગુચ્છમાં ૧૦ કે ૧૨ સંયુક્ત બીજકણદલ બીચોબીચ ઉગેલાં હતાં, અને એવા અનેક ગુચ્છઓથી તે ચીકાર હતો. દરેક બીજકણદલના ૬ ભાગ હતા: ત્રણ ઉપર અને ત્રણ નીચે, પણ તેઓ બધા ખાયાઓ આગળથી સંધાયેલા હતા. ખેતનાં ઉપપર્ણોની પેઠે નીચલા ત્રણ ભાગો સ્તરીભૂત હતા, અને ઢાલના જેવાં ફલીભૂત ભીંગડાંઓની પેઠે ઉપલા ત્રણ ભાગો અલિંગકોષધારી ઇંદ્રિયો હતી. અત્રે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની વાત એ છે, કે ઉપપર્ણો અને અલિંગકોષધારી ઇંદ્રિયો બન્ને એક જ સંયુક્ત બીજકણદલના ભાગો છે.

સ્ફીનોફાઇલિમની બીજી ઉપજાતોમાં ચિરોસ્ટ્રોબસના જેવી જ વ્યવસ્થા છે, પણ તેમની સૂક્ષ્મ બાબતોમાં સહેજ મહેજ ભેદ હોય છે. સ્ફીનોફાઇલિમ રોમેરિના શંકુમાં દરેક ફલીભૂત ભીંગડાને માત્ર બે જ અલિંગકોષાગારો હતાં; સ્ફીનો. ફર્ટાઇલિમાં પણ એ જ વ્યવસ્થા હતી, પણ તેની બાબતમાં સ્તરીભૂત ઉપપર્ણો હાજર ન હતાં, અને બીજકણદલના ઉપલા અને નીચલા ભાગો બન્ને અલિંગકોષધારી ઇંદ્રિયો હતી. સ્ફીનો. ડાઉસોનીમાં સ્તરીભૂત ઉપપર્ણો છે, પણ તેના શંકુમાં દરેક અલિંગકોષધારી ઇંદ્રિયને માત્ર એક જ અલિંગકોષાગાર ઉત્પન્ન થતું હતું (સ્પોરેન્જિઓ ફેર=સ્પોરેન્જિઅમધારી અવયવ, અલિંગકોષધારી ઇંદ્રિય), અને

દરેક ઉપપદ્યુના ઉપલા પૃષ્ઠની ઉપર બે અલિંગકોષધારી ઇંદ્રિયો ઉગેલી હતી.

આ બધી ઉપજતોમાં, બીજકણુદલના બે ભાગો હતા: ઉપલો અને નીચલો; અને તેના વળી ઉપવિભાગો થતા હતા. સામાન્ય રીતે, ઉપલા ભાગમાં અલિંગકોષધારી ઇંદ્રિયો, અને નીચલા ભાગમાં સ્તરીભૂત ઉપપદ્યો હતાં. સ્કિનો. ફર્ટાઈલિમાં બન્ને ભાગો ફલીભૂત હતા અને તેઓ બન્નેમાં અલિંગકોષધારી ઇંદ્રિયો ઉત્પન્ન થતી હતી.

સ્કિનોફિલ્સનું કુટુંબ બેતનું સંબંધી હતું એ વાતમાં કોઈ જ શંકા નથી. ગાંઠાગાંઠાવાળાં થડ, અને ગુચ્છ-બંધ પાંદડાંઓ વિગેરે બાળતોમાં તે સામ્ય હતુંજ, પણ એ ઉપરાંત એ બન્ને વનસ્પતિસમૂહોના સભ્યોમાં અલિંગ-કોષાગારો અને તેમને ધારણ કરનારી ઇંદ્રિયોની રચના આબે-હુષ સમાન હતી. એ વાત લક્ષમાં રાખવાની છે, કે સ્કિનો-ફિલ્સના કુટુંબમાં બધાં અલિંગકોષો એક જ જાતનાં હતાં, પણ કેટલીકવાર તેમના કદમાં અત્યંત વિવિધતા હતી, અને નિરૂપયોગી અલિંગકોષો પણ ત્યાં હાજર હતાં. એ ઉપરથી એવું અનુમાન થાય છે, કે તેમાં બે જાતનાં અલિંગકોષો ઉત્પન્ન કરવાનું વલણ શરૂ થયું હતું.

કદની બાળત સિવાય સ્કિનોફિલ્સ અને બેતની વચ્ચે બીજા બે મહત્વના ભેદ છે. એક ભેદ તેમના થડની રચનાને લગતો, અને બીજો ભેદ એ અલિંગકોષધારી ઇંદ્રિયોના સ્થાનને લગતો છે.

સ્ફિનોફિદસમાં આઘ કાષ્ઠ નક્કર અને બહારથી અંદરની બાબુએ વધતું હતું; બેતમાં ગર ન હતો, અને આખું કાષ્ઠ અંદરથી બહારની બાબુ તરફ વધતું હતું. અંગારયુગના નીચલા ખડકોમાંથી મળી આવેલી આઘ-બેત આ બન્નેને પૂલની પેઠે સાંધે છે, કારણકે તેની બાબતમાં કેટલુંક કાષ્ઠ બહારથી અંદરની તરફ વધી ગરના સ્થાનની ઉપર કાંઈક અંશે તરાપ મારતું હતું.

સ્ફિનોફિદસમાં અલિંગકોષધારી ઇંદ્રિયો હમેશાં ખીજ-કણુદલનો ભાગ હતી; અને ઉપપર્ણો એજ ખીજકણુદલના સ્તરીભૂત ભાગો હતાં. ઘણી બેત વનસ્પતિઓમાં અલિંગકોષધારી ઇંદ્રિયો ઉપપર્ણોથી તદ્દન સ્વતંત્ર હતી; તેમની બાબતમાં આપણે એમ સુખેથી કહી શકીશું, કે દરેક અલિંગકોષધારી ઇંદ્રિય (ઢાલના જેવું લીંગડું) એક આખું ખીજકણુદલ હતી.

તોપણ, બેતમાં કેટલીકવાર વાહિની-રેસાઓની ગોડવણી કાંઈક વિશિષ્ટ હોવાથી એવું અનુમાન ધાય છે, કે તેની જે ઉપબતોમાં ઉપપર્ણો હાજર હતાં તેમનામાં અલિંગકોષધારી ઇંદ્રિયો પ્રથમ તેમની સાથે, એટલે, તેમની નીચે જ આવેલા ઝુમખાનાં ઉપપર્ણોની સાથે સંબંધમાં હતી. તેથી તેમની બાબતમાં પ્રથમ સ્ફિનોફિદસના જેવી જ વ્યવસ્થા હતી. ખીજ બાબુએ, દરેક બાબતમાં આ અનુમાન સંભવતું નથી. હંસરાજ ઉદ્ભવિજ્ઞાનેની બાબતમાં આપણે જોઈ ગયા, કે નૃપી હંસરાજ વિગેરે ઉપબતોમાં

ધર્મવિભાગ ઉત્પન્ન થયેલો છે, અને પાદડાનો માત્ર અમુક ભાગ જ અલિંગકોષાગારો ઉત્પન્ન કરે છે, અને શાહામૃગી હંસરાજ (સ્તુધિઓ પેરિસ જર્મનિકા) વિગેરે બીજા ડેટલીક હંસરાજમા એ કામ આખુ પાદડુ કરે છે એટલે તેમની બાળતમા આખા પાદડાનુ કપાત્ત થયેલુ છે ઇક્ટવી સિટેડસ અને તેમના મિત્રોની વચ્ચે પણ એવો જ ભેદ હશે, તેમની બાળતમા પણ અલિંગકોષધારી ઇદ્રિય ડેટલીકવાર આખુ પાદડુ અને ડેટલીકવાર પદાડાનો એક ભાગ હતી

સ્કિનોસિદ્ધસના પાદડાઓ ઘણી અશ્વપુરુષીઓના એજ અવયવોથી વધારે વિકસિત હતા, અને તેઓ હંસરાજના જનનપણેનો ભાસ ઉત્પન્ન કરતા હતા સ્કિનોસિદ્ધસ અને બેત બન્નેની માથે મળધ ધગવતી સ્યુડો બોર્નિઆ નામની ઉપજાતના પાદડાઓ તો એથી પણ વધારે વિકસિત હતા કેટલાક શાસ્ત્રીઓની એવી માન્યતા છે, કે એ બન્ને સમૂહો આદ્ય હંસરાજ વનસ્પતિઓના વશજે છે, અને અશ્વપુરુષીઓની અનુગમાગ અને જનને દ્રિયો એ માન્યતાને પુષ્ટિ આપે છે પણ, જો તેમની વચ્ચે એવો વાન્તવિક મળધ હોય તો તે બહુજ પ્રાચીન હોવો જોઈએ, અને લેંથી એ વાત મળધે હાલમા તો આપણે માત્ર તર્ક પિતર્ક કરવાના છે ઉપર વર્ણવેલો મળધો પુગવો માત્ર એટલુ જ સાબીત કરે છે, કે સ્કિનોસિદ્ધસ અને ઇક્ટવીસિટેડસ બન્ને એકજ પૂર્વજમાધા ઉત્પન્ન થયેલી શાખાઓ છે, અને એ પૂર્વજ વનસ્પતિઓને મોગ અને મારી રીતે વિડંબલા પાદડાઓ હતા .

આ પૂર્વજ વનસ્પતિઓનો ઇતિહાસ હજુ મુઘી અપ્રસિદ્ધ છે. જ્યારે મત્સ્યસ્તરયુગના ખડકોનું જાહેર સારી રીતે સંશોધન થશે, ત્યારે તેમના વિષે આપણને કાંઈક માહિતી મળશે. જે સ્યુડોબોર્નિઆની અંતર્ઘટનાનું આપણને જરાબર જ્ઞાન થાય તો આપણા પ્રસ્તુત પ્રશ્નનો ખુલાસો વધારે સરળ થાય, કારણ કે તે ઘણે ભાગે સિફ્નોફિદસ અને જેત ઉદ્દલિન્જનેને પરસ્પર જોડનાર સંબંધી હોવાનું જણાય છે. તોપણ, મત્સ્યસ્તરયુગના ઉપલા ખડકોમાં સિફ્નોફાઈલિમ કુટુંબની ઉપજતો નક્કી હાજર હતી એવું સાબીત થયેલું છે, એટલે તેમના પ્રાચીન પૂર્વજની શોધ માટે આપણે એ યુગથી પણ વધારે જૂના યુગના ખડકોનું સંશોધન કરવું ખાસ જરૂરનું છે.

આ પ્રશ્ન જાહેર મહત્વનો છે, કારણ કે સિફ્નોફિદસનાં પાંદડાંઓ હંસરાજ વનસ્પતિઓને મળતાં આવે છે, અને એ ઉદ્દલિન્જનેની અંતર્ઘટના સીતાહાર વૃક્ષોની કાંઈક વધારે સાદી રચનાને સમાન છે. એમ સંભવે છે, કે આ સ્થળે આપણે જે જાહેર પ્રાચીન કોમ સંબંધે ચર્ચા કરીએ છીએ, તેમાં વિવિધ વાહિની-મય ઉદ્દલિન્જનેનાં લક્ષણો કેટલેક અંશે એકઠાં હાજર હતાં, અથવા, તેઓ હજુ જૂદાં પડ્યાં ન હતાં. જે એ વાત સત્ય હોય, તો સિફ્નોફિદસ, મધ્યસ્તરયુગના પૂર્વાર્ધમાં, વિકાસની ઉચ્ચતમ પરાકાષ્ઠાએ પહોંચેલા, આદ્ય (પણ રચનામાં સાદી નહિં એવી) અલિંગકોષધારી ઉદ્દલિન્જનેના એક મોટા સમૂહની છેલ્લી વંશજો હતા.

મત્સ્યસ્તરયુગની ઉદ્ભિન્નજ્ઞસૃષ્ટિએ ક્યારનોયે વધારે ઉંચી કેટિનો વિકાસ પ્રાપ્ત કર્યો હતો. તે સમયે, વધારે ઉંચી કેટિના નીચલાં ગુપ્ત કુટુંબો પૃથ્વી ઉપર સારી રીતે ઉછરતાં હતાં:

હૃદાકૃતિ,	સખીજહંસા,
હંસરાજ,	સીતાહાર,
અશ્વપુચ્છી,	સ્કિનોફિલ્સ,

સખીજહંસા અને હંસરાજની વચ્ચે સંબંધ બતાવનારો એટલો બધો સખળ પુરાવો છે, કે તે બન્ને વર્ગો નક્કી એક જ પ્રાચીન પૂર્વજમાંથી ઉતરી આવેલા હશે એમ લાગે છે. હૃદાકૃતિ અને સખીજહંસાની વચ્ચે પણ એટલી બધી સમાનતા છે, કે તેઓ પણ એક જ પૂર્વજની વંશજો હોવાનું જણાય છે; પણ હૃદાકૃતિ ઉદ્ભિન્નજ્ઞેનો હંસરાજની સાથેનો સંબંધ વધારે દૂરનો હતો. ખીજધારે ઉદ્ભિન્નજ્ઞેના ઇતિહાસનું આવું વૃત્તાંત છે.

અશ્વપુચ્છી અને સ્કિનોફિલ્સનાં લક્ષણો સ્પષ્ટ સાબીત કરે છે, કે તેઓ એક જ પ્રાચીન પૂર્વજમાંથી ઉત્પન્ન થઈ છે.

એથી વિશેષ અનુમાન કરવું સહીસલામત નથી. હવે આપણે વાહિનીમય વનસ્પતિઓની ત્રણ મહાન કોમો સંબંધે વિચાર કરવાનો છે: હંસરાજ, સીતાહાર અને અશ્વપુચ્છી અને સ્કિનોફિલ્સનું મંયુક્ત કુટુંબ.

આપણે પાછળ જોઈ ગયા, કે સીનાહારનો જીવનઈતિહાસ અને તેનો વંશવેક્ષો ઠેઠ સુધી તદ્દન એકલવાયો છે, તેમના ઘરની રચના સિંદ્ધનોદ્ધિસ્નાં ઘરની રચનાને સહેજ મળતી આવે છે, પણ એ સામ્ય એટલું બધું મહત્વનું નથી કે જેથી તેમને બન્નેને આપણે સંબંધીઓ ગણી શકીએ.

પાછલા પ્રકરણમાં આપણે જોઈ ગયા, કે સિંદ્ધનોદ્ધિસ્ એક અત્યંત પ્રાચીન વનસ્પતિકુટુંબનું છેલ્લું વંશજ છે, અને અશ્વપુરછી તેમ જ વધારે ઉંચી કોટિની પ્રચલ્નબીજની બીજી કોમો પણ તેજ અત્યંત પ્રાચીન કુટુંબની વંશજો છે. આ બધા વનસ્પતિવર્ગોની વચ્ચે એટલું બધું સામ્ય છે, કે તેઓ બધા પ્રથમ એકજ પ્રાચીન પૂર્વજમાંથી ઉત્પન્ન થયા એમ માનવા આપણે તૈયાર છીએ. તોપણ, આ કેવળ કલ્પના છે. જ્યારે આપણે મત્સ્યસ્તરયુગમાં પ્રવેશ કરીએ છીએ ત્યારે આપણી વિચાર અને અવલોકન કરવાની શક્તિઓ કુંઠિત બની જાય છે, કારણ કે તેથી વધારે પ્રાચીન કાળની ઉત્ક્રાંતિ (એટલે, ઉદ્ભવિજ્જસ્ટિના આ આખા ઇતિહાસનો મોટો ભાગ) એ સ્થળે ગુપ્ત બને છે. તોપણ, હકીકતને અભાવે વિદ્વાન્ શાસ્ત્રીઓ હમેશાં કલ્પનાનો તુરત સ્વીકાર કરે છે, અને વધારે ઉંચીકોટિની પ્રચલ્નબીજઓની ઉત્પત્તિનાં સંબંધે તેમણે ઘણો ઉઠાપોહ કર્યો છે. આજ સ્થળે હવે આપણે કલ્પનાના પ્રદેશમાં દાખલ થઈએ છીએ. આપણે ૪ થા પ્રકરણમાં જોઈ ગયા, કે બીજધારી વનસ્પતિઓની ઉત્પત્તિને લગતો ઘણો મારો પુરાવો આપણને પ્રચલ્નબીજઓમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે.

વધારે ઉંચી કોટિની અલિંગકોષધારી ઉદ્ભવિનિર્મળની ઉત્ક્રાંતિને લગતો પ્રશ્ન મુખ્યત્વે તેમના જીવનક્રમમાં હિમેશાં ચતી પેઢિઓની અવાર નવાર પરંપરાને લગતો છે, કારણ કે તેમના વિકાસમાં એ દૃશ્ય બહુજ આશ્ચર્યકારક છે. લીલ અને શદ્કશૈલના (લિવર્વટર્સ) વર્ગોમાં લિંગી અને અલિંગી પેઢિઓની એવીજ અવાર નવાર પરંપરા હોય છે, પણ આ બાબતમાં એ બે પેઢિઓના ધર્મો પરસ્પરથી તદ્દન ભિન્ન છે. હંસરાજ અને તેના મિત્રોમાં અલિંગી પેઢિ બધું પુષ્ટિનું કાર્ય કરે છે, અને આપણે તેને જ સામાન્ય રીતે ‘વનસ્પતિ’ કહીએ છીએ; અનુસમાંગ નામની તેની લિંગી પેઢિ ઓછી મહત્વની છે, અને તે માત્ર લિંગકોષોને ઉત્પન્ન કરે છે. બીજી બાજુએ, લીલ વિગેરે ઉદ્ભવિનિર્મળમાં, જેને આપણે ‘વનસ્પતિ’ કહીએ છીએ તે પેઢિ પુષ્ટિનું કામ કરે છે, અને તેજ લિંગી પેઢિ છે; અને તેની અલિંગી પેઢિ તેનું ‘ફળ’ છે, અને તે ફેવળ અલિંગકોષો ઉત્પન્ન કરે છે. એ રીતે, લીલ-વનસ્પતિ હંસરાજની અનુસમાંગને મળતી આવે છે, અને લીલનું ફળ હંસરાજ વનસ્પતિનું કામ કરે છે.

લીલ અને શદ્કશૈલ વનસ્પતિઓ સ્ફુચિની વર્ગની (પ્રાયોફાઇટમ) છે, અને તેઓ હંસરાજ અને તેની મિત્રોથી વધારે સાદી છે. દાખલા તરિકે, લીલને પણ કેટલીક લીલને વાહિની-પેશિઓ તંત્રનું કામ કરે છે. મુખ્યત્વે, શદ્કશૈલ વનસ્પતિઓ છે. અને તેમને હંસરાજ

અરખાવી શકાય છે. જ્યારે, અંગંધ બતાવનારા બે વનસ્પતિ-સમૂહો પૈકી એક બીજાથી નકકી વધારે માદો હોય છે, ત્યારે આમાન્ય રીતે આપણે એવું જ અનુમાન કરવાને લલચાઈએ છીએ, કે વધારે માદો વનસ્પતિસમૂહ વધારે કિલ્બ વનસ્પતિ સમૂહનો પૂર્વજ છે. ઘણા ઉદ્ભિજ્જવેતાઓ આવા અનુમાન કરતા હશે: હંસરાજ વર્ગની પૂર્વજે સ્ફાયિની ઉદ્ભિજ્જને હોવી જોઈએ, અથવા બલ્કે તેમનો જીવનક્રમ સ્ફાયિની ઉદ્ભિજ્જનેને અવશ્ય મમાન છે. આ કલ્પના કબૂલ થાય તો તેનો એવો અર્થ થયો કે હંસરાજ વનસ્પતિથી લીલનું ફળ વધારે પ્રાચીન અલિંગી પેઢિ છે, અને સ્ફાયિની ઉદ્ભિજ્જના એ ફળનો વિકાસ થઈ પ્રચ્છન્નબીજની વાહિનીમય અને ઉંચી શરીર-વ્યવસ્થાવાળી વનસ્પતિ કેવી રીતે ઉત્પન્ન થઈ તે બતાવવાને માટે શાસ્ત્રીઓએ ઉત્તમ પ્રયાસો કર્યા છે. આ કલ્પનાએ વિજ્ઞાનમાં બહુ જ અગત્યનો ભાગ લજવ્યો છે, અને તેને આધારે અનેક અત્યંત કીંમતી સંશોધનના પ્રયાસો થયા છે. તોપણ, ઉત્ક્રાંતિના યથાર્થ ક્રમની ઉપર કાંઈ જ પ્રકાશ પડ્યો હોય એમ લાગતું નથી.

જીવશેષ રૂપી ઉલ્લેખ આ કલ્પનાને કાંઈ જ ટેકો આપતો નથી, જૂનામાં જૂની વાહિનીમય પ્રચ્છન્નબીજમાં સ્ફાયિની વર્ગના ફળ કે અલિંગકોષાગારના જેવી કોઈ પણ વસ્તુ ન હતી (સ્ફાયિની ઉદ્ભિજ્જનેમાં અંડકોષમાંથી અલિંગકોષયુક્ત જે ફળ ઉત્પન્ન થાય છે તેને માટે પારિભાષિક શબ્દ ‘અલિંગકોષાગાર’ છે) આ અલિંગકોષાગારથી

ઉત્પત્તિના સંબંધમાં બહુ જ દૂર, મોટાં પાંદડાંઓવાળી હંસરાજ વનસ્પતિઓ એ પ્રાચીન જીવયુગમાંની ઉદ્દલિન્ગજ્ઞ-સૃષ્ટિમાં હાલના કરતાં ખરેખર વધારે પ્રમાણમાં ઉગતી હતી. નાનાં પાંદડાંઓવાળી સીતાહાર વનસ્પતિઓ પણ એ સમયે હાજર હતી; તેમનો મોટો ભાગ વૃક્ષો હતાં, અને તેમની શરીર-રચના તેમના હાલના વંશજોના જેટલી જ ઉંચી કોટિની હતી.

વધારેમાં, રક્ષાયિની ઉદ્દલિન્ગજ્ઞે વધારે પ્રાચીન હોવાનો પણ પુરાવો નથી. પ્રાચીનજીવયુગનાં માત્ર એક કે બે શંકા-શીલ જીવશેષો છે, અને તેઓ ઘણે ભાગે લીલ કે શલ્કશૈલનાં અવશેષો હશે એમ લાગે છે; પણ આપણે પાછળ જોઈ ગયા, કે જૂનામાં જૂના ભૂ-નિવાસી જીવશેષોમાં વાહિનીમય પ્રચ્છન્નખીન્નનાં પુષ્કળ અવશેષો હાજર છે.

નિયેધક પુરાવો કદાપિ સંપૂર્ણ કહેવાય જ નહિ; અને એ વાત તદ્દન સ્પષ્ટ છે, કે રક્ષાયિની ઉદ્દલિન્ગજ્ઞેની આદ્યતા અને પ્રાચીનતા કેવળ કલ્પનાત્મક છે, અને તેને પ્રાચીન ઉદ્દલિન્ગજ્ઞસૃષ્ટિનાં જીવશેષો કાંઈજ પુષ્ટિ આપતાં નથી.

સજીવ કે જીવશેષભૂત ઉદ્દલિન્ગજ્ઞેમાં એકઠે એવી વનસ્પતિ નથી, કે જેની શરીર-રચના વાહિનીપ્રચ્છન્નખીન્ન અને રક્ષાયિનીનું કૃણ ઉભયની સાથે સંબંધ બતાવી મધ્યસ્થ દશા અનુભવતી હોય. એ બે વસ્તુઓની રચના અને વિકાસની ઉત્તમ, સરખામણી કરવામાં આવી છે, અને તોપણ તેઓ

પરસ્પર લિન્ન હોવાનું સાબીત થયું છે; પ્રથમનીજ પેઢે એ વનસ્પતિતે વનસ્પતિ, અને એ ફળ તે ફળજ રહ્યાં છે.

ત્યારે, જો એક અલિંગકોષાગારમાંથી, એટલે ફળમાંથી વધારે ઉંચી જાતની પ્રચન્નબીજઓની અલિંગી વનસ્પતિ ઉત્પન્ન થઈ એ કંડપનાને પુરાવાની કાંઈપણ પુષ્ટિ ન હોય, તો બીજી કઈ કંડપનાનો સ્વીકાર કરવો? આ વાત સ્પષ્ટ છે: પૌષ્ટિક વનસ્પતિ હંમેશાં પૌષ્ટિક વનસ્પતિ જ રહેલી છે—થડ અને પાંદડાંવાળી હંસરાજ એવી દરિઆઈ વનસ્પતિને મળતી આવે છે, કે જેમાં થડ અને પાંદડું એવો કાર્ય—વિભાગ હજી ઉત્પન્ન થયો નથી; આવી આખી દરિઆઈ વનસ્પતિને સ્થાણુ (થેલસ) કહે છે. આ મત પ્રમાણે, હંસરાજનો હાલનો જીવન—ક્રમ, મુખ્યત્વે, લિંગી અવયવોવાળી વ્યક્તિ અને અલિંગકોષધારી વ્યક્તિ એ બેની નિયમિત અવારનવાર પરંપરાનો બનેલો છે; શરૂઆતમાં આ બન્ને વ્યક્તિઓ સમાન હશે, અને તેઓ પૈકી એક વ્યક્તિ બિવિધ્યમાં વધારે વિકાસ-શીલ બની હશે એમ લાગે છે. દરિઆઈ વનસ્પતિઓમાં, આ વિચારને પુષ્ટિ આપનારાં ઘણાં દષ્ટાંતો છે. ઝેટ્ઝિટનના કિનારા ઉપર કિકિટઓટા નામની એક ભૂખરી શેવાલ પુષ્કળ ઉગે છે. તેનું અગ્ર ક્ષેત્ર જે કાંટાઓ ઉત્પન્ન થયેલા હોય છે, અને એ સ્થાણુના શરીરનો આકાર એક પટ્ટીના જેવો છે. આ વનસ્પતિની બાબતમાં લિંગી અવયવો અને અલિંગકોષો હંમેશાં જુદી જુદી વ્યક્તિઓની ઉપર ઉગે છે. લિંગી અને અલિંગી વ્યક્તિઓ નિયમિતપણે અવારનવાર ઉત્પન્ન થાય

છે ફલીભૂત થયેયુ અડ-ડોપ વૃદ્ધિ ગત થઈ અલિ ગકોપધારી વનસ્પતિ ઉત્પન્ન કરે છે, અને ત્યારે આ બીજી વ્યક્તિના અલિ ગકોપોનુ અકુચીભવન થાય છે ત્યારે પુન લિંગી વનસ્પતિનો જન્મ થાય છે, એમ નિયમિતપણે થયાજ નાય છે આ અવારનવાર વ્યવસ્થા હુ સરાજના જેટલીજ નિયમિત છે, પણ લિંગી અને અલિંગી વ્યક્તિઓ બરાબર પરસ્પર સમાન છે બરેબર તેમનુ સામ્ય એવુ જ હોયુ જ બેઠંએ, કાચુ કે તેઓ બન્ને સમુદ્રમા એકજ નાતની પરિસ્થિતિમા પોતાનુ જીવન ગાળે છે

હુ સગજની બાબતમા એ પરિસ્થિતિ ડેવળ લિન્ન છે હુ સરાજમા ફલનની સિદ્ધિને માટે પાણીની ખાસ જરૂર છે, અને તેથી તેની અનુસમાગને અર્ધ-જળચરનુ જીવન ગાળવાનુ છે અલિંગી પેઢિના અલિ ગકોપો હુવામા વિખેરાઈ ગયા, એટલે તેનુ કાર્ય પૂર્ણ થતુ હોવાથી તે ડેવળ ભૂ-વામ્ની જીવન ગાળે છે, અને પાણીમા ગહેવાની તેને કાઠ જરૂર. નથી ભૂ-નિવામ્ની વનસ્પતિની પેઠે, વાહિની-તત્ર યાત્રિક બળ આપનારી પેશિને અને એવી બીજી યોગ્ય રચનાઓને ઉત્પન્ન કરી તેણે પોતાની શરીર-ચ્યનાને ઉચી ટોટિની બનાવી છે

ત્યારે એ અલિંગ પેઢિ ઉત્કાંત થઈ ત્યાર આ અનુસમાગ ઘણે ભાગે અવનતિ પામી, કારણ કે ભૂ-નિવામ્ની વનસ્પતિને પોતાની આ કલાને વધારે બગવાન અને યોગ્ય બનાવવાની હતી, અને તેથી તેણે જલવામ્ની અનુસમાગની બાબતમા ઠગઠસઠ કરી

ત્યારે આ માન્યતાને આધારે લિંગી અનુસમાંગ અને અલિંગી વનસ્પતિ બન્ને સ્થાણુમાંથીજ ઉત્પન્ન થઈ, અને તેઓ બન્ને એક સમયે પરસ્પર સંપૂર્ણ રીતે સમાન હશે. એક કલાની ઉત્ક્રાંતિ થઈ તે વધારે ક્લિષ્ટ રચનાવાળી બની, અને બીજી કલાની અવનતિ થઈ તે વધારે સાદી બની.

સ્થાણુની શાખાઓમાં ધર્મવિભાગ ઉત્પન્ન થવાથી થડ અને પાંદડાંઓ ઉત્પન્ન થયાં એ માન્યતા મુખ્યસિદ્ધ છે. સ્થાણુ અને સપર્ણ થડ એ બન્નેની વચલાં રૂપાંતરશીલ સ્વરૂપો શલ્કશૈલ વર્ગમાં ઘણાં છે, અને વધારે ઉંચી કોટિની કેટલીક દરિયાઈ વનસ્પતિઓમાં પણ તેમનાં પુષ્કળ દ્રષ્ટાંતો છે. એ વાત સત્ય છે, કે આ વાતો કેવળ સમાનતા બતાવનારી છે, પણ તેઓ અલિંગકોષ-વાદના કરતાં સ્થાણુ-વાદને વધારે સારી પુષ્ટિ આપે છે. સ્થાણુ અને સપર્ણ થડની વચ્ચે મધ્યસ્થ દશા બતાવનારી ઘણી કલાઓ છે, પણ અલિંગકોષાગાર અને સપર્ણ થડની વચ્ચેની વચલી દશા બતાવનાર એકકે સ્વરૂપ હજી હાથ આવ્યું નથી.

સ્થાણુનો વાદ જીવશેષ રૂપી લેખની સાથે કેટલો બધો બંધ બેસતો આવે છે ? એ લેખ સ્થાણુવાદને અનુસરે છે, પણ તેને તે સંપૂર્ણ ટેકો આપતો નથી. કેટલીક પ્રાચીન હંસરાજમાં, થડ અને પાંદડાંની રચનામાં કેટલુંક સામ્ય છે; તેમની અંતર્ઘટનાના સાધનથી પણ પ્રસ્તુત જીવશેષ થડનું છે કે પાંદડાનું છે એ કહેવું મુશ્કેલ છે. તોપણ, આવી આકસ્મિક સમાનતા એ વનસ્પતિઓ અત્યંત પ્રાચીન હતી, અને તેમનાં

અવયવોમાં હજી સંપૂર્ણ ધર્મ વિભાગ ઉત્પન્ન થયો ન હતો એમ સાબીત કરવા પૂરતી નથી. થડ અને પાંદડું જન્મેની અવનતિ થયાથી, કે ફલીભૂત જનનપર્ણોમાં કાંઈક ખાસ રૂપાંતર થવાથી થડ અને પાંદડાંની વચ્ચે એ સામ્ય ઉત્પન્ન થયું હશે.

પ્રાચીન જીવયુગની આદ્ય હંસરાજમાં અને સ્યુડોબો-
ર્નિઆમાં કેટલાંક પાંદડાંઓના અથો ચીપીઆની પેઠે ફંટાયેલાં
હતાં, અને તે ઉપરથી તેઓ સ્થાણુ હશે એમ અનુમાન થાય
છે; સામાન્ય રીતે, અત્યંત જૂના સમયમાં મોટાં સંયુક્ત જન-
નપર્ણો મોટી સંખ્યામાં હાજર હતાં એ વાત સ્થાણુ-વાદને
પુષ્ટિ આપે છે, કારણ કે બહુજ વિભાજન થયેલી સ્થાણુની
કેટલીક શાખાઓ ભવિષ્યમાં સંયુક્ત પાંદડાંઓ બની હોય તો
તે કેવળ સ્વાભાવિક છે; હાલની શલ્કગ્રૈલમાં આબેહુળ એવું જ
દૃશ્ય હાજર છે, પણ એ દૃશ્ય અલગત તેની અલિંગી પેઢિમાં
નહીં પણ લિંગી પેઢિમાં આપણી નજરે આવે છે. જીવશેષ
રૂપી લેખ આ જન્મે વાદ પૈકી એકકેને સંપૂર્ણ રીતે સખળ
ટેકો આપતો નથી, તોપણ સ્થાણુમાંથી સપર્ણ થડ ઉત્પન્ન
થયું એ વાતને એ લેખ વધારે પુષ્ટિ આપે છે; પણ લીલના
ફળમાંથી કે કોઈપણ જાતના અલિંગકોષાગારમાંથી અમુક
વનસ્પતિ ઉત્પન્ન થયેલી હોવાનું એકકે દૃષ્ટાંત પ્રાચીનજીવયુ-
ગની ઉદ્ભિન્નજ્ઞસૃષ્ટિમાંથી હજી આપણને પ્રાપ્ત થયું નથી.

સ્કાયિની ઉદ્ભિન્નજ્ઞેમાંથી કે તેના જેવી જ બીજી કોઈ
વનસ્પતિઓમાંથી વધારે ઉંચી કોટિની પ્રચન્નબીજઓની
ઉત્ક્રાંતિ થઈ એમ સાબીત કરનાર એક જીવશેષ કે બીજું

કાંઈ સાધન આજે હાજર નથી એમ કહેવું વધારે સહીસલામત અને વ્યાજબી છે. વધારે સંભવિત વાન એ છે, કે તેઓ શેવાલની જાતની કોઈ વનસ્પતિઓની પ્રત્યક્ષ વંશજો છે. આ પણ કેવળ કલ્પના છે, અને તેનો પાયો તદ્દન દોહળો છે, પણ, પાછલાં પ્રકરણોમાં, વનસ્પતિઓના વિવિધ વર્ગોની ઉત્ક્રાંતિના સંબંધે આપણે જે સિદ્ધાંતો ઉપર આવ્યા હતા, તેઓ પૂરવાર થયા કે ન થયા, તોપણ તેમની આધારભૂમિ યથાર્થ ઐતિહાસિક પુરાવો હતો.

લીલ અને શલ્કશૈલની ઉત્ક્રાંતિના પ્રશ્નનો આપણા પ્રસ્તુત વિષયમાં મમાવેશ થતો નથી. એ સંબંધે માહિતી મેળવવા હાલમાં આપણી પામે કાંઈજ સાધન નથી. રક્ષાચિની વનસ્પતિઓ વધારે ઉંચી કોટિની-ઉદ્ભવિજ્ઞોની ઉત્ક્રાંતિને મમજવામાં આપણને કાંઈજ મદદ કરતી નથી. તેમનું પોતાનુંજ સ્વરૂપ ખૂબ અગમ્ય છે. હવે એ વાત સ્પષ્ટ છે, કે શલ્કશૈલનાં વધારે માઠાં સ્વરૂપો વધારે, કિલ્લટ રચનાવાળી ઉદ્ભવિજ્ઞોનાં અવનત થયેલાં વંશજો છે, અને એમ સંભવે છે, કે રક્ષાચિની વનસ્પતિનો-આખો વર્ગ કોઈ વધારે ઉંચો વિકાસ પામેલા વનસ્પતિ-સમૂહનું અવનત થયેલું સ્વરૂપ છે; એ મહાન પૂર્વજ વર્ગ વાહિનીમય પ્રચન્ન બીજોની સાથે કાંઈ સંબંધ ધરાવતો હતો, અને એ સિવાય તે વર્ગના વિષે આપણને બીજી કાંઈ વધારે માહિતી નથી. ઘણી લીલના અને થોડી શલ્કશૈલના ફળની ઉપર, વધારે ઉંચી કોટિની વનસ્પતિઓની પેઠે, નમુનારૂપ

તુંડકો હાજર હતાં, અને તેથી તેઓ વધારે વિકાસ પામેલા કોઈ વનસ્પતિ-સમૂહમાંથી ઉત્પન્ન થયેલી હશે એમ લાગે છે. તોપણ, ભૂસ્તરવિદ્યામાંથી એ સંબંધે કાંઈ પુરાવો આપણને મળી આવતો ન હોવાથી, રક્ષાચિની વનસ્પતિઓની ઉત્પત્તિનો પ્રશ્ન લગલગ હમેશાં નિરૂત્તર રહેશે.

ઉત્કાંતિની ખાસ રેખાઓનો વિચાર હવે આપણે બાબુ ઉપર મૂકીએ, અને આપણી પાસે રજુ થયેલી હકીકતમાંથી, એક બે મુદ્દાની વાતો ખેંચી કાઢી તેમનું સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ આપણે ધ્યાનમાં લઈએ.

આપણી તપાસનું પ્રથમ અને ખડું અગત્યનું પરિણામ ઉંચી કોટિની વનસ્પતિઓની અત્યંત પ્રાચીનતા સાબીત કરવાનું છે. મત્સ્યસ્તરયુગની જે વનસ્પતિઓનું સાદું જતન થયેલું છે, તેમની રચના કોઈ ઉદ્દભિજ્ઞવેત્તા નિષ્પક્ષપાતપણે તપાસે તો ઘણેલાગે તેને એમ નહિં લાગે કે હાલની વનસ્પતિઓથી તેઓ વધારે આદી રચના વાળી હતી. એ અત્યંત જૂની વનસ્પતિઓ તેને ઘણી બાબતોમાં લિન્ન લાગશે, પણ તેમની સામાન્ય શરીર-વ્યવસ્થા તો તેને લગલગ હાલની ઉદ્દભિજ્ઞોના જેવી જ લાગશે. મત્સ્યસ્તરયુગથી તે આજ મુધી વનસ્પતિઓના ‘શરીરની સામાન્ય વ્યવસ્થા’માં ઘણા ફેરફાર થયેલા છે; તોપણ, એ સમયમાં તે ‘ખડું ઉત્કાંત’ થયેલી જણાતી નથી. લેખક એમ કહેવા નથી ઇચ્છતો કે તેમાં કાંઈજ વિકાસ થયો નથી; કારણ કે સુપુષ્પ વનસ્પતિઓ જીવડાંઓના જીવનને યોગ્ય બની

અને જીવનની વધારે કિલ્લિત બનતી પરિસ્થિતિને પણ તેઓ
ખીજી ઘણી રીતે અનુકૂલ ઘડે. તોપણ, એટલું ખાસ ધ્યાનમાં
રાખવાનું છે, કે બહુ જ પ્રાચીનજીવયુગની વનસ્પતિઓમાં
એવાં ખાસ અનુવિધાનો થયેલાં હોય એમ જણાતું નથી.

વનસ્પતિઓના એ ભૂસ્તરવિધાના ઇતિહાસમાં બહુજ
આશ્ચર્યકારક વાત એ છે, કે તેના લાંબા લાંબા યુગોમાં આખી
પૃથ્વી ઉપર ઉદ્ભલિન્નસૃષ્ટિનું સ્વરૂપ એકરૂપ હતું. અધ્યાપક
સીવર્ડ કહે છે, કે “યોર્કશાયરની વિવૃતખીજસ્તરયુગની
વનસ્પતિઓને પૃથ્વીના અન્ય ભાગોની વનસ્પતિઓની સાથે
સરખાવતાં એમ જણાય છે, કે એ જુદા જુદા ભાગોમાં અને
એટલિટનમાં એકજ જાતની વનસ્પતિઓ એ યુગના ખડકોમાં
દેખાઈ ગયેલી છે: બોર્નહોમ, પોલેન્ડ, તુર્કેસ્તાન, સાઈબિરીયા,
કોરિયા, જાપાન, ક્રાન્સ, નૉર્વેજીલેન્ડ, સ્પીટઝબર્ગન, ગ્રીનલેન્ડ,
અમેરિકા, હિંદુસ્તાન અને ઑસ્ટ્રેલિયા આ સર્વે સ્થળોએ
એકજ જાતની વનસ્પતિઓ એ યુગમાં વસતી હતી.

વધારે પ્રાચીન યુગની વનસ્પતિઓના સંબંધે પણ
એમજ બન્યું છે, તોપણ આ યુગના અંતમાં ઉદ્ભલિન્ન-
સૃષ્ટિમાં વધારે વિવિધતા હતી; બરફ, ઉત્તર અને દક્ષિણ
ગોળાર્ધમાં તે લિન્ન લિન્ન ઉદ્ભલિન્નને ઉગતી હતી.

એ યુગોમાં આખી પૃથ્વી ઉપર એકજ જાતની વનસ્પ-
તિઓ ઉગતી હતી; તેથી એમ જણાય છે, કે તે સમયે આખી
પૃથ્વી ઉપર લગભગ એકજ જાતની આબોહવા હતી. તોપણ,
આ દૃશ્યનું વાસ્તવિક કારણ એ છે, કે એ યુગની વનસ્પતિઓ-

માંજ પોતાની પરિસ્થિતિને યોગ્ય બનવાની તીવ્ર શક્તિ હતી. હાલમાં પણ કેટલીક એવી વનસ્પતિઓ છે, કે જેઓ ગમે તેવી આબોહવામાં ચારી રીતે ઉછરી શકે છે, અને તેથી તેઓ આખી પૃથ્વી ઉપર પ્રસરેલી છે. વિવિધ હંમરાજો એ વાનતું સરસ દષ્ટાંત છે; સામાન્ય સુખાલખ હંમરાજ બન્ને ગોળાર્ધમાં બધા ગરમ અને બધા સમશીતોષ્ણ મુલકોમાં સારી રીતે ઉછરે છે. પિરાની-હંમરાજ (પ્લેડર-ફર્ન, સીસ્ટોપ્ટેરિસ ફ્રેન્જિલિમ) પણ ઉત્તરધ્રુવના પ્રદેશોથી તે ન્યુઝીલેંડ અને

આ દૃષ્ટિએ વિચાર કરતાં જણાય છે, કે સજીવ વસ્તુઓ બહુ જ લાંબા સમય સુધી સ્થિર રૂપે રહેતી હતી; એટલે, સમયમાં પૃથ્વીની પરિસ્થિતિ અવિકારી રહી, અને પ્રાણીઓ અને વનસ્પતિઓ તેને એટલી બધી યોગ્ય બનેલી હતી, કે તેમના શરીરમાં નવા મોટા વિકાસે ઉત્પન્ન થવાની જરૂર ન હતી. આવી પરિસ્થિતિમાં નૈઋત્તિક સંવરણતું દૃશ્ય, કોઈ નવી ઉત્પન્ન થતી સજીવ વસ્તુની તરફ પક્ષપાત કર્યા સિવાય, તે સમયનાં અનુવિધાનના ધોરણને કેવળ સાચવી રાખતું હતું. હાલની પૃથ્વીમાં આવી સ્થિરતાનો યુગ આવે છે. હિમયુગ કે પૂર્વહિમ યુગથી યુરોપની વનસ્પતિઓના સ્વરૂપમાં કાંઈજ મહત્વનો વિકાર થયો નથી. વનસ્પતિઓની ઉપજતો એક સ્થળ છોડી બીજા સ્થળે જઈ વસેલી છે, પણ તેમના પોતાના સ્વરૂપમાં કાંઈજ ફેરફાર થયેલો જણાતો નથી.

ભૂસ્તરવિદ્યાના લેખ ઉપરથી જણાય છે, કે સજીવ વસ્તુના ભૂતકાલીન ઇતિહાસમાં સ્થિરતાના અને ત્વરિત રૂપાંતરના સમયો અવાર નવાર પસાર થયેલા છે. એ રીતે, મધ્યજીવયુગના આખા મધ્યકાળમાં, એટલે, ત્રિગુણિત યુગના ઉત્તરાર્ધથી તે ખટિકા યુગના આરંભ સુધી પૃથ્વી ઉપરની ઉદ્ભિન્નસૃષ્ટિમાં કાંઈજ મહત્વનો ફેરફાર થયો ન હતો; ત્યાર પછી આવૃતબીજા વનસ્પતિઓ ઉત્પન્ન થઈ, અને તરતજ ઉદ્ભિન્નસૃષ્ટિમાં સંપૂર્ણ રૂપાંતર થયું. અંગારયુગના ઉત્તરાર્ધમાં વૃદ્ધોરગયુગના પાછલા ભાગના કરતાં ઓછાં રૂપાંતરે થયાં હતાં.

એ વાત સ્પષ્ટ છે, કે ત્યાં કોઈ ઉપજાત લાંબા સમય સુધી ને લગભગ સ્થિર રૂપે રહી ત્યાં તે એ યુગની પરિસ્થિતિને સંપૂર્ણ રીતે યોગ્ય બનેલી હોવી જોઈએ: નહિતો, નવા ઉત્પન્ન થયેલા બેદોદ્ભેદો એટલે રૂપાંતરે હરિકાઈમાં જીતે, અને તે ઉપજાતનું રૂપાંતર થઈ જાય. તેથી આપણે એવું અનુમાન કરી શકીશું. કે એવા બધા યુગોમાં તે સમયની પરિસ્થિતિમાં જીવવા માટે તે કાળની વનસ્પતિઓ સંપૂર્ણ રીતે યોગ્ય હતી. જો લવિપ્યના યુગની વનસ્પતિઓ તેમની પૂર્વજોથી આપણને વધારે સંપૂર્ણ જણાય તો તેનું કારણ એ છે, કે જે પરિસ્થિતિને તેઓ યોગ્ય બનેલી છે, તે પરિસ્થિતિ વધારે ગુચવાડે ભરેલી અને આપણને વધારે પરિચિત છે. અત્યંત ભૂતકાળની વનસ્પતિઓ પણ તેમની પરિસ્થિતિને યોગ્ય બનેલી જ હતી, પણ એ પરિસ્થિતિ હાલની પરિસ્થિતિથી ભિન્ન હતી. કેટલાક સંયોગો હમેશાં અવિકારી રહેલા છે, અને તેમની ભાષામાં પ્રાચીનજીવયુગની અને હાલની ઉદ્ભવિજ્ઞો એકજ જાતની શરીર-રચના પ્રગટ કરે છે.

જીવનયુગની બીજી ઘણી વનસ્પતિઓના થડની બહારની મધ્ય-
ત્વચામાં રેસાઓના સમૂહો છે, અને તેઓ જોડાઈ જઈ જાળના
જેવી રચના ઉત્પન્ન કરે છે. એ જાળનાં બાકાંઓમાં વધારે
નરમ કોષીય પેશિ ભરેલી હોય છે. નળાકાર થડની બહારની
બાબુએ, એ રીતે બહુજ ઉત્તમ ટેકો મૂકેલો હોય છે, અને
શિષ્યશાસ્ત્રીઓને જો એવું જ બળવાન કૃત્રિમ થડ બનાવવું
હોય તો તેમને પણ એજ જગાએ ટેકો મૂકવો પડે. જ્યાંમુધી
થડની અંદર કાષ્ઠ અને વડકની જોડાઈ બહુ વધી નહિં ત્યા-
મુધી એ યોજના સારી રીતે નબી. તોપણ, કેટલીક સિંગિલે-
રિઆ અને શલ્કવૃક્ષો પુષ્કળ જોડાં થવાથી તેમની બહારની
છાલ વિગેરે ફાટી ગયું; તેથી આ બાબતમાં જેમ જેમ વૃક્ષ
ઘેરાવામાં વધતું ગયું, તેમ તેમ તેની નવી મધ્યત્વચામાંથી
હમેશાં બળ આપનારી પેશિઓ ઉત્પન્ન થતી ગઈ. એ રીતે,
તેમના જીવનક્રમની બધી દશાઓમાં થડની બહારની બાબુએ
જ્યાં વધારે યાંત્રિક બળની જરૂર હતી ત્યાં તેની પેશિઓ
ઉત્પન્ન થતી હતી.

પ્રાચીન વનસ્પતિઓમાં યાંત્રિક બળ આપનારી પેશિઓ
કેવી રીતે ગોઠવાઈ હતી તે બાબતનું જ્ઞાન ખરેખર બહુ જ
અગત્યનું છે, કારણકે ગુરૂત્વાકર્ષણને લીધે વનસ્પતિના શરીર
ઉપર થતું દબાણ બધા યુગોમાં એક જ સરખું અને એક જ
જાતનું હોય છે; તેથી હાલની સજીવ અને પ્રાચીન વનસ્પતિ-
ઓ એ દબાણની સામે ટકકર ઝીલવા માટે કેવી રીતે યોગ્ય
થયેલી છે તે જાણી, એ બંનેનાં અનુવિધાનોને આપણે
સરખાવી શકીએ.

જે જે પ્રાચીન વનસ્પતિઓનું સાડું અવલોકન થયું છે, તેમનાં અવયવો હાલની વનસ્પતિઓનાં એજ અવયવોની પેઠે બહુ જ ઉત્તમ કામ કરી શકતાં હતાં. સિન્જિલેરિઆ અને લેપિડોડેન્ડ્રોન બન્નેનાં પાંદડાંઓને તેમનાં નીચલાં પૃષ્ઠોમાં બે ઉડી ખાંચો હતી. એ ખાંચોમાં આવેલાં તુંડકો મુરક્ષિત હતાં; વધારેમાં, તેમની ઉપર વાળની રૂવાંટી ઉગેલી હોવાથી તેઓ લગભગ ઢંકાઈ ગયેલી હતી. હાલની કેટલીક સજીવ વનસ્પતિઓને પાણીની તાંગીમાં ઉછરવાનું હોય છે, અને તેથી તેમનાં પાંદડાંઓમાં પણ કાંઈક એવીજ યોજનાઓ હાજર હોય છે. તેમને લીધે, વનસ્પતિએ મૂળીઆં વાટે ચૂસેલું પાણી તુંડકો કે છિદ્રોમાંથી હદ કરતાં વધારે હવામાં ઉડી જતું નથી. ખારી અને ભીની જમીનમાં ઉગતી ઉદ્ભિન્નત્વેને પણ પાણીની એવી કરકસર કરવી પડે છે, કારણ કે વધારે ખાડું પાણી ચૂસવાથી તેમને નુકશાન થાય છે. પ્રાચીન જીવયુગની સીતાહાર વનસ્પતિઓની ગાળતમાં ઘણે ભાગે એજ ખુલાસો વધારે બ્યાજળી છે.

થડને ઘેરાવામાં વધારે બહુ કરવાની રીત, એટલે, પરિવર્ધિની પેશિનાં કેપોનું વારંવાર વિભાજન થઈ કાષ્ઠ અને વલ્કલને હમેશાં ઉત્પન્ન કરવાની શક્તિ, વનસ્પતિઓનું એક ઉત્તમ અનુવિધાન છે, અને તેથી વનસ્પતિઓ વધી વૃક્ષો બને છે. થડમાં નવું કાષ્ઠ અંદરની બાજુએ, અને વલ્કલ બહારની બાજુએ ઉમેરાય છે. આપણી માન્યતા સાધારણ રીતે એવી છે, કે બીજધારી, શંકુધારી અને દ્વિદળ વિગેરે

ઉંચી ડોટિની ઉદ્ભિન્નને એ રીતે નવું કાષ્ઠ ઉત્પન્ન કરી શકે છે. આપણે પાછળ જોઈ ગયા, કે પ્રાચીનજીવયુગમાં બધી જાતની વાહિનીમય પ્રચન્નબીજઓ નવું કાષ્ઠ ઉત્પન્ન કરતી હતી. નવું કાષ્ઠ ઉત્પન્ન કરવું એ કાંઈ હાલનો નવો વિકાસ નથી, પણ ત્યારે ત્યારે વનસ્પતિઓને તેની જરૂરીઆત જણાઈ છે, ત્યારે ત્યારે ઠેક પ્રાચીન યુગોધીજ તેમણે એ શક્તિ પ્રાપ્ત કરેલી છે.

પ્રાચીનજીવયુગની વનસ્પતિઓમાં, કેટલીકવાર, નવું કાષ્ઠ ઉત્પન્ન કરનારી પેશિઓ કાંઈક જુદીજ યોજનાઓથી પોતાનું કામ કરતી હતી. હાલની કેટલીક શંકુધારી વનસ્પતિઓમાં, ગર અને વડકકને સાંધનારી ગરની પટ્ટીઓમાં પાણીનું વહન કરનારી વાહિનીઓ હાજર છે, અને તેમને લીધે, કાષ્ઠનાં બહારનાં અને અંદરનાં પડની વચ્ચે પાણીનો સંબંધ થાય છે. શસ્કવૃક્ષના કાષ્ઠમાં પણ એવી જ યોજના છે; આ બન્ને યોજનાઓની ઉત્પત્તિ તદ્દન સ્વતંત્ર રીતે થયેલી હોવી જોઈએ.

બહુજ જૂના સમયના બીજની રચના ઉંચી જાતની હતી, અને કેટલીકવાર તે હાલનાં બીજથી પણ વધારે કિલ્બટ હતી. પરાગ-ગૃહ અને વાહિની-રેસાઓની બહુજ સંપૂર્ણ વ્યવસ્થા તેમનાં ખાસ લક્ષણો છે. એ ચંત્રથી પુખ્યાંડ ઘણા પરાગ મેળવી શકતું હતું, કારણ કે તેમનાં જીવશેષોનાં પરાગ-ગૃહમાં ૧૦૦ કે તેથી પણ વધારે પરાગકણ પડી રહેલાં આપણી નજરે આવે છે. એટલે બધો

પરાગ પવનથી ઉડી આવ્યો હશે, કે તેને જીવડાંઓ લઈ આવ્યાં હશે એ વાત હજી સ્પષ્ટ થઈ નથી. પ્રાચીન-જીવજનનાં જીવનની કિલ્લિ રચના તેમની ફલન કરવાની પદ્ધતિને આભારી હતી, અને તે ક્રિયા શુક્રકોષોના સાધનથી સિદ્ધ થતી હતી. તે સમયની ઉદ્દલિન્ગજ્ઞસૃષ્ટિમાં ફલન એજ પદ્ધતિએ થતું હતું, અને હાલમાં પણ તૃણુદ્રુમીઓ અને કુમારિકાકેશી વૃક્ષો એજ રીતે ફલનનું દસ્ય સિદ્ધ કરે છે. પરાગકણમાંથી બહાર નીકળી આવેલાં ચંચળ શુક્રકોષોને તરવા માટે જગાની જરૂર હતી. તે સ્થળે પાણી પણ હાજર નોંધ્યે, કારણ કે પાણી સિવાય તેઓ કઈ વસ્તુમાં તરે? જીવનો વાહિની-તંત્ર શુક્રકોષોને પાણી પૂરું પાડતો હશે. અવિધ્યમાં પરાગ-નલિકાની ઉત્ક્રાંતિ થવાથી જીવની, અથવા પુષ્પાંડની, રચના સાદી થઈ. પણ એ સંયોગોમાં તો પ્રાચીન જીવજનનું જીવ બહુજ ઉત્તમ અને સંપૂર્ણ ચંત્ર હતું.

જીવશેષભૂત વનસ્પતિઓના અનુવિધાનનો પ્રશ્ન બહુજ વિશાળ હોવાથી તેનું વધારે વિવેચન કરવું અશક્ય છે. એ વનસ્પતિઓના અભ્યાસથી ઉત્ક્રાંતિના વાદ ઉપર સારો પ્રકાશ પડ્યો છે; હવે આપણને સ્પષ્ટ સમજાયું છે, કે દરેક યુગની ઉદ્દલિન્ગજ્ઞસૃષ્ટિ તે તે સમયની પરિસ્થિતિને સંપૂર્ણ રીતે ચોક્કસ બનેલી હતી.

આ નાના પુસ્તકમાં, કેવળ વધારે ઉંચી કોટિની ઉદ્દલિન્ગજ્ઞેની ઉત્ક્રાંતિ વિષે વિવેચન કરવાનું કારણ એ છે, કે તેમની આબતમાં જીવશેષરૂપી લેખમાંથી આપણને પૂરતો ઐતિહાસિક

પુરાણો મળી આવ્યો છે ન્દાયિની, શૈવલાદિ અને કુગ વિગેરે બાકીની વનસ્પતિઓની ઉત્ક્રાંતિને સમજવામા જીવશેષો આપણને બહુ જ યોડી મદદ આપે છે આ ઉદ્ભવનિયમની બાબતમા, ઉત્ક્રાંતિવેત્તાને કેવળ હાલના સજીવ નવરૂપોની સગખામણી ઉપર આધાર રાખવાનો છે, તોપણ, કેટલીક વધારે મગવડવાળી ઉપજાતોની ઉત્ક્રાંતિને શાસ્ત્રીઓ અનુમર્યા છે, અને તે કામ તેમને બહુ જ કઠણ લાગ્યું છે તેમની શોધના પરિણામ હજી પણ શકાશીલ છે

અવતરણવાદનો આખો પ્રશ્ન બહુ જ ગભીર અને ગહન છે, અને અત્યાજ સુધી એ દિશામા જે પ્રયાસો થયેલા છે, તેઓ મર્વે કેવળ મશોધનનો આરભ છે આપણને મળી આવેલા બધા જીવશેષો સાબીત કરે છે, કે ઉત્ક્રાંતિનો ક્રમ કેવળ નિયમિત પ્રગતિનો નથી, એન્ડે, નિયમિત વિકાસ થઈ સાદી વસ્તુમાથી કિલ્લટ વસ્તુ ઉત્પન્ન થઈ નથી વસ્તુતઃ, ઘણી વનસ્પતિઓની બાબતમા, એથી ઉલટું જ બન્યું છે હાલની અસ્વપુરુષીઓ, અને ખીતાહાર પ્રાચીનયુગની તેમની પૂર્વજોથી બહુ જ વધારે સાદી છે, હાલની જીવત તૃણદ્રુમીઓ તેમની મધ્યજીવયુગની મળ-ધીઓથી ઓછી વિકસિત અને વધારે માદી છે વસ્તુતઃ એમ બન્યું છે, કે જૂદા જૂદા યુગોમા જૂદા જૂદા વનસ્પતિમૂહો અગ્રસ્થાન ભોગવતા હતા, અને એ દરેક સુખ્ય મમૂહ તે સમયે વિકાસની પરાકાષ્ઠાએ પહોંચેલો હતો ભવિષ્યમા સયોગો બદલાયા અને એ વનસ્પતિવર્ગ જીવન-કલહમા પાછો

પડયો. એ બદલાયેલી પરિસ્થિતિને યોગ્ય બનેલું કોઈક નવું જ વનસ્પતિ-કુટુંબ હરિક્ષાઈમાં વિજયવંત થયું, અને નવા યુગની ઉદ્દલિન્નજ્ઞસૃષ્ટિમાં તે ઉચ્ચ સ્થાને બેઠું.

પ્રાચીનજીવયુગમાં રાક્ષસી સ્ત્રીતાહાર, અને અસ્વપુચ્છી-એ પ્રચન્નખીજઓની મુખ્ય કોમો હતી; પણ મધ્યજીવ-યુગની શરૂઆતમાં તેઓ ક્યારનીયે પાછળ પડી ગઈ હતી. આખી પૃથ્વી ઉપર મહાન સખીજ-હંસાનું સ્થાન હવે તૃણ-દ્રુમીવનાઓએ લઈ લીધું, અને એજ સમયે યથાર્થ હંસરાજ વનસ્પતિઓ પહેલાંના કરતાં વધારે આગળ પડી. હૃદાકૃતિ ઉદ્દલિન્નજ્ઞે હરિક્ષાઈમાં હારી જવાથી તેમની જગા શંકુધારી અને કુમારિકાકેશી વૃક્ષોના કુટુંબને હાથ આવી. ખટિકાયુગમાં તૃણદ્રુમીવનાઓ પણ તરત સ્થાનભ્રષ્ટ થઈ અને આવૃતખીજ વનસ્પતિઓએ તેમનું શ્રેષ્ઠ સ્થાન લીધું. ઘણે ભાગે, આ નવું કુટુંબ તૃણદ્રુમીવનાઓનું જ વંશજ હતું. આ મહાન્ રૂપાંતરનું વર્ણન એકજ શબ્દમાં થઈ શકે; પણ એ પરિવર્તન કેવી રીતે ઉદ્દભવ્યું, અને સપુષ્પ વનસ્પતિઓમાં આટલી બધી વિવિધતા કેવી રીતે ઉત્પન્ન થઈ તેનો હજી સુધી આપણને કાંઈ જ ખ્યાલ નથી. આવૃતખીજઓ ઘણેભાગે તૃણદ્રુમીઓમાંથી ઉત્પન્ન થઈ; એ સિવાય તેમની ઉત્ક્રાંતિ વિષે હજી સુધી, અલબત્ત, આપણને ખીજ કાંઈજ અગત્યની માહિતી નથી. કેટલાક સખળ પુરાવાને આધારે, આપણે દ્વિદળ વનસ્પતિઓને એકદળ ઉદ્દલિન્નજ્ઞેથી વધારે પ્રાચીન ગણીએ છીએ. પૃથ્વીના ખડકોમાં સપુષ્પ વનસ્પતિઓમાં

અસંખ્ય જીવશેષો મુરક્ષિત હોવાથી, ભવિષ્યમાં તેમનું મંશો-
ધન આ બાબતમાં વધારે સારો પ્રકાશ પાડશે એમ આશા
રહે છે.

વધારે ઉંચી કેાટિની વનસ્પતિઓની ઉત્ક્રાંતિનો વિષય
બહુ જ વિચિત્ર હાલતમાં છે. વનસ્પતિઓના મુખ્ય મુખ્ય
સમૂહો પરસ્પર કેવો સંબંધ ધરાવે છે, તે હવે આપણે જાણ્યું,
અને તેમના ઇતિહાસ વિષે પણ આપણને કાંઈક માહિતી
મળી છે. તોપણ, દરેક બાબતમાં વધારે ઐતિહાસિક પુરા-
વાની જરૂર હોવાથી તેમની ઉત્ક્રાંતિનો ઇતિહાસ હજી સંપૂર્ણ
થઈ શક્યો નથી.



શબ્દકોષ

- અખરોટ (વૉલનટ)—એક જાતની વનસ્પતિ.
- અગારમ્તરકમ (કાર્બોનિક્સ સીસ્ટમ)—ભૂસ્તરવિદ્યાને લગતા મધ્યજીવયુગનો એક પેટા યુગ
- અજીર (શીગ ટ્રી)—એક વનસ્પતિ.
- અગામ્ય ચૂલોપવ (કાર્બોનિક્સ લાઇમસ્ટોન)—કાચમાવાળો ચૂનાનો પથ્થર.
- અડોપતી પ્રમ્તગે (હલાઇટ ટ્રેટા)—ભૂસ્તરવિદ્યાના એક પેટા યુગના વળા, એમા ઇંડાના આકારના પથ્થરો હોય છે.
- અંતર્ગુફી (એન્ડોસ્પર્મ)—ખીજનો એક ભાગ, બાકી ખીજ અંતર્ગુફી નામની પેશિ ને ખોરાક તરિકે વાપરે છે
- અતપુર (જાઇન્નેશિયમ)—અડાશય, અથવા ઝિકેમરનો નિચલો ભાગ
- અંતરિક્ષજ (એપિફાઇટસ)—વનસ્પતિની ઉપર ઉગી હવામાથી ખોગાક મેળવનારી વનસ્પતિઓ.
- અનુવિધાન (એડાપ્શન)—પરિસ્થિતિને યોગ્ય થવાનું દરમ.
- અનુસમાગ (પ્રોથેયમ)—અલિંગકોષધારી વનસ્પતિઓના જીવન-ઇતિહાસમા ઉત્પન્ન થતી લિંગી સૃષ્ટિ. હસરાજ વિગેરે વનસ્પતિઓમા બે પેઢિઓ થઇ જીવન પૂડે બને છે.
- અનેનામ (પાઇન એપલ)—એક વનસ્પતિ.
- અન્યોન્યફલન (ક્રોમ ફર્ટિલીઝેશન)—એક વનસ્પતિનાં પરાગ ખીજી વનસ્પતિના સ્ત્રીકેમરમા પડી ફલન કરે છે તે દરમ.
- અન્વય (હેરિડિટી)—વશ.

અર્ણવી (સનડચુ)—વનસ્પતિ વિશેષ

અલિંગકોષાગાર (સ્પોગ્નિઆ)—અલિંગકોષ, એટલે વનસ્પતિનું ઉત્પત્તિક કોષ, જે કોષમાથી નવી વનસ્પતિ ઉત્પન્ન થાય છે તે કોષ અને તેના કોષ જે ઇદ્રિયમા ઉત્પન્ન થાય છે તે વનસ્પતિના અવયવને અલિંગકોષાગાર કહે છે

અલિંગકોષધારી વનસ્પતિઓ (સ્પોર-પ્થેન્ટસ)—જે વનસ્પતિઓ અલિંગકોષોને ઉત્પન્ન કરે છે તેવી વનસ્પતિઓ

અલિંગકોષધારી ઇદ્રિયો (સ્પોરોનિઓફાઈટ)—અલિંગકોષને ધારણ કરનારા અવયવો

અશ્વપુન્ડ્રી વનસ્પતિઓ (હોર્સટેલ્સ)—પ્રચ્છન્નખીજા વનસ્પતિઓનો એક અલિંગકોષધારી વર્ગ.

અનૌજમી (એકમ-એ'બ્યુમિનમ)—જે ખીજમા ઓગસ, (એ'બ્યુમન)ના જેવો પૌષ્ટિક પદાર્થ ન હોય એવાં ખીજ.

આવૃતખીજા વનસ્પતિઓ (એન્કિઓસ્પર્મ)—જે વનસ્પતિના ખીજ બધે અડાશયમા ઢકાયેલા રહે છે તેવી ઉદ્દલિગ્નજો.

આકાશવેલ (ડાડર)—એક જાતની વનસ્પતિ

આઘ-એન (પ્રોટો-કેયેમાઇટમ)—એ જાતની અત્યંત પ્રાચીન વનસ્પતિ

આમોપાવર (ફગ)—એક જાતની વનસ્પતિ

ઇખ્મણો (આઇ-આઇટ)—એક જાતની વનસ્પતિ

ઉત્ક્રાંતિવાદ (ઇવો'યુશન)—ઉદ્દલિગ્નજાતિમા, કે પ્રાણિસૃષ્ટિમા એક વ્યક્તિમા વિકાર પરંપરા થઇ નથી વ્યક્તિઓ ઉત્પન્ન થયા જાય છે અને એ નવી વ્યક્તિઓ મૂળ જનક વ્યક્તિથી / શુણ્ધર્મમા લિન્ન હોય છે, એવી માન્યતા જાહેર કરનાર વાદ.

ઉદ્દલિન્નજ્ઞવિદ્યા (ઝાટની)—વનસ્પતિઓના સબધે ચર્ચા કરનાર શાસ્ત્ર.

ઉદ્દલિન્નજ્ઞવિદ્યાલિસ (ઝાટનીઝટ)—વનસ્પતિવિદ્યામા નિપુણ થયેલો માણસ.

ઉરગ (રેખાછદ્મ)—પેટે ચાલનારા પ્રાણીઓનો એક સમૂહ

એકદગ વનસ્પતિ (મેનોકોટિલિડન્મ)—જેમના ખીજને એક દગ હોય છે તેવી વનસ્પતિઓ

એકલિગી (યુની સેકસ્યુઅલ)—એક જાતના લિંગ-કોષોને ઉત્પન્ન કરનારી વનસ્પતિઓ

એલુઇઝી હસરાજ (હાટર્સ ટગ)—એક જાતની હસરાજ વનસ્પતિઓ.

ઔનસી (એલ્યુમિનમ)—જેમના ખીજમા એલ્યુમિનમના જેવો પૌષ્ટિક પદાર્થ ઉત્પન્ન થાય છે તેવા ખીજ.

કોષેગ (ન્યુક્લીઅસ)—કોષનો આત્મા, કોષના શરીર-અંગનું નિયમન કરનારી વસ્તુ.

કાંક (વુડ)—એક જાતની પેશિ, એ પેશિ-એટલે કોષોનો મમૂહ પ્રાણી લઈ જવા લાવવાનું કામ કરે છે.

કોવમી થરો (કોવ મેઝર્મ)—અગારમ્તર યુગનાં વળાંતો ઉપ-વિભાગ.

કોવમાના મધિસ્તરો (કોવ-સીમ્મ)—કોલમાના થરો જે જગાએ જોડાયેલા હોય તે જગા બતાવનારો મધિ

કુપુઓ (હોવીમ)—એક જાતની વનસ્પતિઓ.

કમગ (લીલી)—એક જાતની વનસ્પતિઓ.

કલ્લયથુ (વીયો)—એક જાતની વનસ્પતિઓ.

કોવય (નેટલ)—એક જાતની વનસ્પતિઓ.

કોપકેશ (સીવીઆ)—વાગના જેવી વસ્તુઓ, જેમના માધનથી કોપ હવન ચલન કરે છે.

કંટકી હંસરાજ (એમ્બલ ફર્ન, ડેવેલીઆ એકમુલીએટા)—એક જાતની હંસરાજ વનસ્પતિ.

કુખી (કેબેજ ટ્રી, કોર્ડિલાઇન)—એક જાતની વનસ્પતિ.

કંકરોપલ (મીલસ્ટોન ગ્રીટ)—અંગારયુગનાં વર્ણાનો એક ઉપ-વિભાગ.

કૃપિવિદ્યાભિરા (એગ્રીકલ્ચરિસ્ટ)—ખેતીવાડીની વિદ્યા ભણેલો માણસ.

ખેતરી અશ્વપુચ્છી (શીડ-હોર્સટેલ, ઇકવીસીટમ આર્વેન્સી)—

એક જાતની અશ્વપુચ્છી વનસ્પતિ.

ખટિકાયુગ (ક્રીટીશીઅસ)—ભૂસ્તરવિદ્યાને લગતો એક યુગ.

ગર્ભકોશ (એમ્બ્રિયો-સેક)—પુલ્લિંગ અને સ્ત્રિલિંગ કોષના સંયો-

ગથી ઉત્પન્ન થયેલું કોષ.

ગુલાબ (રોઝીમ)—એક જાતની વનસ્પતિઓ.

ગરની પટ્ટીઓ (મેડ્યુલારિ રેઝ)—ગરની કિરણોના જેવી પટ્ટીઓ.

ઘંઉ-નરમ (સોફ્ટ વ્હીટ)—

ઘંઉ-ઘટ્ટ (હાર્ડ-વ્હીટ)— } ઘંઉ વનસ્પતિની જાતો.

ઘંટીઆળા (બટરકપ)—એક જાતની વનસ્પતિ.

ચૂણોપલસ્તરકમ (લીઆસ)—ભૂસ્તરવિદ્યાનો એક યુગ.

ચૂણુમય ગદ્દાઓ (કેલ્કેરિઅસ કોન્ક્રીશન્સ)—ચૂનાના ભેગવાળા

કોણસાના ગદ્દાઓ.

છડિલો (લીચન્સ)—એક જાતની વનસ્પતિઓ.

જળ-કમળ (વૉટર-લીલી)—એક જાતની વનસ્પતિ.

જળ-કેળ (વૉટર-પ્લેન્ટેન)—એક જાતની વનસ્પતિ.

જન્મામો (લૉરલ્સ)—એક જાતની વનસ્પતિ.

જનનેન્દ્રિય (ફક્ટીરીકેશન)—નવી વ્યક્તિ ઉત્પન્ન કરનારી ઇન્દ્રિય.

જ્વરોષ (ફોસીલ)—પ્રાણી અથવા વનસ્પતિનું મરી ગયેલું શરીર, અથવા, તેનું અવશેષ ચિર્ક, જે ધણે સમય થયાં જમી-

નમાં દટાઇ ગયેલાં હોય છે.

અવવિદ્યા (આયોજી)—પ્રાણી અને વનસ્પતિ બન્નેની ચર્ચા કરનાર શાસ્ત્ર.

જીભક (સિન્ધુલ)—વનસ્પતિના પાંદડાનો, જીભના જેવા આકારનો એક ભાગ.

જનનપર્ણ (ફોન્ડ)—આમલીના પાંદડાના જેવાં પાંદડાંને જનનપર્ણ કહે છે—ધણી પાંદડીઓનું અનેલું પાંદડું.

ત્રિષંડીસ્તરક્રમ (કેમ્બ્રીઅન)—ભૂસ્તરવિદ્યાનો એક યુગ.

તૃતીયયુગ (ટર્શરિ)—ભૂસ્તરવિદ્યાનો એક યુગ.

ત્રિગુણિતસ્તરક્રમ (ટ્રિએસિક)—ભૂસ્તરવિદ્યાનો એક યુગ.

તળદી (ઓલડ મેન્સ બીઅર્ડ, ટિલેન્ડસીઆ યુસ્ની ઓઇડિસ)—એક જાતની વનસ્પતિ.

તરખણ (મેપલ)—એક જાતની વનસ્પતિ.

તાડ (પાગ્સ)—એક જાતનાં વૃક્ષો.

તૃણકુમ્ભી (સાઇકેડઝ)—એક વનસ્પતિ—સમૂહ.

તૃણદ્રુમ (સાઇકેડેસી)—એક વનસ્પતિ સમૂહ.

તવંગી હંસરાજ (શીશી ફર્ન)—એક જાતની હંસરાજ વનસ્પતિ.

તૃણ-વૃક્ષો (ટ્રાસ-ટ્રીઝ, કસેન્થોરિથ્યા)—એક જાતની વનસ્પતિઓ.

તકુંકોષ (ટ્રેકીડઝ)—પાણીનું વહન કરનારાં એક જાતનાં કોષ.

તૃણકુમ્ભીવના (સાઇકેડોફાઇટા)—વનસ્પતિઓનો એક વર્ગ.

થોરડાંડળિયો (સ્પર્જીસ)—એક જાતની વનસ્પતિ.

દુદેલો (આઇવી)—એક જાતની વનસ્પતિ.

દુધેલી (યુફોર્બિઅસ)—એક જાતની વનસ્પતિ.

પ્રાક્ષાલતા (વાઇન્સ)—એક જાતની વનસ્પતિઓ.

દ્વિદળ વનસ્પતિઓ (ડાયકોટિલિડઝ)—જેમનાં બીજને બે દળ હોય છે એવી વનસ્પતિઓ.

દ્વિપાલી પંખડો, અથવા, કુમારિકાકેશીટશ્વ (ગીકેટ પ્રિયોળા, મેડન,

હેરટી)—એક જાતની વનસ્પતિઓ.

દારક (માધકોપાધક)—ખીજમાં પરાગકણને લાખલ થવાનું નાનું દાર.

હદકારી (કોડેષ્ટી)—એક વનસ્પતિ-સમૂહ.

હદકૃતિ (કોડેષ્ટમ)—એક વનસ્પતિ સમૂહ.

નરહંમગજ (મેલર્ન)—એક જાતની હંસરાજ.

નૃપીહંમરાજ (ઑરમંડા, રૉયલર્ન)—એક જાતની હંમરાજ.

નયી ખેત (નીઓ-કેલેમાટિસ)—ખેતની એક ઉપજાત-ખેત નામની વનસ્પતિઓ.

નૈમર્ગિક મંવરણ (નેચરલ સિલેક્શન)—આમપામની પરિસ્થિતિને યોગ્ય હોય એવો વિકાર સજીવ વસ્તુમાં ઉત્પન્ન કરી તેનું સ્વરૂપ ફેરવનારું, અને એ ફેરફારને ઉત્તેજન આપી તેનું મંરણ કરનારું દશ્ય.

પ્રકૃતિવિદ્યાલિપ્ત (નેચરેલિસ્ટ)—કુદરતનાં દશ્યો અને તેમના સ્વરૂપ વિષે જેને માહિતી છે એવો માણસ.

પ્રચ્છન્નખીજ વનસ્પતિઓ (ફીટોગેમ્સ)—જેમનાં ખીજ ગુપ્ત હતાં તેવી વનસ્પતિઓ. અલિંગકોષધારી વનસ્પતિઓ.

પરોપજીવી (પેરેમાઇટ)—અન્ય વનસ્પતિના ઉપર જીવન-નિર્વાહ ચલાવનારી ઉદ્ભિજ્જ.

પરિક્ષલ (પેરિકાર્પ)—અંડાશયની આસપાસ આવેલી દિવાલ.

પતંગીઆં (બટરફ્લાઇઝ)—એક જાતનાં જીવડાં.

પરિપુષ્પ (પેરિએન્થ)—નરકેસરોની આસપાસની પાંદડીઓ.

પદ્મક (પેરિ ટ્રીઝ)—એક જાતનાં ઝાડ.

પરિવર્ધિની પેશિ (ફ્રમ્બીઅમ)—વનસ્પતિના થડને જાડાઈમાં વધારનારો કોષોનો સમૂહ.

પરાગરૂપક (એન્ટિરિડિઅમ)—અનુસમાગની ઉપર ઉત્પન્ન થતા
લિંગકોષો

પણાભા, અથવા, ધૃણી (લેમિનેરિઆ)—એક જાતની વનસ્પતિ

પારમપીપજો (ટ્યુલિપ)—એક જાતની વનસ્પતિ

પ્રાણિવિદ્યા (ઓર્ગેનોલોજી)—પ્રાણીઓના સભ્યો સ્વર્ગ કરનાર શાસ્ત્ર

પ્રાચીનજીવયુગ (પેલિઓઝોઇક એજ)—ભૂસ્તરવિદ્યાનો એક યુગ

પ્રાચીનજીવવિદ્યાલિસ (પેલિઓઝોનિસ્ટ)—જૂની ઉદ્ભિન્નજો અને
જૂના પ્રાણીઓના મધ્યે જોયે અભ્યાસ કરેલો છે
એવો માણસ

પાદડીઓ (પેટ-સ)—ફૂલમણીની પાદડીઓ

પીતદુ (એરોફેરિઆ, મપીપઝલ)—એક જાતની વનસ્પતિ

પિચ્છપર્ણદલ (પિનેટ લીફ)—પિછાના આધારનું પાદુ

પિથારી હસરાજ (બ્લેડર ફર્ન, મિસ્ટોપેરિમ ફેન્જિલિમ)—એક
જાતની હસરાજ

પુરાણી-એત (આર્કિઓ-કેનેમાઇટિમ)—એક જાતની જૂના યુગની
એતની જાતની વનસ્પતિ

પૈસો (મની)—એક જાતની વનસ્પતિ

પુખ્તપાથ (રીસેપ્ટકલ)—દીટાની ટોચ-જે જગ્યાએ ફૂલની પાદ-
ડીઓ, અને સ્પિકેમર તથા નગ્નેમર ચોટેલા હોય છે

પોપડપેત્રી (લેપિડોપેરા)—એક જાતના પ્રાણી-જીવડા

પુજ (સોરી)—અલિંગકોષાગારોનો સમૂહ

પુગનો વર્ગ (ફ્લોર)—ઉદ્ભિન્નજોનો એક વર્ગ-પુગની જાતની
વનસ્પતિઓ

ફૂલ (ફ્લોર)—જીવડની એક જાત

ફૂલમણી (ફ્લોર)—સુશોભિત રંગની પાદડીઓ, એ પાદડીઓ
કેટલીકવાર રંગ વગરની પણ હોય છે વગર અને પુક
સરની વચ્ચે આવેલી પાદડીઓનો સમૂહ

ફલદ-પત્ર (કાર્પેલમ)—ત્રી કેમરોનુ બીજુ નામ

બગદા (પેટેટોઝ)—એક જાતની વનસ્પતિ

બતકી (ડક-વીડઝ)—એક જાતની વનસ્પતિ.

બર (રીડઝ)—એક જાતની વનસ્પતિ

બહુમૂળી (પોનીપોડિએમી)—એકજાતની વનસ્પતિઓ

બલ્લ (મ્યુસીનેજ —એક જાતનો પદાર્થ જે વનસ્પતિઓમાં

ઉત્પન્ન થાય છે.

બીજધાગી વનસ્પતિઓ (મીડ-પેન્ટમ)—બીજ ઉત્પન્ન કરતી

વનસ્પતિઓ.

બીજકણુદય (એપોરેફિય)—જે પાદડાની ઉપર અલિંગકોનાગામે

ઉત્પન્ન થાય છે તે પાદડાઓ

બીજક (ન્યુમેલમ)—અગ્રણની એક પેશિ

બૂચ-માડ (ટ્રાક્ટ-ઓક —એક જાતની વનસ્પતિ

બુતમ (પોપ્પમ)—એક જાતની વનસ્પતિ.

બેત (કેનેમાઇટિમ)—એક જાતની વનસ્પતિઓ

બેરગમેલા (લાર્ચ —એક જાતની વનસ્પતિ

બેદોહ-બેદ (વેલ્ડિએશન)—વિકાર-નવા લક્ષણની ઉત્પત્તિ

બૃસ્તરવિદ્યા (મિઓનોઇ)—પૃથ્વીના ખડકે અને નેમા પડી રહેલા

જીવજોવાની ચર્ચા કરનાર શાસ્ત્ર

બોજ (મર્ચ)—એક જાતના વૃક્ષો

બાફી (બીચ)—એક જાતના ઝાડ

બૂજ (ટેન્ટેકન)—બૂજના જેવો કેસો, એ કેસો વનસ્પતિના કેદ

માંક અવયવોમાં હાથની ગરજ મારે છે

બૂ-પ્રકાડ (રિઓમ)—જમીનની અદર રહેતુ અને ઉગતુ થડ

મન્ગ (મૉથ)—એક જાતની ગોકળગાય.

મધ્યજીવયુગ (મેસોઝોઇક)—મસ્તવિદ્યાનો એક યુગ.

મત્સ્યસ્તરયુગ (ડિવોનીઅન એજ)—ભૂસ્તરવિદ્યાનો એક યુગ.

કુખાલખ (એકનર્ન)—એક જાતની હંસરાજ.

મહાકૂલી (રેફ્લેસીઆ આર્નોલ્ડી)—એક જાતની વનસ્પતિ, જેને બહુજ મોટું ફુલ થાય છે.

માર (એક) એક જાતનાં ઝાડ.

મોરવેલાદિ વનસ્પતિઓ (રેનન્ક્યુલેસી)—એક વનસ્પતિ સમૂહ.

મધ્યવય્યા (કોર્ટેક્સ)—વૃક્ષના થડમાં વચલી છાલ.

મોટી-અશ્વપુચ્છી (ગ્રેટ-હોર્સટેલ)—એક જાતની અશ્વપુચ્છી વનસ્પતિ.

રક્ષાંગ (ઓર્ચીડ)—એક જાતની અંતરિક્ષની વનસ્પતિઓ.

રાનજાઇ (કિલમેટિસ)—એક જાતની વનસ્પતિ.

રાક્ષસી હાથી (મેમથ)—એક જાતનો મોટો હાથી.

ગડતી કલચણ (વીર્પીંગ વિલો)—કલચણ વનસ્પતિની એક જાત.

લીલ (મોસ)—એક જાતની વનસ્પતિ.

લાખણુ વનસ્પતિ (મિમોસા)—એક જાતની વનસ્પતિ.

લીસી અશ્વપુચ્છી (સ્મુથ હોર્સટેલ, ઇકવી. લીમોસમ)—એક જાતની અશ્વપુચ્છી વનસ્પતિ.

વનકળ (સ્ટ્રોબેરિ)—એક જાતની વનસ્પતિ.

વજ (કેલિકમ)—ફૂલમણીની બહારનું પાંદડીઓનું જૂથ જે યુગ્મના અંદરના ભાગોનું જતન કરે છે.

વલ્કક (બાર્ટ)—એક પેશિ-ચડના કાષ્ઠનો એક ભાગ-વલ્કક પેશિ ખોરાકની લાવ જા કરે છે.

વિવૃતખીજ વનસ્પતિઓ (જાઇમ્નોસ્પર્મ)—જેમનાં ખીજ ખૂલ્યાં રહે છે એવી વનસ્પતિઓ.

વિવૃતખીજસ્તરક્રમ (જુરેસિક એજ)—ભૂસ્તરવિદ્યાનો એક યુગ.

વૃદ્ધોરગસ્તરક્રમ (પર્મિઅન એજ)—ભૂસ્તરવિદ્યાનો એક યુગ.

વૃદ્ધ મત્સ્યસ્તર ક્રમ (સિલ્યુરિયન ઝોન)—ઉપરો વૃદ્ધ મત્સ્યસ્તર ક્રમ, અને નીચરો વૃદ્ધ મત્સ્યસ્તર ક્રમ એ બે વૃદ્ધ મત્સ્યસ્તર ક્રમ નામના ભૂસ્તરવિદ્યાના એકે યુગના ઉપભાગો છે.

વેનાંકુર (એક્ટેરિઆ)—એક વનસ્પતિ સમૂહ. આ વનસ્પતિઓ ખડુજ નાની છે. સૂક્ષ્મદર્શકયંત્રથીજ માત્ર તેમને જોઈ શકાય છે.

વ્યવસ્થેદવિદ્યા (એનેટોમિ)—શરીરના અંદરના ભાગોની રચનાનું અવલોકન અને તેનું વિવેચન કરનાર વિદ્યા.

વાંમ (બેમ્બુ)—એક જાતની વનસ્પતિ.

સાંકેરીય (લીવરવર્ટ)—એક જાતની વનસ્પતિઓ.

સાંકુધારી વનસ્પતિઓ (કોનિક્સ)—પુષ્પની જગાએ સાંકુના આકારનું ઉત્પત્તિક અવયવ ધારણ કરનારી વનસ્પતિઓ.

શૈલકપ્રાણિય (સીલીકા)—ઝેતી-સીલીકોન, એટલે શૈલક નામના ધાતુનો પ્રાણિય-પ્રાણિય એટલે પ્રાણવાયુ વાજો-શૈલક અને પ્રાણવાયુના તત્વો મંયુક્ત થવાથી ઉત્પન્ન થતો પદાર્થ.

શેવાલ (એલ્ગ)—વનસ્પતિઓની એક જાત.

સાંકેરીય (લેપિડોકાર્પન)—એક જાતની વનસ્પતિઓ.

સહામૃગી હંમરાજ (ઑસ્ટ્રીય કર્ન)—એક જાતની હંમરાજ.

શુક્રકોષ (સ્પર્મેટોઝોઇડ)—પુલ્લિંગ લિંગકોષ, જેઓ કોષકેશન સાધનથી હલન ચલન કરે છે.

સાંકેરીય (લેપિડોડેન્ડ્રોન)—એક જાતની વનસ્પતિઓ.

સીતાહાર (કલ્કામોબીસ, લાઇકોપોડ)—એક જાતની વનસ્પતિઓ.

સ્કોપિની (આયોકાઇટા)—એક વનસ્પતિ સમૂહ.

સુવંગી ચૂરોપલ (મએશિયન લાઇમસ્ટોન, —સુવંગીચાતુયુક્ત ચૂનાનો પથ્થર.

સલંગત અથવા હિકાઇ (બર્ડઝ નેસ્ટ એર્યૅસ, નિઓદિઆ નિડ
એવિસ)—એક જાતની વનસ્પતિ

અરખટ (રશ)—એક જાતની પાણીમાં ઉગનારી વનસ્પતિ.

સરલ / પાઇન)—એક જાતની વનસ્પતિઓ.

સૂર (સીએમ)—એક જાતની વનસ્પતિઓ.

સાડ (યુ)—એક જાતની વનસ્પતિઓ.

સપ્તાલ્ (પીચ)—એક જાતનાં ઝાડ.

મળીજહમા (ટેરિડોસ્પર્મી, મીડ-ફર્સ)—હંમરાજ અને ખીજ-
ધારી બન્ને વર્ગનાં લક્ષણો બતાવનારી એક જાતની
પ્રાચીન વનસ્પતિઓ.

• સર્પજીલ્હી (એડર્સ્ટગ)—એક જાતની હસરાજ.

સાખૂ-તાડ (મેગો-પામ)—એક જાતનાં વૃક્ષો.

સાગર-ગત બ (સી-વીડઝ)—મનુષ્યમાં ઉગતી એક જાતની
વનસ્પતિઓ.

સાખ્જશૃંગી લીલ (સ્ટેમ્સ હૉર્ન મૉસ, લાઇકો કલેવેટમ)—એક
જાતની લીલ.

સ્ત્રીકેમર (પીન્ટીલ)—સ્ત્રિલિંગ કેવો ઉત્પન્ન કરનાર અને ખીજને
પોષી ફળ બતાવનાર પુષ્પનુ અંગ.

સ્ત્રીકેમર મુખ (સ્ટીગ્મા)—સ્ત્રીકેમરની ટોચ.

સ્ત્રીકૃપી (આર્કેગોનિયમ)—અનુસમાંગની ઉપર ઉગતું સ્ત્રિલિંગકોળ.

હસરાજ (ફર્ન)—અલિંગકોષધારી એક જાતની વનસ્પતિઓ.

ફરિલુપટી કુટુંબ (કૉન્વોલ્વુલસ ફેમીલી)—એક વનસ્પતિ સમૂહ.

કોથાયુડી (મીલેનિતેલા)—એક જાતની વનસ્પતિઓ.

લાયલો થોર (કેક્ટી)—એક જાતની વનસ્પતિઓ.